


NGÔ NGỌC AN

# 350 BÀI TẬP

# HOÁ HỌC

## CHỌN LỌC VÀ NÂNG CAO LỚP 10



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGÔ NGỌC AN

# **350 BÀI TẬP HOÁ HỌC**

## **CHỌN LỌC VÀ NÂNG CAO LỚP 10**

*(Tái bản lần thứ mười)*

*Chỉnh lí, bổ sung theo sách giáo khoa Hoá học 10 nâng cao*

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**





## LỜI NÓI ĐẦU

Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu tham khảo rèn luyện kỹ năng giải toán hoá học, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đồng nghiệp và các em học sinh quyển **"350 bài tập Hoá học chọn lọc và nâng cao lớp 10"**. Sách gồm 350 bài tập hoá học được chọn lọc từ các đề thi tuyển sinh đại học qua các năm và được trình bày dưới dạng các chủ đề, bao gồm các bài tập ở mức độ cơ bản và mức độ nâng cao theo từng chương trong sách giáo khoa hoá học 10 nâng cao. Trong lần tái bản này, sách được cập nhật và bổ sung các phần còn thiếu theo SGK Hoá học 10 nâng cao, gồm 7 chương :

Chương 1 : Nguyên tử – Gồm 6 chủ đề về : Xác định phân tử khối của hợp chất được tạo bởi các nguyên tố có các đồng vị khác nhau ; Các bài tập liên quan đến các hạt tạo thành nguyên tử ; Các bài tập về kích thước nguyên tử, hạt nhân, số khối ; Bài tập dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng...

Chương 2 : Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học – Gồm 2 chủ đề về : Xác định vị trí các nguyên tố ; Xác định công thức hoá học khi biết vị trí của nó trong bảng tuần hoàn.

Chương 3: Liên kết hoá học – Gồm 4 chủ đề về: Viết công thức cấu tạo của phân tử ; Xác định liên kết ; Trạng thái lai hoá ; Ảnh hưởng của liên kết hoá học đến độ tan và nhiệt độ nóng chảy.

Chương 4: Phản ứng oxi hoá khử – Gồm 6 chủ đề về: Xét chiều hướng của phản ứng ; Xác định chất oxi hoá, chất khử ; Phản ứng oxi hoá khử có hệ số bằng chữ.

Chương 5: Nhóm Halogen – Gồm 6 chủ đề về: Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học ; Nhận biết và tách các chất ; Xác định tên halogen ; Tính độ pH...

Chương 6: Nhóm oxi – Gồm 5 chủ đề về: Bảo túc và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học ; Nhận biết và tách các chất ; Xác định tên oxi, lưu huỳnh; Tính độ pH trong dung dịch...

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học – Gồm 4 chủ đề về: Ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, áp suất đến tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.

Ở mỗi chương, sách được trình bày theo các chủ đề lớn, trong các chủ đề có phần hướng dẫn lí thuyết hay gợi ý cách giải các bài tập để các em vận dụng kiến thức một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau để làm bài tập. Ngoài ra, cuối mỗi chương có bài tập tự giải để học sinh rèn luyện kĩ năng làm các bài tập và luyện thi vào các trường đại học và cao đẳng.

Chúng tôi mong muốn cuốn sách sẽ giúp ích được phần nào cho bạn đọc để học lên lớp trên, nhất là đối với học sinh chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Xin ghi nhận và cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để sách được sửa chữa hoàn chỉnh hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban biên tập Khoa học tự nhiên – NXB Giáo dục tại TP.HCM – 231 Nguyễn Văn Cừ Q5.

**TÁC GIẢ**

## CHƯƠNG I

# NGUYÊN TỬ

### CHỦ ĐỀ 1

**Xác định phân tử khối của hợp chất khi biết các hợp chất được tạo bởi các nguyên tố có các đồng vị khác nhau**

**LỜI DẪN:** Phân tử khối của một hợp chất có thể có nhiều giá trị khi các nguyên tố cấu tạo nên hợp chất có nhiều đồng vị. Cho nên khi xác định phân tử khối phải chú ý đến số khối của các đồng vị tạo nên phân tử.

### BÀI TẬP

1. a) Thế nào là đồng vị? Cho ví dụ minh họa.


b) Có các đồng vị:  $^{16}_8\text{O}$ ;  $^{17}_8\text{O}$ ;  $^{18}_8\text{O}$  và  $^1_1\text{H}$ ;  $^2_1\text{H}$ . Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu phân tử HOH có thành phần đồng vị khác nhau.

### GIẢI

a) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron (có số khối A khác nhau).

Ví dụ:  $^{35}_{17}\text{Cl}$  và  $^{37}_{17}\text{Cl}$ ;  $^{12}_6\text{C}$  và  $^{13}_6\text{C}$

b) Tạo ra 9 phân tử HOH thành phần đồng vị khác nhau



2. Có các đồng vị sau:  $^1_1\text{H}$ ;  $^2_1\text{H}$ ;  $^3_1\text{H}$ ;  $^{35}_{17}\text{Cl}$ ;  $^{37}_{17}\text{Cl}$ . Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hidro clorua có thành phần đồng vị khác nhau.

### GIẢI

Để tìm thành phần phân tử hidro clorua có phân tử khối khác nhau, ta lần lượt thay các đồng vị của hidro với các đồng vị của clo, ta có các loại phân tử HCl:  $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ ;  $^1\text{H}^{37}\text{Cl}$ ;  $^2\text{H}^{35}\text{Cl}$ ;  $^2\text{H}^{37}\text{Cl}$ ;  $^3\text{H}^{35}\text{Cl}$ ;  $^3\text{H}^{37}\text{Cl}$ .

3. Oxi có 3 đồng vị  $^{16}_8\text{O}$ ;  $^{17}_8\text{O}$  và  $^{18}_8\text{O}$ , còn cacbon có 2 đồng vị bền là  $^{12}_6\text{C}$  và  $^{13}_6\text{C}$ . Hỏi có thể tạo thành bao nhiêu phân tử khí cacbonic có thành phần đồng vị khác nhau. Tính phân tử khối của chúng.

### GIẢI

Phân tử khí  $\text{CO}_2$  gồm 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi, do đó có thể tạo thành 12 loại phân tử khí  $\text{CO}_2$  có số khối khác nhau. Để đơn giản ta kí hiệu đồng vị  $^{12}\text{C}$  là C, còn đồng vị  $^{13}\text{C}$  là C';  $^{16}\text{O}$  là O;  $^{17}\text{O}$  là O' và  $^{18}\text{O}$  là O". Các phân tử có thể là:

	$\text{CO}_2$	$\text{C}'\text{O}_2$	$\text{CO}'_2$	$\text{C}'\text{O}'_2$	$\text{CO}''_2$	$\text{C}'\text{O}''_2$	$\text{COO}'$
M =	44	45	46	47	48	49	45
	$\text{COO}''$	$\text{C}'\text{OO}'$	$\text{C}'\text{OO}''$	$\text{CO}'\text{O}''$	$\text{C}'\text{O}'\text{O}''$		
M =	46	46	47	47	48		

### CHỦ ĐỀ 2

Các dạng bài toán liên quan đến các hạt tạo thành một nguyên tử

**LỜI DẶN:** – Tổng số các hạt = các hạt proton (P) + các hạt nơtron (N) + các hạt electron (E);  $P = E$  nên:

$$\text{Tổng số các hạt} = 2P + N$$

– Sử dụng bất đẳng thức của số nơtron (đối với đồng vị bền có  $Z < 83$ ):  $P \leq N \leq 1,5P$  để lập 2 bất đẳng thức từ đó tìm giới hạn của P.

### BÀI TẬP

4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

### GIẢI

a) Theo đầu bài ta có:  $P + E + N = 13$

Vì  $P = E$  nên  $2P + N = 13$

Đối với đồng vị bền có  $Z < 83$  thì số nơtron:  $P \leq N \leq 1,5P$  nên ta có:

$$\begin{cases} 2P + N = 13 \geq 3P \\ 2P + N = 13 \leq 3,5P \end{cases}$$

Rút ra:  $3,7 \leq P \leq 4,3$ . Vì P, E là các số nguyên, do đó ta có  $P = 4$ ;  $E = 4$  và  $N = 5$ .

Nguyên tử khối  $4 + 5 = 9$ .

b) Nguyên tử có cấu hình electron như sau:  $1s^2 2s^2$ .

5. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử A là 16, trong nguyên tử B là 58. Tìm số proton, nơtron và số khối của các nguyên tử A, B. Giả sử sự chênh lệch giữa số khối với nguyên tử khối trung bình là không quá một đơn vị.

Xác định A:  $2Z + N = 16$  (1)

$$Z = 8 - \frac{N}{2} \text{ nên } Z < 8$$

Mặt khác  $\frac{N}{Z} \leq 1,5 \rightarrow N \leq 1,5Z$

Thay vào (1):  $2Z + 1,5Z \geq 16 \rightarrow Z \geq 4,5; 4,5 \leq Z < 8$

Số khối =  $16 - Z$ .

Z	5	6	7
Số khối	11	10	9

$$A = {}_5^{11}\text{B}$$

Hoặc có thể giải thích cách khác:

$$Z = 7 \rightarrow N = 2 \rightarrow \text{Ti lệ } \frac{N}{Z} \leq \frac{2}{7} = 0,28 \text{ (loại)}$$

$$Z = 6 \rightarrow N = 4 \rightarrow \text{Ti lệ } \frac{N}{Z} \leq \frac{4}{6} = 0,6 \text{ (loại)}$$

$$Z = 5 \rightarrow N = 6 \rightarrow \text{Ti lệ } \frac{N}{Z} \leq 1,2 \text{ (nhận)}$$

Xác định B:  $2Z + N = 58$

$$Z = 29 - \frac{N}{2} \text{ nên } Z < 29$$

Mặt khác:  $\frac{N}{Z} \leq 1,5 \rightarrow N \leq 1,5Z$


$$2Z + 1,5Z \geq 58 \rightarrow Z \geq 16,5$$

$$16,5 \leq Z < 29$$

Số khối =  $58 - Z$

Z	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Số khối	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31

Theo dấu bài sự chênh lệch giữa số khối với nguyên tử khối trung bình là không quá một đơn vị nên B là:



6. a) Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử đó.

b) Nguyên tử của nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó.

#### GIẢI

a) – Theo đầu bài ta có:

$$+ \begin{cases} Z + E + N = 115 \\ Z + E - N = 25 \end{cases} \quad (1)$$


---


$$2Z + 2E = 140$$

$$Z + E = 70$$

Ta đã biết  $Z = E$  nên bằng 35; thay giá trị Z, E vào (1) giải ra ta được  $N = 45$ ;  
 $A = Z + N = 35 + 45 = 80$

– Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

Nguyên tử có 7e lớp ngoài cùng, vậy nguyên tố là phi kim.

b) Cách giải tương tự câu a.

7. a) Tổng số hạt proton, nơtron và electron một nguyên tử là 155. Số hạt có mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số proton, nơtron và số khối A của nguyên tử.

b) Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố là 21.

(1) Hãy xác định tên nguyên tố đó.

(2) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(3) Tính tổng số obitan nguyên tử của nguyên tố đó.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TP HCM, năm 1998)

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Cách giải tương tự như bài tập số 6.

b) *Cách giải 1:* Gọi Z là số proton cũng bằng số electron.

(1) Gọi N là số nơtron.

$$2Z + N = 21 \quad (1)$$

$Z = \frac{21 - N}{2} = 10,5 - \frac{N}{2}$  nên  $Z \leq 10$ , trong 80 nguyên tố có hạt nhân nguyên tử bền, nên ta áp dụng:

$$1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5 \text{ nên } N \leq 1,5Z \text{ thay vào (1)}$$

$$2Z + 1,5Z \geq 21 \text{ nên } Z \geq 6$$

$$6 \leq Z \leq 10$$

$$A = 21 - Z$$

Z	6	7	8	9	10
A	15	14	13	12	11

Vậy  $Z = 7$  và  $A = 14$ . Nguyên tố đó là N.

$$(2) 1s^2 2s^2 2p^3$$



Cách giải 2:  $N + 2Z = 21$  hay  $N = 21 - 2Z$

Áp dụng:  $1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$

$$1 \leq \frac{21}{Z} - 2 \leq 1,5 \rightarrow 3 \leq \frac{21}{Z} \leq 3,5$$

$$\frac{21}{3} \geq Z \geq \frac{21}{3,5} \rightarrow 7 \geq Z \geq 6$$

Sau đó giải như cách 1.

8. Có hợp chất  $MX_3$ . Cho biết:

Tổng số hạt proton, neutron và electron là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn M là 8. Tổng 3 loại hạt trên trong ion  $X^-$  nhiều hơn trong ion  $M^{3+}$  là 16.

Tìm Z, A của nguyên tử M và X.

*GIẢI*

Trong M có Z proton, Z electron, N neutron

và trong X có Z' proton, Z' electron, N' neutron


Có các phương trình:

$$\begin{cases} (2Z + N) + (6Z' + 3N') = 196 \\ (2Z + 6Z') - (N + 3N') = 60 \\ (Z' + N') - (Z + N) = 8 \\ (2Z' + N' + 1) - (2Z + N - 3) = 16 \end{cases}$$

Giải hệ 4 phương trình trên ta có:

$$Z = 13; Z' = 17; N = 14; N' = 18$$

Dựa vào nguyên tử khối của M và X để xác định đồng vị





9. Một hợp chất có công thức phân tử  $M_2X$ .

– Tổng số các hạt trong hợp chất là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36.

– Nguyên tử khối của X lớn hơn M là 9.

– Tổng số 3 loại hạt trong  $X^2$  nhiều hơn trong  $M^+$  là 17.

Xác định số khối của M, X.

GIẢI

Theo đầu bài cho công thức phân tử của hợp chất là  $M_2X$

$$\begin{cases} 2(N_M + 2Z_M) + (N_X + 2Z_X) = 116 \\ 4Z_M + 2Z_X - (2N_M + N_X) = 36 \\ (N_X + Z_X) - (N_M + Z_M) = 9 \\ (N_X + 2Z_X + 2) - (N_M + 2Z_M - 1) = 17 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta có:  $Z_M = 11$ ;  $N_M = 12$

$$Z_X = 16; N_X = 16$$

Vậy số khối của  $M = 23$ ;  $X = 32$ .

10. Hợp chất N được tạo thành từ cation  $X^+$  và anion  $Y^{2-}$ . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong  $X^+$  là 11, còn tổng số electron trong  $Y^{2-}$  là 50.

Hãy xác định công thức phân tử và gọi tên N, biết rằng 2 nguyên tố trong  $Y^{2-}$  thuộc cùng một nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp.

GIẢI

Gọi  $\bar{Z}_x$  là số proton trung bình trong 1 nguyên tử có trong ion  $X^+$ , ta có:

$\bar{Z}_x = \frac{11}{5} = 2,2$ ; do đó X phải chứa hidro (H có  $Z = 1$ ) hoặc He (có  $Z = 2$ ) nhưng He là khí hiếm không tạo muối thông thường do đó trong  $X^+$  có H. Gọi A là nguyên tố thứ 2 ta có công thức của  $X^+$  là  $A_nH_m^+$  với hệ phương trình:

$$\begin{cases} n + m = 5 \\ Z_A \cdot n + 1 \cdot m = 11 \end{cases}$$

Giải ra ta có:  $n(Z_A - 1) = 6$ , chỉ có nghiệm duy nhất  $n = 1$  nghĩa là  $Z_A = 7$  là phù hợp và cation đó là  $NH_4^+$ .

Gọi  $\bar{Z}_y$  là số proton trung bình trong 1 nguyên tử có trong  $Y^{2-}$  ta có:

$\bar{Z}_y = \frac{50 - 2}{5} = 9,6$  do đó phải có 1 nguyên tố có  $Z \leq 9$  nghĩa là thuộc chu kì 2 do đó nguyên tố thứ hai phải ở chu kì 3 và số proton của chúng cách nhau 8 đơn vị (chu kì 2 và 3 đều là chu kì nhỏ cách nhau 8 nguyên tố).

Gọi Z là số proton của nguyên tố thứ nhất A thì  $Z + 8$  là số proton của nguyên tố thứ hai B. Công thức của  $Y^{2-}$  là  $A_{\alpha}B_{\beta}^{2-}$  thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 5 & (1) \\ Z\alpha + (Z + 8)(5 - \alpha) = 48 & (2) \end{cases}$$

Giải phương trình (2) ta có:  $5Z - 8\alpha = 8$ . Phương trình chỉ có nghiệm duy nhất là  $\alpha = 4$  và  $Z = 8$  là đúng; đó là nguyên tố oxi. Nguyên tố thứ hai có  $Z = 8 + 8 = 16$  đó là lưu huỳnh và công thức của Y là  $SO_4^{2-}$ .

Chất N có công thức là:  $(NH_4)_2SO_4$ .

11. a) Cho hỗn hợp gồm 2 muối sunfat của kim loại A hoá trị II và sunfat của kim loại B hoá trị III. Biết tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử A là 36, của nguyên tử B là 40. Xác định tên nguyên tố A và B.

b) Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1, tổng số e trong ion  $[X_3Y]^-$  là 32.

Tìm tên 3 nguyên tố X, Y, Z.

#### GIẢI

a) Kí hiệu số proton là P, số neutron là N và electron là E.

Tổng số phần tử cấu tạo của nguyên tử A =  $P + N + E = 36$

Tổng số phần tử cấu tạo của nguyên tử B =  $P + N + E = 40$

Giá trị nguyên tố	Nhóm A	Cấu tạo nguyên tử	Số proton (P)	Số electron (E)	Số neutron (N)	Nguyên tử khối	Kết luận
A ở chu kì 2	2 (hoá trị 2)	A 2 2	4	4	$36 - 8 = 28$	$4 + 28 = 32$	loại
A ở chu kì 3	2	2 A 8 2	12	12	$36 - 24 = 12$	$12 + 12 = 24$	nhận Mg
B ở chu kì 3	3 (hoá trị 3)	2 B 8 3	13	13	$40 - 26 = 14$	$13 + 14 = 27$	nhận Al

b) Đặt x, y, z lần lượt là điện tích hạt nhân của X, Y, Z.

Ta có:  $\sum Z = 16 \Rightarrow x + y + z = 16$  (1)

$Z_X - Z_Y = 1 \Rightarrow x - y = 1$  (2)

Tổng số e ion  $[X_3Y]^-$  = số e của  $3X$  + số e của Y + 1 = 32

$(Z = P = E) \Rightarrow 3x + y + 1 = 32$  (3)

Từ (1), (2) và (3) giải ra  $x = 8$ ,  $y = 7$  và  $z = 1$ .

Vậy X là oxi ( $Z = 8$ ), Y là nitơ ( $Z = 7$ ) và Z là hidro ( $Z = 1$ ).

12. a) 56 gam sắt chứa bao nhiêu hạt proton, bao nhiêu hạt nơtron, bao nhiêu hạt electron, biết rằng một nguyên tử sắt gồm 26 proton, 30 nơtron và 26 electron?

– Trong 1 kg sắt có bao nhiêu gam electron?

– Bao nhiêu kg sắt chứa 1 kg electron?

b) Người ta kí hiệu 1 nguyên tử đã mất  $n$  electron là  $M^{n+}$ , đã nhận thêm  $n$  electron là  $X^n$ . Viết theo ô lượng tử, cấu hình electron của các ion sau:

–  $_{11}\text{Na}^+$ ,  $_{13}\text{Al}^{3+}$ ,  $_{17}\text{Cl}$

–  $_{12}\text{Mg}^{2+}$ ,  $_{14}\text{Si}^{4+}$ ,  $_{8}\text{O}^{2-}$

### GIẢI

a) 56 gam sắt là 1 mol sắt.

1 mol sắt chứa  $6,02 \cdot 10^{23}$  phân tử sắt

1 phân tử sắt có 26 proton, 30 nơtron, 26 electron

Vậy 56 gam sắt hay 1 mol sắt chứa:

Số hạt proton:  $6,02 \cdot 10^{23} \times 26 = 156,52 \cdot 10^{23}$  hạt

Số hạt nơtron:  $6,02 \cdot 10^{23} \times 30 = 180,6 \cdot 10^{23}$  hạt

Số hạt electron:  $6,02 \cdot 10^{23} \times 26 = 156,52 \cdot 10^{23}$  hạt

– 1 kg sắt (hay 17,857 mol Fe)

Trong 1 phân tử sắt khối lượng electron chiếm một tỉ lệ khối lượng:

$$\frac{\frac{1}{1840} \times 26}{56} = \frac{26}{103040}$$

Trong 1 mol sắt khối lượng electron chiếm:  $\frac{56 \times 26}{103040} = 0,01413\text{g}$

Trong 1 kg sắt (hay 17,857 mol) khối lượng electron chiếm:

$$17,857 \times 0,01413 \approx 0,25\text{g}$$

– 0,25g electron có trong 1 kg sắt

1 kg electron có trong  $x$  kg sắt

$$x = \frac{1000 \times 1}{0,25} = 4000 \text{ kg.}$$

b) – Nếu là ion dương: viết cấu hình electron của nguyên tử đã mất số electron.

– Nếu là ion âm: viết cấu hình electron của nguyên tử đã nhận số electron.

### CHỦ ĐỀ 3

Các bài toán về độ rỗng của nguyên tử, của vật chất và khối lượng riêng hạt nhân nguyên tử khi biết kích thước nguyên tử, hạt nhân và số khối

LỜI DẪN:

Khối lượng riêng của một chất:  $D = \frac{\text{Khối lượng}}{\text{Thể tích}} = \frac{m}{V}$

Thể tích nguyên tử:  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ ;  $r$  là bán kính của nguyên tử.

Liên hệ giữa  $D$  và  $V$  ta có công thức:  $D = \frac{m}{\frac{4}{3} \times 3,14 r^3}$

### BÀI TẬP

13. a) Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 20°C biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của Fe là 7,87g/cm<sup>3</sup> với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho nguyên tử khối của Fe là 55,85.

b) Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Au ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ đó  $D_{Au} = 19,32\text{g/cm}^3$ . Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Biết nguyên tử khối của vàng là 196,97.

GIẢI

a) Thể tích 1 mol Fe =  $\frac{55,85}{7,87} = 7,097 \text{ cm}^3$

Thể tích 1 nguyên tử Fe =  $7,097 \times \frac{75}{100} \times \frac{1}{6,023 \cdot 10^{23}} = 8,8 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3$

Do đó bán kính nguyên tử của Fe tính theo công thức:

$$V_{Fe} = \frac{4}{3} \pi r_{Fe}^3 \rightarrow r_{Fe} = \sqrt[3]{\frac{3V_{Fe}}{4\pi}} = 1,28 \cdot 10^{-8} \text{ cm}.$$

b) Thể tích 1 mol Au:  $V_{Au} = \frac{196,97}{19,32} = 10,195 \text{ cm}^3$

Thể tích của 1 nguyên tử Au:

$$10,195 \times \frac{75}{100} \times \frac{1}{6,023 \cdot 10^{23}} = 12,7 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3$$

Bán kính của Au =  $1,44 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$ .

14. a) Chứng minh độ đặc của mạng tinh thể lục phương là 74%.

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Mg ở 20°C biết ở nhiệt độ đó Mg có khối lượng riêng 1,74g/cm<sup>3</sup>. Biết rằng Mg có mạng tinh thể lục phương, giả thiết nguyên tử có dạng hình cầu và xếp khít bên nhau.

b) Bán kính của nguyên tử hidro xấp xỉ bằng 0,053nm. Còn bán kính của proton bằng 1,5.10<sup>-15</sup>m. Cho rằng cả nguyên tử hidro và hạt nhân đều có dạng hình cầu. Tính tỉ lệ thể tích của toàn nguyên tử hidro với thể tích của hạt nhân.

GIẢI

a) Xét một đơn vị mạng tinh thể lục phương, mặt đáy lục giác cạnh bằng a.

Thể tích mạng tinh thể:

$$V_{tt} = S_d h = \frac{3a^2 \sqrt{3}}{2} \times \frac{2a\sqrt{6}}{3} = 3a^3 \sqrt{2}$$

Mỗi đỉnh lục giác có  $\frac{1}{6}$  nguyên tử, tại tâm lục giác đáy có  $\frac{1}{2}$  nguyên tử, trong khối lục phương giữa hai đáy có 3 nguyên tử kim loại. Tổng số nguyên tử kim loại trong một đơn vị tinh thể lục phương là:  $\left(\frac{1}{6} \times 6 + \frac{1}{2}\right) \times 2 + 3 = 6$  nguyên tử.

Các nguyên tử ở đáy xếp sát nhau theo lục giác đều do đó có bán kính:  $r = \frac{1}{2} a$ .

Thể tích choán chỗ của 6 nguyên tử kim loại trong tinh thể là:

$$V_{kl} = 6 \times \frac{4}{3} \pi \frac{a^3}{8} = \pi a^3$$

Độ đặc của mạng tinh thể là:  $D_d = \frac{V_{kl}}{V_{tt}} = \frac{\pi a^3}{a^3 3\sqrt{2}} = 0,74$  hay 74%.

– Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Mg:

Thể tích 1 mol tinh thể kim loại Mg là:  $V_{tt} = \frac{M_{Mg}}{D}$

Thể tích 1 mol nguyên tử Mg trong tinh thể:  $V_{molnt} = \frac{M_{Mg} D_d}{D}$

Thể tích 1 nguyên tử Mg:  $V_{nt} = \frac{M_{Mg} \times D_d}{D \times 6,02 \cdot 10^{23}} = \frac{4}{3} \pi r^3$

Bán kính nguyên tử gần đúng là:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[3]{\frac{3 \times M_{Mg} \times D_d}{4\pi \times D \times 6,02 \cdot 10^{23}}} = \sqrt[3]{\frac{3 \times 24 \times 0,74}{4\pi \times 1,74 \times 6,02 \cdot 10^{23}}} \\ &= 1,59 \cdot 10^{-8} \text{ cm hay } 1,59 \text{ \AA} . \end{aligned}$$

$$b) \quad r_{\text{nguyên tử H}} = 0,053\text{nm} = 0,53 \cdot 10^{-8}\text{cm}$$

$$r_{\text{proton}} = 1,5 \cdot 10^{-13}\text{cm}$$

$$V_{\text{nguyên tử H}} = \frac{4}{3} \pi (0,53 \cdot 10^{-8}\text{cm})^3$$

$$V_{\text{proton}} = \frac{4}{3} \pi (1,5 \cdot 10^{-13}\text{cm})^3$$

$$\frac{V_{\text{nguyên tử}}}{V_{\text{hạt nhân}}} = \left( \frac{0,53 \cdot 10^{-8}}{1,5 \cdot 10^{-13}} \right)^3 = 0,044 \cdot 10^{15} = 44 \cdot 10^{12} \text{ lần.}$$

15. a) Nếu thừa nhận rằng nguyên tử Ca, Cu đều có dạng hình cầu, sắp xếp đặc khít bên cạnh nhau thì thể tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% so với toàn thể khối tinh thể. Hãy tính bán kính nguyên tử Ca, Cu (theo đơn vị Å) biết khối lượng riêng ở đktc của chúng đều ở thể rắn tương ứng là  $1,55\text{g/cm}^3$ ,  $8,9\text{g/cm}^3$  và nguyên tử khối Ca là 40,08, Cu là 63,546.

b) Coi nguyên tử flo ( ${}^{19}_9\text{F}$ ) là một hình cầu có bán kính là  $10^{-10}\text{m}$  và hạt nhân cũng là một hình cầu có bán kính  $10^{-14}\text{m}$ .

(1) Khối lượng của 1 nguyên tử  ${}^{19}_9\text{F}$  tính bằng gam là bao nhiêu?

(2) Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử flo?

(3) Tính tỉ số thể tích của toàn nguyên tử flo so với thể tích của hạt nhân nguyên tử. Thể tích khối cầu được tính theo công thức  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ .

GIẢI

a) Tính bán kính nguyên tử Ca và Cu

$$V_{1 \text{ mol canxi}} = \frac{40,08}{1,55} = 25,86 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{của các nguyên tử trong 1 mol canxi}} = \frac{25,86 \times 74}{100} \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{của 1 nguyên tử canxi}} = \frac{25,86 \times 74}{6,02 \cdot 10^{25}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \times 25,86 \times 74}{6,02 \cdot 10^{25} \times 4\pi}} \text{ cm}$$

$$1 \text{ Å} = 10^{-8}\text{cm}$$

Học sinh tự giải tiếp.

$$V_{1 \text{ mol nguyên tử Cu}} = \frac{63,546}{8,9} = 7,14 \text{ cm}^3$$

$$r_{\text{nguyên tử Cu}} = \sqrt[3]{\frac{3 \times 7,14 \times 74}{6,02 \cdot 10^{23} \times 100 \times 4\pi}} \text{ cm}$$

Học sinh tự giải tiếp.

b) (1)  $1 \text{ đvC} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ gam}$

Khối lượng 1 nguyên tử flo: 19 đvC

Khối lượng tuyệt đối của 1 nguyên tử flo tính ra gam:

$$19 \times 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ gam} = 3,154 \cdot 10^{-23} \text{ gam}$$

(2) V của hạt nhân nguyên tử flo:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3,14 \times (10^{-14})^3 \text{ m}^3$$

$$V = 4,186 \cdot 10^{-42} \text{ m}^3$$

$$D = \frac{3,154 \cdot 10^{-23}}{4,186 \cdot 10^{-42}} = 7,535 \cdot 10^{18} \text{ g/m}^3$$

$$\text{hay } 7,535 \cdot 10^{12} \text{ g/cm}^3 = 7535000000 \text{ kg/cm}^3 = 7535000 \text{ tấn/cm}^3.$$

(3)  $V_{\text{nguyên tử F}} = \frac{4}{3} \pi (10^{-10} \text{ m})^3$ ;  $V_{\text{hạt nhân F}} = \frac{4}{3} \pi (10^{-14} \text{ m})^3$

Tỉ lệ thể tích:  $\frac{V_{\text{nguyên tử F}}}{V_{\text{hạt nhân F}}} = \frac{\frac{4}{3} \pi \times 10^{-30} \text{ m}^3}{\frac{4}{3} \pi \times 10^{-42} \text{ m}^3} = 10^{12} \text{ lần}.$

16. a) Nguyên tử kẽm có bán kính  $r = 1,35 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ , có khối lượng bằng 65 đvC.

(1) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

(2) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung vào hạt nhân với bán kính  $r = 2 \cdot 10^{-15} \text{ m}$ . Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

b) Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Cu, biết khối lượng riêng của đồng là  $8,93 \text{ g/cm}^3$  và nguyên tử khối của Cu = 63,546. Mặt khác, thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể, còn lại là các khe trống.

GIẢI

a) (1) Thể tích của một nguyên tử kẽm

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ mà } r = 1,35 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ cm}.$$

$$\text{Nên } V = \frac{4}{3} \times 3,14 \times (1,35 \cdot 10^{-8})^3 = 10,30 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3$$

Một nguyên tử kẽm có khối lượng 65 đvC.

Vậy khối lượng của  $1\text{cm}^3$  kẽm có khối lượng:  $\frac{65\text{dvC}}{10,30 \cdot 10^{-24}\text{cm}^3}$

Mà  $1\text{dvC} = 1,66 \cdot 10^{-24}\text{g}$

Vậy  $1\text{cm}^3$  kẽm nặng  $\frac{65 \times 1,66 \cdot 10^{-24}}{10,30 \cdot 10^{-24}} = 10,475\text{g/cm}^3$ .

Vậy khối lượng riêng của nguyên tử kẽm  $D = 10,475\text{g/cm}^3$ .

Ghi chú: Vì giữa các nguyên tử có khoảng cách, nên trong thực tế tinh thể kẽm các nguyên tử chỉ chiếm hơn 70% thể tích, phần còn lại là rỗng, nên thực tế khối lượng riêng của kẽm sẽ nhỏ hơn  $10,475\text{g/cm}^3$ .

(2) Thể tích của hạt nhân nguyên tử kẽm là:

$$r = 2 \cdot 10^{-15}\text{m} = 2 \cdot 10^{-13}\text{cm}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3,14 \times (2 \cdot 10^{-13})^3 = 33,50 \cdot 10^{-39}\text{cm}^3$$

Thực tế, khối lượng nguyên tử tập trung vào hạt nhân, nên  $1\text{cm}^3$  hạt nhân nguyên tử kẽm có khối lượng là:

$$\frac{65 \cdot 1,66 \cdot 10^{-24}}{33,50 \cdot 10^{-39}} \approx 3,22 \cdot 10^{15}\text{g/cm}^3 \text{ hay } 3,22 \cdot 10^9 \text{ tấn/cm}^3.$$

$$\text{b) } V_{(\text{mol Cu})} = \frac{63,546}{8,9} = 7,14 \text{ cm}^3 \rightarrow 7,14 \times 74\% = 5,28 \text{ cm}^3$$

$$V_{(\text{Cu})} = \frac{5,28}{6,02 \cdot 10^{23}} = 0,88 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3.$$

Vậy bán kính nguyên tử:

$$r_{\text{Cu}} = \sqrt[3]{\frac{3(0,88 \cdot 10^{-23})}{4 \times 3,14}} = \sqrt[3]{2,10 \cdot 10^{-24}} \approx 1,28 \cdot 10^{-8}\text{cm} = 1,28 \text{ Å}.$$

17. Nguyên tử nhôm có bán kính  $1,43 \text{ Å}$  và có nguyên tử khối là 27.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al.

b) Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể, còn lại là các khe trống. Định khối lượng riêng đúng của Al. Biết thể tích của hình cầu:  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ .

GIẢI

$$\text{a) } r_{\text{nguyên tử Al}} = 1,43 \cdot 10^{-8}\text{cm}$$

$$V_{\text{nguyên tử Al}} = \frac{4}{3} \times 3,14 \times (1,43 \cdot 10^{-8}\text{cm})^3 = 12,243 \cdot 10^{-24}\text{cm}^3$$



$$m_{\text{nguyên tử Al}} = 27 \times 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

$$D_{\text{nguyên tử Al}} = \frac{27 \times 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}}{12,243 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3} = 3,66 \text{ g/cm}^3.$$

b) Thực tế  $V_{\text{nguyên tử}}$  chiếm 74% thể tích tinh thể. Vậy  $D$  thực tế của nhôm.

$$\frac{3,66 \times 74}{100} = 2,7 \text{ g/cm}^3.$$

18. Bán kính gần đúng của hạt nơtron là  $1,5 \cdot 10^{-15} \text{ m}$ , còn khối lượng của nơtron bằng  $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ . Tính khối lượng riêng của nơtron.

GIẢI

$$V_{\text{hạt nơtron}} = \frac{4}{3} \times 3,14 (1,5 \cdot 10^{-15} \text{ cm})^3 = 14,13 \cdot 10^{-39} \text{ cm}^3$$

$$D_{\text{hạt nơtron}} = \frac{1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{14,13 \cdot 10^{-39} \text{ cm}^3} = 0,118 \cdot 10^{12} \text{ kg/cm}^3$$

$$= 118 \cdot 10^9 \text{ kg/cm}^3.$$

#### CHỦ ĐỀ 4

**Dạng bài toán tìm số khối, phần trăm đồng vị và nguyên tử khối trung bình**

*LỜI DẶN: Hầu hết các nguyên tố Hoá học đều là hỗn hợp của nhiều đồng vị, nên nguyên tử khối của các nguyên tố đó là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị.*

$$\overline{M} = \frac{\sum x_i M_i}{\sum x_i}$$

Với  $i: 1, 2, 3, \dots, n$

$x_i$ : số nguyên tử

$M_i$ : nguyên tử khối

#### BÀI TẬP

19. a) Trong nước, hiđro chủ yếu tồn tại hai đồng vị  $^1_1\text{H}$  và  $^2_1\text{H}$ . Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị  $^2_1\text{H}$  trong 1ml nước? Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro trong  $\text{H}_2\text{O}$  nguyên chất là 1,008.

b) Hãy cho biết các đồng vị sau đây, đồng vị nào phù hợp với tỉ lệ:

$$\frac{\text{số proton}}{\text{số nơtron}} = \frac{13}{15}$$

$$^{54}_{26}\text{M}; \quad ^{55}_{26}\text{M}; \quad ^{56}_{26}\text{M}; \quad ^{57}_{26}\text{M}; \quad ^{58}_{26}\text{M}.$$

# GIẢI

a) Gọi x là tỉ lệ phần trăm về số nguyên tử của đồng vị  $^1_1\text{H}$ :

$$\frac{1 \cdot x + 2(100 - x)}{100} = 1,008$$

Giải ra ta được  $x = 99,2\%$ .

Thành phần của đồng vị  $^2_1\text{H}$  là  $0,8\%$ .

$$1\text{ml nước} = 1\text{ gam nước} = \frac{1}{18} \text{ mol nước}$$

Trong 1 mol nước có  $6,02 \times 10^{23}$  phân tử nước.

$$\text{Vậy } \frac{1}{18} \times 6,02 \times 10^{23} \times 2 \times \frac{0,8}{100} = 5,35 \cdot 10^{21}$$

Trong 1ml nước có  $5,35 \cdot 10^{21}$  nguyên tử của đồng vị  $^2_1\text{H}$ .

$$\text{b) Tỉ lệ: } \frac{\text{proton (p)}}{\text{notron (n)}} = \frac{13}{15} \text{ hoặc } \frac{26}{30}$$

$$A = p + n = 56 ; Z = 26. \text{ Vậy } ^{56}_{26}\text{M đúng.}$$

20. a) Nguyên tử khối của bo là 10,81. Bo gồm 2 đồng vị  $^{10}_5\text{B}$  và  $^{11}_5\text{B}$  có bao nhiêu phần trăm đồng vị  $^{11}_5\text{B}$  trong axit boric  $\text{H}_3\text{BO}_3$ ?

b) X và Y là 2 đồng vị của nguyên tố A (có số thứ tự 17) có tổng số khối là 72. Hiệu số số notron của X, Y bằng  $1/8$  số hạt mang điện dương của B (có số thứ tự là 16). Tỉ lệ số nguyên tử của X và Y là 32,75 : 98,25.

Tính số khối của 2 đồng vị trên. Suy ra khối lượng mol trung bình của A.

## HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Phương pháp giải như bài tập số 19.

$$\text{b) Lập hệ phương trình: } (Z_A + N_X) + (Z_A + N_Y) = 72 \quad (1)$$

$$N_X - N_Y = \frac{Z_B}{8} \quad (2)$$

$$\text{Giải ra: } N_X = 20 \Rightarrow A_X = 37$$

$$N_Y = 18 \Rightarrow A_Y = 35$$

Với tỉ lệ số nguyên tử:  $X : Y = 32,75 : 98,25$

Số nguyên tử  $X = \frac{32,75}{98,25}$  số nguyên tử Y.

$$\text{Khối lượng mol trung bình của A: } \frac{(32,75 \times 37) + (98,25 \times 35)}{(32,75 + 98,25)} = 35,5\text{g.}$$

21. Tính thành phần phần trăm của các đồng vị của Cu trong tự nhiên và tỉ lệ khối lượng của  $^{63}\text{Cu}$  trong  $\text{CuCl}_2$ . Biết đồng trong tự nhiên gồm hai đồng vị  $^{63}_{29}\text{Cu}$  và  $^{65}_{29}\text{Cu}$  và nguyên tử khối trung bình là 63,54.

GIẢI

Gọi x là thành phần % của đồng vị  $^{65}\text{Cu}$ : 
$$\frac{65 \times x + (100 - x)63}{100} = 63,54$$

Giải ra ta được x = 27%  $^{65}\text{Cu}$  và 73%  $^{63}\text{Cu}$

$$M_{\text{CuCl}_2} = 134,54$$

Thành phần phần trăm của hai đồng vị Cu trong  $\text{CuCl}_2$ :

$$\frac{63,54}{134,54} = 0,47 = 47\%$$

Thành phần %  $^{63}\text{Cu}$  trong  $\text{CuCl}_2$ : 
$$\frac{73 \times 63}{134,54 \times 100} \times 100\% = 34,18\%.$$

22. Cho m gam kim loại X tác dụng vừa đủ với 7,81 gam khí clo thu được 14,05943 gam muối clorua với hiệu suất 95%. Kim loại X có 2 đồng vị A và B có đặc điểm:

- Tổng số proton trong 2 nguyên tử A và B bằng 186.
- Hiệu số hạt không mang điện của A và B bằng 2.
- Một hỗn hợp có 3600 nguyên tử A và B. Nếu ta thêm vào hỗn hợp này 400 nguyên tử A thì hàm lượng phần trăm của nguyên tử B trong hỗn hợp sau ít hơn trong hỗn hợp đầu là 7,3%.

a) Xác định khối lượng m gam và nguyên tử khối của kim loại X.

b) Xác định số khối của A, B và số proton.

c) Xác định số nguyên tử A có trong khối lượng muối nói trên.

GIẢI

a) - Số gam muối clorua theo lí thuyết: 
$$\frac{14,05943 \times 100}{95} = 14,7994 \text{ gam}$$

- Số gam kim loại X trong muối:  $14,7994 - 7,81 = 6,9894 \text{ gam}$

- Kim loại X có hoá trị x. Muối clorua có công thức  $\text{XCl}_x$ .

$n_{\text{Cl}}$  trong muối: 
$$\frac{7,81}{35,5} = 0,22$$

$n_{\text{X}}$  trong muối: 
$$\frac{0,22}{x} \quad \left( \begin{array}{l} 1 \text{ mol X có } x \text{ mol Cl} \\ n_{\text{X}} \text{ mol X có } 0,22 \text{ mol Cl} \end{array} \right)$$

$$n_{\text{X}} = \frac{0,22}{x}$$

$$M_{\text{X}} = \frac{6,9894}{\frac{0,22}{x}} = \frac{6,9894}{0,22} \times x = 31,77x$$

Với  $x = 1$  ta có  $M_x = 31,77$  (loại)

Với  $x = 2$  ta có  $M_x = 63,54$  là Cu có hoá trị II

Với  $x = 3$  ta có  $M_x = 95,31$  (loại)

– Tính số đồng vị A và B trong hỗn hợp. Gọi a là số hạt của đồng vị A, b là số hạt của đồng vị B.

$$\frac{b \times 100}{3600} - \frac{b \times 100}{4000} = 7,3$$

$$\frac{100b - 90b}{3600} = 7,3 \Rightarrow b = 2628 \text{ và } a = 972.$$

b) – Tính số khối của A và B. Gọi số khối của đồng vị A là A và số khối của đồng vị B là B.

Nếu  $B - A = 2$

$$\begin{cases} \frac{2628B + 972A}{3600} = 63,54 \\ B - A = 2 \end{cases}$$

Giải ra ta có  $A = 63$  và  $B = 64,09$  (loại nghiệm này vì số khối phải nguyên dương).

Nếu cho  $A - B = 2$ . Giải ra ta có:  $B = 63$ ,  $A = 65$ .

– Tính p:

Tổng số hạt trong B:  $\frac{186 - 2}{2} = 92$  (số e + số p + số n)

Số (p) = số (e) trong 1 nguyên tử.

$$e + p + n = 92$$

$$p + n = A = 63$$

Vậy  $e = 92 - 63 = 29$  và  $p = 29$ .

c) Học sinh tự giải.

**23.** Cho M là kim loại tạo ra 2 muối  $MCl_x$ ,  $MCl_y$  và 2 oxit  $MO_{0,5x}$ ,  $M_2O_y$ . Tỷ lệ về khối lượng của clo trong 2 muối có tỷ lệ 1 : 1,173; của oxi trong 2 oxit là 1 : 1,352.

Tìm nguyên tử khối của M.

GIẢI

Tỷ lệ khối lượng của clo trong  $MCl_x$  và  $MCl_y$

$$\frac{35,5x}{M + 35,5x} : \frac{35,5y}{M + 35,5y} = 1 : 1,173$$

$$\text{Rút gọn ta có: } 1,173xM + 6,142xy = yM \quad (1)$$

- Tỷ lệ khối lượng của oxi trong  $MO_{0,5x}$  và  $M_2O_x$

$$\frac{8x}{M + 8x} : \frac{16y}{2M + 16y} = 1 : 1,352$$

$$\text{Rút gọn ta có: } 1,352xM + 2,816xy = yM \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$0,179M = 3,326y \text{ hay } M = 18,581y \quad (3)$$

y	1	2	3
M	18,581	37,162	55,743

Chọn nghiệm  $y = 3$ . Vậy M là 55,743 đvC (Fe).

24. a) Đồng trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị  $^{63}_{29}\text{Cu}$  và  $^{65}_{29}\text{Cu}$  với tỉ số  $\frac{^{63}\text{Cu}}{^{65}\text{Cu}} = \frac{105}{245}$ .

Tính nguyên tử khối trung bình của đồng.

b) Hidro được điều chế bằng cách điện phân nước. hidro đó gồm 2 loại đồng vị  $^1_1\text{H}$  và  $^2_1\text{D}$ . Hỏi trong 100g nước nói trên có bao nhiêu đồng vị  $^2_1\text{D}$ ? Biết rằng nguyên tử khối hidro là 1,008 và oxi là 16.

c) Magie có hai đồng vị là X và Y. Đồng vị X có số khối là 24. Đồng vị Y hơn X một neutron. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg. Biết số nguyên tử trong hai đồng vị tỉ lệ  $X : Y = 3 : 2$ .

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Dựa vào phương trình tính  $\bar{M} = \frac{(63 \times 105) + (65 \times 245)}{105 + 245} = 64,4$ .

b) Gọi x là tỉ lệ phần trăm  $^2_1\text{D}$  (đơteri)

$$\frac{x \times 2 + (100 - x)1}{100} = 1,008$$

Giải ra ta được  $x = 0,8\%$

Trong 1 mol nước có khối lượng 18,016g có  $2 \times 6,023 \cdot 10^{23}$  nguyên tử hidro hay  $2 \times 6,023^{23} \times 0,8\%$  đồng vị đơteri (D)

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{100}{18,016}$$

Vậy trong 100g nước có:

$$\frac{100 \times 2 \times 6,023 \cdot 10^{23} \times 8 \cdot 10^{-3}}{18,016} = 5,35 \cdot 10^{22} \text{ D.}$$

c) – Tìm nguyên tử khối của Mg.

– Tìm  $\bar{M}$  dựa vào tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị và nguyên tử khối mỗi đồng vị.

25. a) Cho giá trị tuyệt đối về khối lượng nguyên tử của một loại đồng vị của Mg là  $4,48 \cdot 10^{-23}g$ ; của Al là  $4,82 \cdot 10^{-23}g$ ; của Fe là  $8,96 \cdot 10^{-23}g$ .

(1) Tính khối lượng mol của Mg, ion  $Al^{3+}$ , ion  $Fe^{3+}$ .

(2) Tính số proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử của các đồng vị trên, biết số thứ tự của Mg, Al, Fe tương ứng là 12, 13, 26.

b) Một thanh đồng chứa 2 mol Cu trong đó có hai đồng vị  $^{63}_{29}Cu$  (75%) và  $^{65}_{29}Cu$  (25%). Hỏi thanh đồng nặng bao nhiêu gam.

*GIẢI*

a) (1) – Khối lượng mol nguyên tử Mg

$$4,48 \cdot 10^{-23} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 26,97g$$

Vì khối lượng electron không đáng kể nên khối lượng ion cũng xem bằng khối lượng mol nguyên tử nên:

– Khối lượng mol ion  $Al^{3+} = 4,82 \cdot 10^{-23} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 29,01g$ .

– Khối lượng mol ion  $Fe^{3+} = 8,96 \cdot 10^{-23} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 53,94g$ .

(2) Như vậy số khối của Mg = 27; Al = 29 và Fe = 54 tương ứng với các đồng vị:  $^{27}_{12}Mg$ ;  $^{29}_{13}Al$  và  $^{54}_{26}Fe$  thì số neutron trong hạt nhân của các nguyên tử trên:

Mg có 12p nên số neutron là :  $27 - 12 = 15$

Al có 13p nên số neutron là:  $29 - 13 = 16$

Fe có 26p nên số neutron là:  $54 - 26 = 28$

b) Khối lượng 1 mol Cu (hỗn hợp hai đồng vị)

$$\frac{(63 \times 75) + (65 \times 25)}{100} = 63,5g$$

Khối lượng thanh Cu:  $63,5 \times 2 = 127$  gam.

26. a) Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là  $X_1$  và  $X_2$ . Đồng vị  $X_1$  có tổng số hạt là 18. Đồng vị  $X_2$  có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong  $X_1$  cũng bằng nhau. Xác định nguyên tử khối trung bình của X.

b) Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị Y, Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của Y và Z.

*GIẢI*

a) Các hạt trong đồng vị  $X_1$ :  $18 = p + n + e$ . Các loại hạt bằng nhau. Vậy số hạt của mỗi loại:  $\frac{18}{3} = 6$ .

Số khối của đồng vị  $X_1 = 12$

Số khối của đồng vị  $X_2 = 20 - 6 = 14$

(số hạt electron của  $X_1$  và  $X_2$  bằng nhau)

$$\bar{A}_x = \frac{(12 \times 50) + (14 \times 50)}{100} = 13$$

b) Gọi số khối của Y là  $A_y$  và của Z là  $A_z$ ; z là số nguyên tử của đồng vị Z. Suy ra số nguyên tử đồng vị Y là  $0,37z$ .

$$\begin{cases} A_z + A_y = 128 \\ \frac{0,37z \times A_y + z \times A_z}{0,37z + z} = 63,54 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta có:  $A_z = 63$  và  $A_y = 65$ .

27. Cho biết tổng số electron trong anion  $AB_3^{2-}$  là 42 trong các hạt nhân A cũng như B số proton bằng số neutron.

a) Tính số khối của A và B.

b) Lấy các phản ứng để minh họa A, B và hợp chất  $AB_2$  có thể đóng vai trò chất oxi hoá cũng như chất khử trong một số phản ứng hoá học.

c) Viết phản ứng trực tiếp tạo ra  $AB_3^{2-}$  từ  $AB_2$  và ngược lại.

(Trích đề thi tuyển sinh Học viện Quân y phía Nam năm 1995)

### GIẢI

a) Gọi x, y là số proton trong các hạt nhân của A, B, ta có:

$$x + 3y = 42 - 2 = 40$$

Do đó  $y < \frac{40}{3} = 13,3$  nghĩa là B phải thuộc chu kì 2 và vì là phi kim (tạo anion) nên B chỉ có thể là flo, oxi hoặc nitơ. Nếu là flo ( $y = 9$ ) thì  $AF_3^{2-}$  và  $A^{+1}$  mà  $x = 40 - 3 \times 9 = 13$ . Đó là số thứ tự nguyên tố của Al: loại; nếu là oxi ( $y = 8$ ) thì  $x = 40 - 3 \times 8 = 16$ , đó là S: đúng; nếu là nitơ ( $y = 7$ ) thì  $AN_3^{2-}$  và A có số oxi hoá +7 mà  $x = 40 - 3 \times 7 = 19$  ứng với K (kim loại kiềm). Vậy A là S (lưu huỳnh) có số khối  $= 16 + 16 = 32$ . B là O (oxi) có số khối  $8 + 8 = 16$ .

Câu b) và c) học sinh tự giải.

28. a) Một nguyên tố R có tổng số hạt (P, N, E) là 52. Xác định số hiệu nguyên tử của R.

b) R có 2 loại đồng vị là  $R_1$  và  $R_2$ . Tổng số hạt (P, N, E) trong  $R_1$  là 54 hạt và trong  $R_2$  là 52 hạt. Biết  $R_1$  chiếm 25% và  $R_2$  chiếm 75%. Tính nguyên tử khối trung bình của R.

a)  $P + N + E = 52$ ; mà  $P = E$ , vậy  $2P + N = 52$ , các nguyên tử có  $Z < 83$  thì :

$$1 \leq \frac{N}{P} \leq 1,5 \rightarrow P \leq N \leq 1,5P$$

$$3P \leq 52 \leq 3,5P$$

$14,8 \leq P \leq 17,3$  số proton là 1 số nguyên dương nên  $P$  có 3 giá trị 15, 16, 17.

Với  $P = 15 \rightarrow N = 22 \rightarrow A = 37$  (loại vì nguyên tố có  $Z = 15$  là P có  $A = 31$ )

Với  $P = 16 \rightarrow N = 20 \rightarrow A = 36$  (loại vì nguyên tố có  $Z = 16$  là S thì  $A = 32$ )

Với  $P = 17 \rightarrow N = 18 \rightarrow A = 35$  chấp nhận vì nguyên tố có  $Z = 17$  là clo có  $A = 35$ .

b)  $R_2$  có số khối: 35

$R_1$  có số khối: 37

$$\overline{R} = \frac{(37 \times 25) + (35 \times 75)}{100} = 35,5$$

#### CHỦ ĐỀ 5

**Dựa vào cấu hình electron xác định nguyên tố là phi kim hay kim loại**

LỜI DẶN:

Khi viết cấu hình electron trong nguyên tử của các nguyên tố:

- Đối với 20 nguyên tố đầu cấu hình electron phù hợp với thứ tự mức năng lượng.

Ví dụ:  $_{19}K$  Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

- Đối với nguyên tố thứ 21 trở đi cấu hình electron có sự sắp xếp lại. Ví dụ:  $_{26}Fe$ .

Mức năng lượng:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

- Cấu hình electron của một số nguyên tố như Cu, Cr, Pd... có ngoại lệ đối với sự sắp xếp electron lớp ngoài cùng, vì để cấu hình electron bền nhất.

Ví dụ: Cu có  $Z = 29$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

(đáng lẽ  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$ , nhưng electron ngoài cùng nhảy vào lớp trong để có mức bão hòa)

**Xác định nguyên tố là phi kim hay kim loại:**

- Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là kim loại (trừ nguyên tố bo, heli, hidro).

- Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim.

- Các nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng là khí hiếm.

- Các nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng nếu ở chu kì nhỏ là phi kim, ở chu kì lớn là kim loại.



## BÀI TẬP

**29.** Cấu hình electron ngoài cùng của một nguyên tố X là  $5p^5$ . Tỷ lệ số neutron và điện tích hạt nhân bằng 1,3962. Số neutron trong nguyên tử X gấp 3,7 lần số neutron của nguyên tử nguyên tố Y. Khi cho 1,0725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 4,565 gam sản phẩm có công thức XY.

- Viết đầy đủ cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X.
- Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và tên của X, Y
- X và Y chất nào là kim loại? là phi kim?

*GIẢI*

a) Cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tố X:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5$$


$$Z_X = 53 \text{ (số hiệu của X)}$$

$$A_X = N_X + Z_X \text{ mà } \frac{N_X}{Z_X} = 1,3962 \Rightarrow N_X = 74$$

$$A_X = 74 + 53 = 127$$

X thuộc chu kì V, nhóm VIIA tên là iốt và là phi kim.

$$\text{b) } N_Y: \frac{N_X}{N_Y} = 3,7. \text{ Thay } N_X = 74 \text{ ta có } N_Y = 20$$



Vậy cứ 1 mol nguyên tử X cần 1 mol nguyên tử Y

Cứ 1,0725 gam Y tác dụng hết với X  $\Rightarrow$  4,565 g XY.

Vậy lượng X tham gia phản ứng là:

$$4,565 - 1,0725 = 3,4925 \text{ g}$$

$$n_Y = n_X = \frac{3,4925}{127} = 0,0275 \text{ mol}$$

$$M_Y \text{ hay } A_Y = \frac{1,0725}{0,0275} = 39$$

$$Z_Y = A_Y - N_Y = 39 - 20 = 19$$

Cấu hình electron của Y:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ .

Y thuộc chu kì 4 và nhóm IA, có tên là kali và là kim loại hoạt động hoá học mạnh.

30. a) Nguyên tố A không phải là khí hiếm, nguyên tử của nó có phân lớp ngoài cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp ngoài cùng là 4s.

(1) Trong hai nguyên tố A, B: nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim?

(2) Xác định cấu hình electron của A, B và tên của A. Cho biết tổng số electron có trong phân lớp ngoài cùng của A và B bằng 7.

b) Cho các ion  $A^+$  và  $B^{2-}$ , đều có cấu hình electron của khí trơ Ne  $[2s^2 2p^6]$ . Viết cấu hình electron của A, B và dự đoán tính chất hoá học của hai nguyên tố này.

GIẢI

a) Gọi a, b là số electron trong phân lớp ngoài cùng của nguyên tử của nguyên tố A, B.

(1) Cấu hình electron của nguyên tử của nguyên tố

A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^a$ . Nếu  $a = 1$  thì A có 3e ngoài cùng nên là kim loại. Nếu  $a = 4 \rightarrow 6$  thì A có 6  $\rightarrow$  8 electron ở lớp ngoài cùng nên là phi kim hay khí hiếm.

B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^b 4s^1$ . Do  $b = 1$  hoặc 2 nên B có 1  $\rightarrow$  2 electron ngoài cùng nên B là kim loại.

(2)  $a + b = 7$ .

$b = 1$	$a = 6$ (khí hiếm)
B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ hoặc $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$	A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (Ar)
$b = 2$	$a = 5$
B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ hoặc $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$	A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ (Cl)

b) Do cấu hình electron của Ne:  $1s^2 2s^2 2p^6$ , tổng số electron của Ne bằng 10.

$A^+$  do:  $A - 1e = A^+$  giống Ne có 10e nên tổng số electron của A bằng  $10 + 1 = 11$  (e)

$Z = 11$ , nguyên tố nhường 1 electron là kim loại điển hình. Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ .

$B^{2-}$  do:  $B + 2e = B^{2-}$  giống Ne có 10e nên tổng số electron của B =  $10 - 2 = 8$  (e)

$Z = 8$ , nguyên tố nhận electron là phi kim. Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^4$ .

31. Kim loại M có cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ . Hãy cho biết tính chất hoá học của kim loại đó và viết phương trình phản ứng để minh họa. Khi cho kim loại này tác dụng với dung dịch  $CuSO_4$  ta thu được những sản phẩm gì? Viết phương trình phản ứng tạo ra các sản phẩm đó.


(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải, năm 2000)

*GIẢI*

Kim loại M có cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow Z = 11$ .

Kim loại đó là Na. Na là kim loại có tính khử mạnh và có những tính chất của kim loại. Tính chất hoá học: xem SGK Hoá học lớp 12.

Na trong dung dịch  $\text{CuSO}_4$ :



32. Nguyên tử của 2 nguyên tố X, Y lần lượt có electron cuối cùng điền vào phân lớp là  $4p^x$  và  $4s^y$ . Biết số proton bằng số neutron trong hạt nhân nguyên tử Y và X không phải là khí hiếm.

a) Cho biết X và Y là kim loại hay phi kim.

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử của 2 nguyên tố X, Y (biết tổng số electron của hai phân lớp ngoài cùng của nguyên tử 2 nguyên tố bằng 7). Hãy xác định số hiệu nguyên tử của X và Y?

c) X có hai đồng vị là  $X_1$  và  $X_2$ . Tổng số hạt không mang điện  $X_1$  và  $X_2$  là 90. Nếu cho 1,2 gam Y tác dụng với một lượng X vừa đủ thì thu được 5,994 gam hợp chất  $\text{YX}_2$ .

Biết tỉ lệ, số nguyên tử  $X_1$  : số nguyên tử  $X_2 = 605 : 495$ .

(1) Tính  $M_X$  và số khối  $X_1, X_2$ .

(2) Có bao nhiêu nguyên tử  $X_1, X_2$  trong 1 mol nguyên tử X.

*GIẢI*

a) X có phân lớp electron lớp ngoài cùng là  $4p^x$  vậy thuộc chu kì 4 và ở nhóm A:  $2 + x$ ;  $x = 1$  thì X là kim loại,  $x \geq 2$  thì X là phi kim.

Y có phân lớp ngoài cùng là  $4s^y$ . Vậy Y thuộc nhóm A và y chỉ có thể là 1 hoặc 2 vậy Y là kim loại. Trong Y số (p) = số (n) vậy chỉ có canxi phù hợp.




b)  $y + x = 7$  X không phải là khí hiếm

Có 2 trường hợp:

•  $y = 1, x = 6$ . Nếu  $x = 6$  thì khi viết cấu hình electron của X đến phân lớp ngoài cùng là  $4p^6$ . Lớp ngoài cùng là  $4s^2 4p^6$  X là khí hiếm (loại giả thiết này).

•  $y = 2, x = 5$  vậy X có cấu hình lớp ngoài cùng là  $4s^2 4p^5$  X thuộc nhóm VIIA. Vậy nó là brom còn Y là canxi và  $Z_Y = 20 = N_Y, A_Y = 40$ .

Cấu hình electron của:



Khối lượng của X trong hợp chất:  $5,994 - 1,2 = 4,794\text{g}$

Cứ 1 mol nguyên tử Y cần 2 mol nguyên tử X.

$$\text{Số mol nguyên tử Y} = \frac{1,2}{40} = 0,03$$

Số mol nguyên tử X = 2 số mol Y vậy = 0,06

$$M_X = \frac{4,794}{0,06} = 79,9$$

X có 2 đồng vị  $X_1, X_2$ ; gọi khối lượng là  $X_1, X_2$

$$N_{X_1} + N_{X_2} = 90 \quad Z_X = 35$$

$$X_1 = N_{X_1} + Z_X, \quad X_2 = N_{X_2} + Z_X, \quad X_1 + X_2 = 90 + 70 = 160$$

$$M_X = \frac{605X_1 + 495X_2}{1100} = 79,9$$

$$X_1 + X_2 = 90 + 70 = 160$$

Giải ra ta có  $X_1 = 79$  ;  $X_2 = 81$ .

– Trong 1 mol X có  $6,02 \cdot 10^{23}$  nguyên tử

Số nguyên tử:

$$X_1 = \frac{6,02 \cdot 10^{23} \times 605}{1100} = 3,3 \cdot 10^{23}$$

$$X_2 = \frac{6,02 \cdot 10^{23} \times 495}{1100} = 2,709 \cdot 10^{23}$$

**33.** Viết đầy đủ cấu hình electron của các nguyên tử có electron ngoài cùng như sau:

a)  $3p^6 4s^2$  ;      b)  $3s^2 3p^1$  ;      c)  $3s^2 3p^5$

d)  $3d^{10} 4p^5$  ;      e)  $5p^6 6s^1$  ;      f)  $3s^2 3p^6$

– Xác định tên nguyên tố, phân bố electron vào các obitan.

– Nguyên tử nào thuộc kim loại, phi kim, khí hiếm?

*GIẢI*

a)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$  ;  $Z = 20$  là canxi, là kim loại và thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

b)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$  ;  $Z = 13$  là nhôm, là kim loại thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

c)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$  ;  $Z = 17$  là clo, là phi kim thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

d)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$  ;  $Z = 35$  là brom, thuộc chu kì 4, nhóm VIIA.

e)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^1$  ;  $Z = 55$  là nguyên tố Cs, thuộc chu kì 6, nhóm IA.

f)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$  ;  $Z = 18$  là Ar, nguyên tố khí hiếm thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA.

**34. a) (1)** Các ion  $X^+$ ,  $Y^-$  và nguyên tử  $Z$  nào có cấu hình electron  $1s^2 2s^2 2p^6$  ?

(2) Viết cấu hình electron của các nguyên tử trung hoà  $X$  và  $Y$ . Ứng với mỗi nguyên tử hãy nêu một tính chất hoá học đặc trưng và một phản ứng minh hoạ.

*(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP.HCM, đợt 1 năm 1998)*

b) Tổng số proton, neutron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 34.

(1) Viết cấu hình electron.

(2) Xác định tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố đó.


*GIẢI*

a) (1) Các nguyên tử và ion có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6$

$X^+$  là  $Na^+$  ;  $Y^-$  là  $F^-$  và  $Z$  là Ne (neon)

(2) Cấu hình electron của nguyên tử trung hoà và tính chất:

$X$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  là nguyên tố Na, có tính khử mạnh.



$Y$ :  $1s^2 2s^2 2p^5$  là nguyên tố F, có tính oxi hoá mạnh.



b) (1) Gọi số proton là  $Z$ , số neutron là  $N$ .

• *Cách 1:*

$$2Z + N = 34 \quad (1)$$

$$Z = 17 - \frac{N}{2} \text{ nên } Z < 17$$

Mặt khác  $1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5 \Rightarrow N \leq 1,5Z$ . Thay vào (1)

$$3,5Z \geq 34 \quad Z \geq 9,7$$

$$9,7 \leq Z < 17 \quad (Z \text{ là một số nguyên})$$

$$A = 34 - Z$$

Z	10	11	12	13	14	15	16
A	24	23	22	21	20	19	18

Nguyên tố là Na có  $A = 23$  ;  $Z = 11$

Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^4 3s^1$

(2) Nguyên tố là kim loại điển hình, dễ nhường electron để trở thành  $Na^+$ .

Cách 2:

$$2Z + N = 34$$

Mặt khác  $Z \leq N \leq 1,5Z$  nên:

$$9,7 \leq Z \leq 11,3$$

$Z$  là một số nguyên vậy  $Z$  có thể là 10 hoặc 11.

Nếu  $Z = 10 \rightarrow N = 14 \rightarrow \frac{N}{Z} = 1,4$  (loại) vì trái với giả thiết.

Nếu  $Z = 11 \rightarrow N = 12 \rightarrow \frac{N}{Z} = 1,09$  (nhận).

**35. a)** Nguyên tử của nguyên tố hoá học  $X$  có tổng các hạt proton, electron, neutron bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện gấp 1,432 lần số hạt neutron.

(1) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử  $X$ .

(2) Dự đoán tính chất hoá học của  $X$  ở dạng đơn chất. Giải thích theo cấu tạo nguyên tử, phân tử và viết các phương trình hoá học để giải thích.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố mà electron ngoài cùng là  $4s^1$ . Từ đó cho biết số hiệu nguyên tử và số electron hoá trị của chúng.

GIẢI

a) (1)  $N + Z + \text{tổng số } e = 180$ ;  $Z = \text{tổng số electron}$ . Vậy:

$$\begin{cases} N + 2Z = 180 \\ \frac{2Z}{N} = 1,432 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N + 2Z = 180 \\ 2Z = 1,432N \end{cases}$$


$$N + 2Z = 180$$

$$-1,432N + 2Z = 0$$

$$2,432N = 180 \Rightarrow N = 74$$


$$Z = \frac{180 - 74}{2} = 53$$

Nguyên tố X là iot ( $I_2$ ) cấu hình electron của I.



(2) Iot là phi kim yếu nhất trong các halogen

– Có tính oxi hoá:  $H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$  (khí)



– Hidroxit ứng với axit cao nhất có tính axit và có tính oxi hoá.

– Cấu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng thu thêm 1e vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hoá.

– Có hoá trị cao nhất với oxi là VII nên tạo hidroxit có công thức  $HIO_4$ .

b) – Không có electron thuộc 3d:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 \Rightarrow Z = 19$ , có 1 electron hoá trị.

– Có electron thuộc 3d: vì  $4s^1$  chưa bão hoà nên cấu hình electron 3d chỉ có hai trường hợp:

\* Bán bão hoà:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1 \Rightarrow Z = 24$ , có 6 electron hoá trị.

\* Bão hoà:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1 \Rightarrow Z = 29$ , lẽ ra có 11 electron hoá trị theo định nghĩa tuy nhiên do lớp 3 bão hoà nên chỉ có thể thêm 1 hoặc 2 electron thuộc 3d có thể tham gia vào phản ứng hoá học nên số electron hoá trị có thể đến 3.

36. a) Nguyên tố X, cation  $Y^{2+}$ , anion  $Z^-$  đều có cấu hình electron  $1s^2 2s^2 2p^6$ .

(1) X, Y, Z là kim loại hay phi kim? Tại sao?

(2) Viết phản ứng minh họa tính chất hoá học quan trọng nhất của Y và Z.

*(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Tài chính-Kế toán, năm 2000)*

b) (1) Viết cấu hình electron của Cu ( $Z = 29$ ). Trên cơ sở đó giải thích hoá trị của Cu.

(2) Viết phương trình các phản ứng trong sản xuất đồng bằng phương pháp công nghiệp.

*(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1997)*

### GIẢI

a) (1) X là khí hiếm, vì X có cấu hình electron của khí hiếm. Y là kim loại, vì cấu hình electron của Y:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$  – lớp ngoài cùng có 2 electron, thể hiện tính khử.



Z là phi kim, vì cấu hình electron của Z:

$1s^2 2s^2 2p^5$  – lớp ngoài cùng có 7 electron, thể hiện tính oxi hoá.


(2): Tính chất hoá học quan trọng của Y là tính khử:



Ví dụ:  $Y + Cl_2 \rightarrow YCl_2$



- Tính chất hoá học quan trọng của Z là tính oxi hoá:




Ví dụ:  $Z_2 + 2Na \rightarrow 2NaZ$ .

b) (1) Cu (2/8/18/1):  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

- Có 1e ở 4s nên có hoá trị 1.

- Tách thêm 1e ở 3d nên có hoá trị 2.

(2) Trong công nghiệp luyện đồng từ quặng chalcopirit qua các giai đoạn: đốt quặng, nung sản phẩm với than và cát để tách xỉ, sau cùng thổi không khí nén vào sản phẩm nóng chảy.



$FeSiO_3$ ; xỉ được loại bỏ

Cu thu được là đồng thô

Để được Cu nguyên chất thì thực hiện sự điện phân với:

- Cực dương là miếng đồng thô.
- Cực âm là miếng đồng nguyên chất.

Dung dịch chất điện phân là dung dịch  $CuSO_4$ .

Khi điện phân thì đồng thô tan vào dung dịch và sau đó bám vào điện cực âm.



## CHỦ ĐỀ 6

### Dạng bài toán về các số lượng tử của vỏ nguyên tử

**LỜI DẶN:** Các số lượng tử: Để đặc trưng cho trạng thái một electron trong nguyên tử, người ta dùng 4 số lượng tử:

Tên gọi	Kí hiệu	Giá trị	Ý nghĩa																
1. Số lượng tử chính	n	<ul style="list-style-type: none"><li>Nguyên: 1, 2, 3, 4,...</li></ul> <table><tr><td>n</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>Lớp</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td></tr></table>	n	1	2	3	4	5	6	7	Lớp	K	L	M	N	O	P	Q	<ul style="list-style-type: none"><li>Đặc trưng cho mức năng lượng của electron, được dùng để chỉ các lớp electron trong nguyên tử.</li><li>Xác định kích thước và năng lượng của obitan.</li></ul>
n	1	2	3	4	5	6	7												
Lớp	K	L	M	N	O	P	Q												
2. Số lượng tử phụ hay số lượng tử obitan	l	<ul style="list-style-type: none"><li>Nguyên: từ 0 <math>\rightarrow</math> n-1</li></ul> <table><tr><td>l</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5...</td></tr><tr><td>Phân lớp</td><td>s</td><td>p</td><td>d</td><td>f</td><td>g</td><td>h...</td></tr></table>	l	0	1	2	3	4	5...	Phân lớp	s	p	d	f	g	h...	<ul style="list-style-type: none"><li>Đặc trưng cho các phân lớp electron khác nhau.</li><li>Cho biết hình dạng obitan trong không gian.</li></ul>		
l	0	1	2	3	4	5...													
Phân lớp	s	p	d	f	g	h...													
3. Số lượng tử từ m	m	<ul style="list-style-type: none"><li>Nguyên: từ -l, ..., 0, ..., +l</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Đám mây trong không gian không thể định hướng tùy ý mà được xác định bởi số lượng tử từ.</li></ul>																
4. Số lượng tử spin m <sub>s</sub>	m <sub>s</sub>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chỉ có 2 giá trị <math>+\frac{1}{2}</math> (kí hiệu <math>\uparrow</math>) và <math>-\frac{1}{2}</math> (kí hiệu <math>\downarrow</math>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Đặc trưng với điện tử còn có sự quay xung quanh trục riêng theo hai chiều ngược nhau.</li><li>Quy định số obitan trong cùng mức năng lượng, có (2l + 1) giá trị</li></ul>																

Khi viết electron điền vào các ô lượng tử cần nhớ:

- Quy tắc Hund I:** Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau.

- Sắp xếp electron vào obitan có số lượng tử  $m$ :** Hiện nay có 2 cách sắp xếp khác nhau:

Cách 1: Xếp các electron lần lượt chiếm các obitan bắt đầu  $m$  có trị số nhỏ nhất trước.

Cách 2: Xếp các electron lần lượt chiếm các obitan bắt đầu  $m$  có trị số lớn nhất trước.

Khi gặp đề bài: "Xác định nguyên tử có điện tử chót với 4 số lượng tử". Đề bài nên ghi rõ sắp xếp theo cách nào.

- Không thể có hai electron có cùng 4 số lượng tử.** Nói cách khác, mỗi obitan chỉ có thể chứa tối đa 2 electron có spin ngược chiều nhau.

**Các số lượng tử và các obitan nguyên tử**

$n$	$l$	orbitan	$m$	Số orbitan
1	0	1s	0	1
2	0	2s	0	1
	1	2p	-1 0 +1	3
3	0	3s	0	1
	1	3p	-1 0 +1	3
	2	3d	-2 -1 0 +1 +2	5
4	0	4s	0	1
	1	4p	-1 0 +1	3
	2	4d	-2 -1 0 +1 +2	5
	3	4f	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	7

**Số lượng tử và trình tự điền điện tử vào các mức và phân mức trong nguyên tử**

Chu kì	$n$	$l$	$m$	$m_s$	Số e tối đa trong phân mức	Cấu hình e tối đa	Số e tối đa	Số nguyên tử trong chu kì	Thứ tự điền điện tử vào mức và phân mức của nguyên tử các nguyên tố
I	1	0	0	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	2	$1s^2$	2	2	Từ H đến He điền điện tử vào phân mức 1s
II	2	0	0	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	2	$2s^2$	8	8	Từ Li đến Ne điền điện tử vào phân mức 2s, sau đó 2p
		1	-1, 0, +1	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	6	$2p^6$			
III	3	0	0	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	2	$3s^2$	18	8	Từ Na đến Ar điền điện tử vào phân mức 3s, sau đó 3p. Phân mức 3d chưa được điền
		1	-1, 0, +1	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	6	$3p^6$			
		2	-2, -1, 0, +1, +2	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	10	$3d^{10}$			
IV	4	0	0	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	2	$4s^2$	32	18	Từ K đến Kr điền điện tử vào các phân mức theo thứ tự 4s, 3d, 4p. Các phân mức 4d và 4f chưa được điền
		1	-1, 0, +1	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	6	$4p^6$			
		2	-2, -1, 0, +1, +2	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	10	$4d^{10}$			
		3	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	14	$4f^{14}$			
V	5	0	0	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	2	$5s^2$	50	18	Từ Rb đến Xe điền điện tử vào các phân mức theo thứ tự 5s, 4d, 5p. Các phân mức 4f, 5d, 5f và 5g chưa được điền
		1	-1, 0, +1	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	6	$5p^6$			
		2	-2, -1, 0, +1, +2	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	10	$5p^{10}$			
		3	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	14	$5f^{14}$			
		4	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	$+\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{2}$	18	$5g^{18}$			

Trong chu kì VI thứ tự xếp điện tử như sau:

Cs-6s; Ba-6s<sup>2</sup>; La-5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup>; Ce-4f<sup>2</sup>5d<sup>0</sup>6s<sup>2</sup>... Eu-4f<sup>7</sup>5d<sup>0</sup>6s<sup>2</sup>; Gd-4f<sup>7</sup>5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup>; Tb-4f<sup>9</sup>5d<sup>0</sup>6s<sup>2</sup>; ...; Yb-4f<sup>14</sup>5d<sup>0</sup>6s<sup>2</sup>; Lu-4f<sup>14</sup>5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup>; ...; Ir-4f<sup>14</sup>5d<sup>7</sup>6s<sup>2</sup>; Pt-4f<sup>14</sup>5d<sup>9</sup>6s<sup>1</sup>; Au-4f<sup>14</sup>5d<sup>10</sup>6s<sup>1</sup>; ... Rn-4f<sup>14</sup>5d<sup>10</sup>6s<sup>2</sup>6p<sup>6</sup>.

## BÀI TẬP

37. a) Cho nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có electron ngoài cùng có 4 số lượng tử lần lượt sau:

$$\begin{array}{llll} n = 4 & l = 0 & m = 0 & m_s = +1/2 \\ n = 3 & l = 1 & m = -1 & m_s = -1/2 \end{array}$$

Viết cấu hình electron của nguyên tử, xác định nguyên tố kim loại, phi kim? Biết rằng các electron chiếm obitan bắt đầu từ m có trị số nhỏ nhất trước.

b) Hai nguyên tố A và B có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử:


$$A (n = 3; l = 1; m = 0; m_s = -1/2).$$

$$B (n = 4; l = 1; m = -1; m_s = -1/2).$$


(1) Viết cấu hình electron, xác định vị trí của A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn, gọi tên A, B. Biết rằng các electron chiếm obitan bắt đầu từ m có trị số nhỏ nhất trước.

(2) Hai nguyên tố này có thể có những số oxi hoá nào? Vì sao có sự khác biệt (nếu có)?

GIẢI



A chỉ có thể cho số oxi hoá +1 vì có 1e độc thân ở lớp ngoài cùng.




B có thể cho số oxi hoá +2 hay -2 vì có 2e độc thân.

B còn phân lớp 3d trống nên có thể cho thêm số oxi hoá khác nhau sau:

- Số oxi hoá +4 vì khi bị kích thích sẽ tạo 4e độc thân:





- Số oxi hoá +6 vì khi bị kích thích sẽ tạo 6e độc thân



Nguyên tố A là kim loại vì có 1 electron lớp ngoài cùng.

Nguyên tố B là phi kim vì có 6 electron lớp ngoài cùng.



Cấu hình e: A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Vậy A thuộc nhóm VIIA ; chu kì 3 là clo.



B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$ .

Vậy B thuộc nhóm VIA, chu kì 4, là selen.

(2) Số oxi hoá (có thể có) của clo: -1; 0; +1; +3; +5; +7

Số oxi hoá (có thể có) của Se: -2; 0; +2; +4; +6.

Giải thích: Do sự phân bố electron ở lớp ngoài của nguyên tử các nguyên tố.



Ở trạng thái cơ bản: clo có 1e độc thân, Se có 2e độc thân, khi tạo hợp chất với nguyên tố có độ âm điện bé hơn thì chúng thể hiện số oxi hoá âm (-1; -2).

Khi kích thích e lên các obitan d trống thì số e độc thân của Cl lần lượt là 3, 5, 7; Se lần lượt là 4, 6.

Vì vậy, khi kết hợp với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, thì:

Clo sẽ thể hiện số oxi hoá dương và là dương lẻ: +1; +3; +5; +7

Se sẽ thể hiện số oxi hoá dương và là dương chẵn: +2; +4; +6.

38. Trong các số lượng tử sau đây, gán cho một electron, số lượng tử nào chấp nhận được:

	n	l	m	$m_s$
a)	3	0	1	$-\frac{1}{2}$
b)	2	2	0	$+\frac{1}{2}$
c)	4	3	-4	$-\frac{1}{2}$
d)	5	2	2	$+\frac{1}{2}$
e)	3	2	-2	$-\frac{3}{2}$

GIẢI

a) Không được vì khi  $l = 0$  thì  $m = 0$ .

b) Không được vì giá trị lớn nhất của  $l = n - 1$  tức bằng 1 trong trường hợp này.

c) Không được vì giá trị nhỏ nhất của  $m$  là -3 trong trường hợp này.

d) Được.

e) Không được vì trị số  $m_s$  chỉ có thể là  $-\frac{1}{2}$  hay  $+\frac{1}{2}$  mà thôi.

39. a) Viết cấu hình electron và xác định 2 nguyên tử mà electron cuối cùng điền vào đó có 4 số lượng tử:

$$(1) n = 3; l = 1; m = +1; m_s = -\frac{1}{2}$$

$$(2) n = 2; l = 1; m = +1; m_s = -\frac{1}{2}$$



Biết rằng các electron chiếm obitan bắt đầu từ  $m$  có trị số lớn nhất trước.

b) Trong các số lượng tử sau đây, gán cho một electron, các số lượng tử nào có thể chấp nhận được:



Electron	Các số lượng tử			
	$n$	$l$	$m$	$m_s$
a	3	0	1	$-\frac{1}{2}$
b	2	2	0	$+\frac{1}{2}$
c	4	3	-5	$-\frac{1}{2}$
d	5	2	2	$+\frac{1}{2}$
e	3	2	-2	$-\frac{5}{2}$

GIẢI

a) Các electron này được phân bố như sau ở phân lớp p:



Công thức electron của chúng là:



b) a Không đúng vì  $l = 0$  thì  $m = 0$

b Không đúng vì  $n = 2$  thì trị số lớn nhất của  $l = 1$  (vì  $l$  có giá trị từ  $0 \rightarrow (n-1)$ )

c Không đúng vì trị số nhỏ nhất của  $m = -3$

d Đúng

e Không đúng vì trị số của  $m_s$  chỉ có thể là  $+\frac{1}{2}$  hay  $-\frac{1}{2}$ .

40. a) Hãy xác định các giá trị 4 số lượng tử cho từng electron ở trạng thái không kích thích của nguyên tử có cấu hình:  $1s^2 2s^2 2p^2$ .

b) Hãy cho biết số Z của nguyên tố có bộ 4 số lượng tử của electron chót cùng thỏa mãn điều kiện sau:  $n + l = 3$ ;  $m + m_s = +\frac{1}{2}$

GIẢI

$$a) \quad n = 1 \quad l = 0 \quad m = 0 \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \quad 1s^2$$

$$n = 2 \quad l = 0 \quad m = 0 \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \quad 2s^2$$

$$l = 1 \quad m = -1 \quad m_s = +\frac{1}{2} \quad 2p^1$$

$$l = 1 \quad m = 0 \quad m_s = +\frac{1}{2} \quad 2p^2$$

$$b) \quad n + l = 3 \Rightarrow \begin{cases} n = 1 \text{ và } l = 2 : \text{phân lớp } 2d \text{ (không có)} \\ n = 2 \text{ và } l = 1 : \text{phân lớp } 2p \\ n = 3 \text{ và } l = 0 : \text{phân lớp } 3s \end{cases}$$

- Với phân lớp  $2p$ :  $m + m_s = +\frac{1}{2}$ . Suy ra:

+  $m_s = +\frac{1}{2}$  và  $m = 0$ :  $2p^2$  cấu hình electron đầy đủ:  $1s^2 2s^2 2p^2$ : đó là C ( $Z = 6$ )

+  $m_s = -\frac{1}{2}$  và  $m = 1$ :  $2p^6$  cấu hình electron đầy đủ:  $1s^2 2s^2 2p^6$ : đó là Ne ( $Z = 10$ )

- Với phân lớp  $3s \Rightarrow l = 0$  và  $m_s = +\frac{1}{2}$ :  $3s^1$  cấu hình electron đầy đủ:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ : đó là Na ( $Z = 11$ ).

41. Xét nguyên tử của nguyên tố mà electron chót cùng có bốn số lượng tử:

$$a) \quad n = 3 \quad l = 2 \quad m = +1 \quad m_s = +\frac{1}{2}$$

$$b) \quad n = 4 \quad l = 2 \quad m = +1 \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

Có những cấu hình này không? Tại sao? Biết rằng electron chiếm các obitan bắt đầu từ m có trị số nhỏ nhất trước.

GIẢI

$$a) \quad n = 3, l = 2, m = +1, m_s = +\frac{1}{2} \text{ là } 3d^4$$

Cấu hình electron:  $3d^4 4s^2$  nhưng  $3d^5 4s^1$  có cấu hình bán bão hoà, bền hơn nên không có  $3d^4 4s^2$ .

$$b) \quad n = 4, l = 2, m = +1, m_s = -\frac{1}{2} \text{ là } 4d^9$$

Cấu hình electron:  $3d^9 4s^2$  nhưng  $3d^{10} 4s^1$  có cấu hình bão hoà, ở phân lớp d bền hơn  $3d^9 4s^2$ .

## BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

42. a) Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện 25 hạt. Xác định A, N của nguyên tử trên:

Số khối A là: A. 45 B. 40 C. 42 D. Tất cả đều sai

*Đáp số đúng:* D

Số nơtron là: A. 46 B. 45 C. 40 D. 39

*Đáp số đúng:* B

b) Cacbon có 2 đồng vị:  $^{12}_6\text{C}$  và  $^{13}_6\text{C}$ , oxi có 3 đồng vị  $^{16}_8\text{O}$ ,  $^{17}_8\text{O}$  và  $^{18}_8\text{O}$ . Số phân tử  $\text{CO}_2$  có phân tử khối trùng nhau nhiều nhất là bao nhiêu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

*Câu trả lời đúng:* C

c) Ở  $20^\circ\text{C}$ ,  $D_{\text{Au}} = 19,32\text{g/cm}^3$ , giả thiết trong tinh thể Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Biết khối lượng của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử Au là:

A.  $1,48 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

B.  $1,44 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

C.  $1,84 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

D. Tất cả sai

*Đáp số đúng:* B

d) Cho M là kim loại tạo 2 muối  $\text{MCl}_x$ ,  $\text{MCl}_y$  và 2 oxit  $\text{MO}_{0,5x}$ ,  $\text{M}_2\text{O}_y$ . Tỷ lệ khối lượng của clo trong 2 muối là: 1 : 1,173 và của oxi trong 2 oxit là 1 : 1,352. Xác định nguyên tử khối của M.

A. 54,673

B. 56,05

C. 55,743

D. A và C sai.

*Câu trả lời đúng:* C

43. Những điều khẳng định nào sau đây là đúng:

a) Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

b) Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

c) Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

d) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.

e) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.

f) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới là 1:1.

*Câu trả lời đúng:* a, c, d

44. Các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng:

a) Đồng vị là những chất cùng điện tích hạt nhân Z

b) Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân Z

c) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối A

d) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z, nhưng khác nhau về số nơtron.

e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A.

Câu trả lời đúng: d

45. Cho biết tổng số electron trong  $AB_3^{2-}$  là 42, trong hạt nhân A, B số proton bằng số neutron. Xác định số khối của B.

a) 32 ; b) 8 ; c) 24 ; d) 40 ; e) 16.

Đáp số đúng: e

### GIẢI

$AB_3^{2-}$  có 42e, vậy  $AB_3$  có 40e. Theo đầu bài số P = số N. Vậy số P = số E = số N = 40.

Gọi x, y là số proton trong các hạt nhân của A, B ta có:

$$x + 3y = 40, \text{ do đó } y < \frac{40}{3} = 13,3$$

nghĩa là B phải thuộc chu kì 2 và vì là phi kim (tạo anion) nên B chỉ có thể là flo, oxi hoặc nitơ.

- Nếu B là flo ( $y = 9$ ) thì  $AB_3^{2-}$  có công thức  $AF_3^{2-}$ . A có số oxi hoá là +1 và  $x = 40 - 3 \times 9 = 13$ . Đó là số thứ tự của nguyên tố Al, Al có số oxi hoá là +3, trường hợp này loại.

- Nếu B là oxi ( $y = 8$ ) thì  $AB_3^{2-}$  có công thức  $AO_3^{2-}$ . A có số oxi hoá là +4 và  $x = 40 - 3 \times 8 = 16$ . Đó là số thứ tự của S, S có số oxi hoá là +4, trường hợp này đúng. Câu đúng là e.

Vậy A là S và B là O; B có số khối =  $8 + 8 = 16$

- Nếu B là nitơ ( $y = 7$ ) thì  $AB_3^{2-}$  có công thức  $AN_3^{2-}$ , A có số oxi hoá là +7 và  $x = 40 - 3 \times 7 = 19$ .

Đó là số thứ tự của nguyên tố K, K có số oxi hoá là +1, trường hợp này loại.

46. a) Đồng có hai đồng vị là  $^{65}\text{Cu}$  và  $^{63}\text{Cu}$ , nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54 và % các đồng vị là:

(A) 73% và 27%; (B) 27% và 73%; (C) 65% và 63%; (D) 63% và 65%.

Đáp số đúng: B

b) Tỷ lệ khối lượng của một chất khí ở  $54,6^\circ\text{C}$  và  $0^\circ\text{C}$  cùng áp suất p là:

(A) 1,2; (B) 1; (C) 0,8; (D) 2,4; (E) không xác định.

Đáp số đúng: A

47. a) Cho các cấu hình electron của các nguyên tố sau:

A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

C:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$

B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

D:  $1s^2 2s^2 2p^6$ .



Các nguyên tố kim loại là: trường hợp nào sau đây?

- a) A, B, D ;            b) A, C ;            c) B, D;  
d) B, C, D ;           e) A, B, C, D :       f) Tất cả đều sai.

*Câu trả lời đúng: b*

b) Nguyên tố Y có cấu hình electron của phân lớp chót là  $3d^5$ . Vậy nguyên tử Y có số lớp e là:

- A. 3        B. 4        C. 5        D. Tất cả đều sai.

*Câu trả lời đúng: B*

#### GIẢI

a) Từ đặc điểm lớp electron ngoài cùng của các nguyên tử, ta thấy: A là kim loại; B là phi kim; C là kim loại và D là khí hiếm. Vậy (2) A, C đúng.

48. a) Nguyên tử X có cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$  thì ion tạo ra từ X có cấu hình electron như sau:

- (A)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$  ; (B)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$  ;  
(C)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6$ ; (D)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ; (E) Tất cả đều sai.

*Câu trả lời đúng: B*

b) Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai:

- A. Tất cả các nguyên tố có 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.  
B. Tất cả các nguyên tố có 5 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.  
C. Thông thường các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.  
D. Tất cả các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.

*Câu trả lời đúng: A, B*

49. a) Một ion  $X^{n+}$  có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là  $2p^6$ , thì cấu hình electron của lớp vỏ ngoài cùng của X có thể là:

- (A)  $3s^1$     (B)  $3s^2$     (C)  $3p^1$     (D) Cả A, B, C có thể đúng    (E) Tất cả đều sai.

*Câu trả lời đúng: D*

b) Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là  $3d^7$ . Tổng số electron của nguyên tử M là:

- (A) 24        (B) 25        (C) 27        (D) 29.

*Câu trả lời đúng: C*

50. Mệnh đề nào sau đây không đúng:

- a) Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron.  
b) Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số electron.  
c) Lớp ngoài cùng là bền vững khi phụ lớp s chứa tối đa số electron.  
d) Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron.

Mệnh để sai: b, c

51. a) Một ion  $M^n$  có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là  $3p^6$ , vậy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử M là:

- (A)  $3p^5$  hay  $3p^4$ ;      (B)  $4s^1 4s^2$  hay  $4p^1$ ;      (C)  $4s^2 4p^3$ ;  
(D)  $3s^1$  hay  $3s^2$ ;      (E) Tất cả đều sai.

Câu trả lời đúng: A

b) Anion  $X^{2-}$  có cấu hình electron giống  $R^+$  (có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là  $2p^6$ ) thì cấu hình electron của nguyên tử X là:

- (A)  $1s^2 2s^2 2p^2$ ;      (B)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ;      (C)  $1s^2 2s^2 2p^4$ ;  
(D)  $1s^2 2s^2 2p^5$ ;      (E) Tất cả đều sai.

Câu trả lời đúng: C

## BÀI TẬP TỰ GIẢI

52. a) Cho 2 nguyên tố A, B có điện tích hạt nhân nguyên tử lần lượt là 19 và 25.

(1) Viết cấu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tố đó.

(2) Cho biết tính chất hoá học cơ bản của từng nguyên tố.

b) Clo tự nhiên gồm hai loại đồng vị  $^{35}\text{Cl}$  và  $^{37}\text{Cl}$ . Si gồm hai loại đồng vị  $^{28}\text{Si}$  và  $^{29}\text{Si}$ . Hợp chất silic clorua  $\text{SiCl}_4$  gồm có bao nhiêu loại phân tử có thành phần đồng vị khác nhau.

53. a) Một nguyên tố gồm hai đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau là 27 : 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 neutron. Hạt nhân đồng vị thứ hai chứa nhiều hơn 2 neutron.

Xác định nguyên tử khối trung bình của nguyên tố trên.

b) Tổ hợp các obitan nào sau đây là đúng? Tổ hợp nào là không đúng? Vì sao?

- (1)  $n = 3, l = 3, m = 0$   
(2)  $n = 2, l = 1, m = 0$   
(3)  $n = 6, l = 5, m = -1$   
(4)  $n = 4, l = 3, m = -4$

54. a) Cấu hình electron nào sau đây vi phạm quy tắc Hund?

- (A)  $1s^2$ ; (B)  $1s^2 2s^2 2p_x^2$ ; (C)  $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$ ; (D)  $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_z^1$   
(E)  $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$

b) Nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $4s^2 4p^6$ ;  $A = 79$ . Em hãy tính số neutron của nguyên tử thuộc nguyên tố A.

55. a) Tổng số proton, neutron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử (thành phần hạt nhân, các lớp electron) của nguyên tố đó.

b) (1) Cho biết số thứ tự của Ni trong bảng tuần hoàn là 28 và lớp ngoài cùng có 2 electron. Hãy:

- Viết cấu hình electron của  $\text{Ni}^{2+}$ .
- Xác định chu kì và nhóm của nguyên tố Ni trong bảng.

(2) Khối lượng nguyên tử của B bằng 10,81. B trong tự nhiên gồm 2 đồng vị  $^{10}_5\text{B}$  và  $^{11}_5\text{B}$ .

Hỏi có bao nhiêu phần trăm  $^{11}_5\text{B}$  trong axit boric  $\text{H}_3\text{BO}_3$ , cho  $\text{H}_3\text{BO}_3 = 61,84$ .

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Dược Hà Nội, năm 1997)

56. a) Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị. Biết  $^{79}_{35}\text{Br}$  chiếm 54,5%. Tìm số khối của đồng vị thứ 2.

b) Tính thành phần phần trăm các đồng vị của cacbon. Biết cacbon ở trạng thái tự nhiên có 2 đồng vị  $^{12}_6\text{C}$  và  $^{13}_6\text{C}$  có nguyên tử khối trung bình là 12,011.

57. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có 2 electron độc thân ở lớp ngoài cùng với điều kiện: nguyên tử có số  $Z < 20$ .

a) Có bao nhiêu nguyên tố ứng với cấu hình electron nói trên, cho biết tên của chúng.

b) Viết công thức phân tử của các hợp chất có thể có được chỉ từ các nguyên tố nói trên. Viết công thức cấu tạo các hợp chất đó và giải thích liên kết hoá học.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 1997)

58. a) A là một nguyên chất mà phân tử chỉ gồm các tiểu phân với cấu hình electron  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ . Hãy lập luận để tìm công thức phân tử phù hợp của A và gọi tên. Cho biết hoá trị của các tiểu phân cũng như của nguyên tử trong phân tử A không quá hai.

b) Một hợp chất B được tạo bởi một kim loại hoá trị (II) và một phi kim hoá trị I. Tổng số hạt trong phân tử B là 290. Tổng số hạt không mang điện là 110, hiệu số hạt không mang điện giữa phi kim và kim loại là 70. Tỷ lệ số hạt mang điện của kim loại so với phi kim trong B là 2/7. Tìm A, Z của kim loại và phi kim trên.

59. a) Dựa vào cấu hình electron của các nguyên tố sau:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ;      | (2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$                   |
| (3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ; | (4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$ |

Những nguyên tố nào là kim loại ? là phi kim ? là khí hiếm?

b) Cho biết tên obitan ứng với

- (1)  $n = 4 ; l = 3$
- (2)  $n = 3 ; l = 0$
- (3)  $n = 2 ; l = 1$ .





c) Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA bằng 28.

Tính nguyên tử khối của nguyên tố đó.

60. a) Hãy nêu những kết quả thực nghiệm chứng tỏ rằng electron là một phần tử tạo thành nguyên tử?

b) Hiện tượng phóng xạ là gì? Tia X là gì? Tia X sinh ra trong trường hợp nào?

c) Viết phương trình phản ứng hạt nhân theo sơ đồ sau:



61. a) Trong vở một học sinh có ghi một bảng sau:

<i>Các e</i> <i>Số lượng tử</i>	a	b	c	d	d
n	3	4	1	2	2
l	2	2	0	2	-1
m	-1	2	0	0	+1
$m_s$	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0

Hãy chỉ những chỗ sai trong bảng trên.

b) Có bao nhiêu electron ở lớp vỏ ngoài cùng của các ion sau đây:  $\text{Ca}^{2+}$ ;  $\text{Cr}^{3+}$ ;  $\text{Zn}^{2+}$ ;  $\text{S}^{2-}$ ;  $\text{Cl}^+$ . Các ion có cấu tạo tương tự như những nguyên tố nào?

c) Viết cấu hình electron của các ion sau đây:  $\text{Cs}^{+}$ ;  $\text{Al}^{3+}$ ;  $\text{Ni}^{2+}$ ;  $\text{Ba}^{2+}$ ;  $\text{Br}^-$ .

62. a) Hãy sắp xếp (có giải thích) các hạt vi mô dưới đây theo chiều giảm dần bán kính hạt:  $\text{Rb}^+$  ( $z = 37$ ),  $\text{Y}^{3+}$  ( $z = 39$ ),  $\text{Kr}$  ( $z = 36$ ),  $\text{Br}^-$  ( $z = 35$ ),  $\text{Se}^{2-}$  ( $z = 34$ ) và  $\text{Sr}^{2+}$  ( $z = 38$ ).

b) Nguyên tố A không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 4p. Nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp electron ngoài cùng là 4s.

(1) Nguyên tố nào là kim loại ? là phi kim ?

(2) Xác định cấu hình electron của A và B, biết tổng số electron của hai phân lớp ngoài cùng của A và B bằng 7.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y TPHCM, năm 1999)

c) Giữa bán kính hạt nhân (R) và số khối (A) của nguyên tử có mối liên hệ như sau:  $R = 1,5 \cdot 10^{-13} \cdot \sqrt[3]{A}$ . Tính khối lượng riêng của hạt nhân.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1996)

## HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG I

52. b) Trong phân tử  $\text{SiCl}_4$  có bốn nguyên tử clo. Có những trường hợp sau đây xảy ra: 1 nguyên tử  ${}^{38}\text{Si}$  hoặc 1 nguyên tử  ${}^{39}\text{Si}$  kết hợp với 4 nguyên tử  ${}^{37}\text{Cl}$ ; 4 nguyên tử  ${}^{35}\text{Cl}$ ; 1 nguyên tử  ${}^{37}\text{Cl}$  và 3 nguyên tử  ${}^{35}\text{Cl}$ ; 2 nguyên tử  ${}^{37}\text{Cl}$  và 2 nguyên tử  ${}^{35}\text{Cl}$ ; 3 nguyên tử  ${}^{37}\text{Cl}$  và 1 nguyên tử  ${}^{35}\text{Cl}$ . Vậy có 10 phân tử có thành phần đồng vị khác nhau.

53. a) Vì electron có khối lượng rất nhỏ nên về trị số có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối hạt nhân.

Khối lượng nguyên tử của đồng vị thứ nhất:  $(35 + 44) = 79$

Khối lượng nguyên tử của đồng vị thứ hai:  $[(35 + (44 + 2))] = 81$

Theo đầu bài cho tỉ lệ về số nguyên tử giữa hai đồng vị là 27 : 23 nên nguyên tử khối trung bình của nguyên tố là:

$$\frac{(79 \times 27) + (81 \times 23)}{(27 + 23)} = 79,9.$$

54. b) Cấu hình e của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

$$Z = E = 36$$

$$N = 79 - 36 = 43.$$

55. a) Tổng số các hạt trong nguyên tử:  $Z + E + N = 2Z + N = 28$

Vì  $Z < 28$ , nguyên tố có hạt nhân nguyên tử bền nên ta áp dụng công thức

$$1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$$

$$2Z + N = 28 \rightarrow N = 28 - 2Z$$


$$1 \leq \frac{28 - 2Z}{Z} \leq 1,5 \Leftrightarrow 3 \leq \frac{28}{Z} \leq 3,5 \Leftrightarrow \frac{28}{3} \geq Z \geq \frac{28}{3,5}$$

$8 \leq Z \leq 9,33$  do  $Z$  là số nguyên nên  $Z = 8$  hay  $9$ .

- Nếu  $Z = 8 \rightarrow$  Cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^1$  (trái với giả thiết).

- Nếu  $Z = 9 \rightarrow$  Cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^5$ . Nguyên tố phải tìm ở nhóm VIIA (đúng với giả thiết).

b) (1) Ni: (2/8/16/2)



Ni ở chu kì 4; nhóm VIIB.

(2) Đặt  $x$  là thành phần phần trăm của đồng vị  $^{11}_5B$

$(100 - x)$  là thành phần phần trăm của đồng vị  $^{10}_5B$ .

$$\text{Ta có: } \frac{11x}{100} + \frac{10(100 - x)}{100} = 10,81 \Rightarrow x = 81\%$$

$$\text{Vậy \% của } ^{11}_5B \text{ trong } H_3BO_3 = \frac{11 \times 81\%}{61,84} \times 100\% = 14,41\%.$$

56. a) Gọi  $A$  là số khối của đồng vị thứ hai.

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

$$\frac{54,5 \times 79 + (100 - 54,5)A}{100} = 79,91$$

Giải ra ta được  $A = 81$ . Vậy đồng vị thứ 2 của brom là  $^{81}_{35}Br$ .

b) Gọi x là tỉ lệ % của đồng vị  $^{12}\text{C}$

$$\frac{12 \times x + (100 - x)13}{100} = 12,011$$

Giải ra ta được  $x = 98,9\%$ , đồng vị  $^{12}_6\text{C}$  và  $1,1\%$   $^{13}_6\text{C}$ .

57. a) Là các nguyên tố:

$Z = 6 (1s^2 2s^2 2p^2)$   $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$  Nguyên tố C

$Z = 8 (1s^2 2s^2 2p^4)$   $\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$  Nguyên tố O

$Z = 14 (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2)$

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$  Nguyên tố Si

$Z = 16 (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4)$

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$  Nguyên tố S

b) Công thức phân tử của các hợp chất:

$\text{CO}; \text{CO}_2; \text{SiC}; \text{CS}_2; \text{SiO}_2; \text{SO}_2; \text{SO}_3$

58. a) A có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Cấu tạo nguyên tử trong A: 3 lớp, 5 phân lớp, 8e ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền.

Tiểu phân phù hợp:  $\text{Ar}; \text{Cl}^-; \text{S}^{2-}; \text{Ca}^{2+}; \text{K}^+$ .

Công thức phân tử của A:  $\text{Ar}; \text{Cl}_2; \text{S}; \text{Sn}; \text{KCl}; \text{K}_2\text{S}; \text{CaCl}_2; \text{CaS}$

b) Công thức hợp chất B là:

$\text{XY}_2$  (X là kim loại, Y là phi kim)

$$\begin{cases} 2Z_x + N_x + 2(2Z_y + N_y) = 290 & (1) \\ N_x + 2N_y = 110 & (2) \\ 2N_y - N_x = 70 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2Z_x + N_x + 2(2Z_y + N_y) = 290 & (1) \\ N_x + 2N_y = 110 & (2) \\ 2N_y - N_x = 70 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2Z_x + N_x + 2(2Z_y + N_y) = 290 & (1) \\ N_x + 2N_y = 110 & (2) \\ 2N_y - N_x = 70 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2Z_x + N_x + 2(2Z_y + N_y) = 290 & (1) \\ N_x + 2N_y = 110 & (2) \\ 2N_y - N_x = 70 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2Z_x + N_x + 2(2Z_y + N_y) = 290 & (1) \\ N_x + 2N_y = 110 & (2) \\ 2N_y - N_x = 70 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2Z_x + N_x + 2(2Z_y + N_y) = 290 & (1) \\ N_x + 2N_y = 110 & (2) \\ 2N_y - N_x = 70 & (3) \end{cases}$$

Giải 2 phương trình (2) và (3):

$$\begin{cases} N_x + 2N_y = 110 \\ 2N_y - N_x = 70 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_x + 2N_y = 110 \\ 2N_y - N_x = 70 \end{cases}$$

$$4N_y = 180 \Rightarrow N_y = 45 \Rightarrow N_x = 20$$

Thay  $N_y, N_x$  vào phương trình (1):  $2Z_x + 4Z_y = 290 - (20 + 90) = 180$

$$\begin{cases} Z_x + 2Z_y = 90 \\ \frac{Z_x}{2Z_y} = \frac{2}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_x + 2Z_y = 90 \\ 7Z_x - 4Z_y = 0 \end{cases}$$

Giải ra ta được: 
$$\begin{cases} Z_x = 20 \\ Z_y = 35 \end{cases}$$

$A_x = 20 + 20 = 40$  là canxi

$A_y = 45 + 35 = 80$  là brom.

59. a) (1) Kim loại ; (2) Phi kim ; (3) Khí hiếm ; (4) Kim loại

b) (1) 4f ; (2) 3s ; (3) 2p.

c)  $P + E + N = 28$  vì  $P = E$  nên ta có  $2P + N = 28$

Vì  $P \leq N \leq 1,5P$  (do  $Z < 83$  đồng vị bền) nên ta có:


$$\left. \begin{array}{l} 2P + N = 28 \geq 3P \\ 2P + N = 28 \leq 3,5P \end{array} \right\} \Rightarrow 8 \leq P \leq 9,33$$

$P$  là số nguyên nên  $P$  có 2 giá trị là 8 và 9.

- Nếu  $P = 8 \rightarrow N = 12$ . Cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^4$  trường hợp này loại vì không phù hợp với đầu bài.

- Nếu  $P = 9$  thì  $N = 10$ . Cấu hình electron là  $1s^2 2s^2 2p^5$ , nguyên tử nguyên tố này có 7 electron lớp ngoài cùng, phù hợp với đề bài:  $A = 9 + 10 = 19$ .

62. a) Vì tất cả các hạt đều có cấu hình e của Krypton ( $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$ ) nên kích thước phụ thuộc vào  $Z$ , nghĩa là  $Z$  càng lớn thì bán kính hạt càng nhỏ, do đó bán kính của các hạt giảm dần theo thứ tự sau:



b) Nguyên tố A lớp ngoài cùng  $4s^2 4p^x$

$x = 1$  thì A là kim loại.

$3 \leq x \leq 5$  thì A là phi kim.

Nguyên tố B lớp ngoài cùng  $4s^y$  ( $y \leq 2$ )

Vậy B là kim loại.

$x + y = 7$  nếu  $y = 1$  thì  $x = 6$  (loại)

$y = 2$  thì  $x = 5$  (đúng).

Vậy cấu hình electron của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

Cấu hình electron của B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

c) Khối lượng riêng của hạt nhân

Khối lượng của 1 hạt nhân bằng:  $m = \frac{A}{6,023 \cdot 10^{23}}$

Khối lượng riêng của hạt nhân:  $d = \frac{m}{V}$

$$d = \frac{m}{V} = \frac{A}{6,023 \cdot 10^{23} \times \frac{4}{3} \pi (1,5 \cdot 10^{-13})^3 \times (\sqrt[3]{A})^3} \approx 1,17 \cdot 10^{14} \text{ g/cm}^3 = 117 \cdot 10^6 \text{ tấn/cm}^3.$$



## CHƯƠNG II

# BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

### CHỦ ĐỀ 1

Xác định vị trí các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn  
và tính chất hoá học của chúng khi biết điện tích hạt nhân

#### LỜI DẪN:

- Viết cấu hình electron theo mức năng lượng tăng dần.
- Nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:  $ns^a np^b$  thì nguyên tố thuộc nhóm A ( $n$ : số thứ tự của chu kì,  $(a + b)$  = số thứ tự của nhóm).
- Nguyên tử có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là  $(n-1)d^a ns^b$  thì nguyên tố thuộc nhóm B,  $n$  là số thứ tự của chu kì. Tổng số  $a + b$  có 3 trường hợp:

- \*  $a + b < 8$  thì tổng này là số thứ tự của nhóm.
- \*  $a + b = 8$  hoặc 9 hoặc 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIII.
- \*  $[a + b - 10]$  tổng này là số thứ tự của nhóm.

**Chú ý:** Với nguyên tử có cấu hình  $(n-1)d^a ns^b$ ,  $b$  luôn luôn là 2.  $a$  chọn các giá trị từ 1  $\rightarrow$  10. Trừ 2 trường hợp:

- \*  $a + b = 6$  thay vì  $a = 4$ ;  $b = 2$  phải viết là  $a = 5$ ;  $b = 1$  để phân lớp  $d$  bán bão hoà.
- \*  $a + b = 11$  thay vì  $a = 9$ ;  $b = 2$  phải viết là  $a = 10$ ;  $b = 1$  để phân lớp  $d$  bão hoà.

**Ví dụ:** Một nguyên tố có  $Z = 27$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$  phải viết lại

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$ . Nguyên tố này thuộc chu kì 4, thuộc nhóm VIIB.

### BÀI TẬP

63. a) Anion  $X^-$  và cation  $Y^{2+}$  đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là  $3s^2 3p^6$ . Viết cấu hình electron của nguyên tử X và Y. Xác định vị trí (ô, nhóm, chu kì) của X trong bảng tuần hoàn.



(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, năm 1998)

b) Nguyên tố A có cấu hình electron  $1s^2 2s^2 2p^3$ . Hãy xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng tuần hoàn và hợp chất đơn giản nhất với hidro.



### HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) Viết cấu hình electron của Y, X.



– Từ các cấu hình electron trên tìm vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

b) – Tìm tổng số electron từ đó suy ra Z.

– Số lớp electron suy ra chu kì

– Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tố ở nhóm A hay nhóm B.

– Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc nhóm nào?

64. a) Cho biết trong các nguyên tử của các nguyên tố A, B, D, các electron có mức năng lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có cấu hình là:  $2p^3$  (A);  $4s^1$  (B) và  $3d^1$  (D).

(1) Viết lại cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tố trên.

(2) Suy ra vị trí của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.




(Trích đề thi Học kì I Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, năm 1995–1996)

b) Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron [khí hiếm]  $(n-1)d^\alpha ns^1$ .

Định cấu hình electron có thể có của A, từ đó cho biết số thứ tự, chu kì, nhóm của nguyên tố A.

### GIẢI

a) Cấu hình electron đầy đủ của:



b) Cấu hình electron của A: [khí hiếm]  $(n-1)d^\alpha ns^1$  là:

Với  $\alpha = 0 \Rightarrow$  cấu hình A: [khí hiếm]  $ns^1$ , đây là cấu hình các nguyên tố kim loại kiềm (trừ H).

Với  $\alpha = 5 \Rightarrow$  cấu hình A: [khí hiếm]  $(n-1)d^5 ns^1$ , đây là cấu hình các nguyên tố nhóm VIB (tức Cr, Mo, W).

Với  $\alpha = 10 \Rightarrow$  cấu hình A: [khí hiếm]  $(n-1)d^{10} ns^1$ , đây là cấu hình các nguyên tố nhóm IB (tức Cu, Ag, Au).

65. Một hợp chất ion cấu tạo từ ion  $M^{2+}$  và ion  $X^-$ . Trong phân tử  $MX_2$  có tổng số hạt (p, n, e) là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số khối của ion  $M^{2+}$  lớn hơn số khối của ion  $X^-$  là 21. Tổng số hạt trong ion  $M^{2+}$  nhiều hơn trong ion  $X^-$  là 27. Viết cấu hình electron của các ion  $M^{2+}$ ;  $X^-$ .

Xác định số thứ tự, số chu kì, số nhóm, phân nhóm của M và X trong bảng tuần hoàn.

(Trích đề thi học sinh giỏi Hoá học, năm 1994–1995)

**GIẢI**

$MX_2$  trong đó  $M^{2+}$  và  $X^-$ . Gọi các hạt trong M là  $p_m, n_m, e_m$  và các hạt trong X là  $p_x, n_x, e_x$ . Ta có 4 phương trình sau ( $p_m = e_m; p_x = e_x$ ):

$$\begin{cases} (n_m + p_m + p_m - 2) + 2(n_x + p_x + p_x + 1) = 186 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} [(p_m + p_m - 2) + 2(p_x + p_x + 1)] - (n_m + 2n_x) = 54 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} (n_m + p_m) - (n_x + p_x) = 21 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} (n_m + p_m + p_m - 2) - (n_x + p_x + p_x + 1) = 27 \end{cases} \quad (4)$$

Nhóm (1) và (2)

$$(2p_m + 4p_x) + (n_m + 2n_x) = 186$$

$$(2p_m + 4p_x) - (n_m + 2n_x) = 54$$

---


$$2(2p_m + 4p_x) = 240$$

$$\begin{cases} p_m + 2p_x = \frac{240}{4} = 60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_m + 2n_x = 186 - 120 = 66 \end{cases}$$

$$(n_m + p_m) + 2(n_x + p_x) = 126 \quad (5)$$

$$(n_m + p_m) - (n_x + p_x) = 21 \quad (3)$$

---


$$3(n_x + p_x) = 105$$

$$\begin{cases} n_x + p_x = \frac{105}{3} = 35 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} n_m + p_m = 21 + 35 = 56 \end{cases} \quad (7)$$

Thay các giá trị của phương trình (6), (7) vào (1) và (4)

$$\begin{cases} 56 + p_m - 2 + 2(35 + p_x + 1) = 186 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 56 + p_m - 2 - (35 + p_x + 1) = 27 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_m + 2p_x = 186 - 56 + 2 - 70 - 2 = 60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_m - p_x = 27 - 56 + 2 + 35 + 1 = 9 \end{cases}$$

$$3p_x = 51$$

$$p_x = 17 \Rightarrow X \text{ là Cl}$$

$$p_m = 17 + 9 = 26 \Rightarrow M \text{ là Fe.}$$

X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \Rightarrow X$ : chu kì 3, nhóm VIIA.

M:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 \Rightarrow M$ : chu kì 4, nhóm VIIIB.

**66.** a) Cho 3 nguyên tố A, B, C có cấu hình electron lớp ngoài cùng ( $n = 3$ ) tương ứng là  $ns^1; ns^2 np^1; ns^2 np^5$ .

Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, B, C trong bảng tuần hoàn.

b) A, B là 2 nguyên tố ở cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử bằng 32.

Hãy viết cấu hình electron của A, B và của các ion mà A, B có thể tạo thành, tính chất hoá học đặc trưng của 2 nguyên tố này.

#### GIẢI

a) A: có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ; ở chu kì 3 nhóm IA; ô 11.

B: có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ ; ở chu kì 3 nhóm IIIA; ô 13.

C: có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ; ở chu kì 3 nhóm VIIA; ô 17.

b) – Giả sử  $Z_B > Z_A \rightarrow Z_A < \frac{32}{2} = 16 \rightarrow A$  thuộc chu kì II hoặc III  $\rightarrow A, B$  phải ở nhóm A và cách nhau 8 hoặc 18 nguyên tố.

– Lập hệ phương trình trong hai trường hợp cách nhau 8 hoặc 18 nguyên tố.

– Giải hệ phương trình và lập luận theo yêu cầu của đầu bài: thuộc 2 chu kì liên tiếp để loại nghiệm.

– Từ cấu hình electron xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, dự đoán tính chất hoá học của các nguyên tố.

67. a) Cation  $X^+$  có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là  $2p^6$ .

(1) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo obitan của nguyên tố X.


(2) Nguyên tố X thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? Là nguyên tố gì?

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử Be ( $Z = 4$ ) và F ( $Z = 9$ ). Cation  $X^{2+}$  nào có cấu hình electron  $1s^2$ ? Các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $s^2p^6$ ?

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, năm 1998)


#### GIẢI

a) (1) Vì cation  $X^+$  là do nguyên tử X mất đi 1e nên cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  và electron phân bố như sau:



(2) Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IA đó là Na.

b) Cấu hình electron của Be, F



$X^{2+}$ :  $\text{Be}^{2+}$ . Các nguyên tố có cấu hình  $s^2p^6$ : khí hiếm.

68. Hợp chất A có công thức  $MX_x$  trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng; M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có  $N - Z = 4$ ; của X có  $N' = Z'$  trong đó N, N', Z, Z' là số neutron và proton. Tổng số proton trong  $MX_x$  là 58. Hãy xác định tên số khối của M và vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn.

GIẢI

Trong nguyên tử M có:  $N - Z = 4 \rightarrow N = 4 + Z$

Trong nguyên tử X có:  $N' = Z'$

Vì electron có khối lượng rất nhỏ nên về trị số có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân. Vậy nguyên tử khối  $M = Z + N = 2Z + 4$  và khối lượng của nhóm  $xX = 2Z'x$

Ta lại có:  $\frac{2Z + 4}{2Z'x} = \frac{46,67}{53,33} = \frac{7}{8}$  nên ta có:

$$7Z'x - 8Z = 16$$

$$\begin{cases} 7Z'x - 8Z = 16 \\ Z'x + Z = 58 \end{cases}$$

Giải ra ta được:  $Z'x = 32$ .

$$Z = 26$$

Trong hạt nhân của M có:  $Z = 26$ ;  $N = 26 + 4$

Vậy M ở ô 26 (Fe) có số khối  $A = 56$

Vì x có giá trị từ 1 đến 4 nên từ  $Z'x = 32$  ta có:

x	1	2	3	4
Z'	32	16	10,6	8

Chu kì 1: Từ ô 1  $\rightarrow$  ô 2

Chu kì 2: Từ ô 3  $\rightarrow$  ô 10

Chu kì 3: Từ ô 11  $\rightarrow$  ô 18

Chu kì 4: Từ ô 19  $\rightarrow$  ô 36

Vậy nguyên tố có  $Z' = 16$  ở chu kì 3. Nguyên tố X là S

Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

S ở nhóm VIA.

69. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố A có số thứ tự  $Z = 8$ , nguyên tố B có số thứ tự  $Z = 15$ .

a) Viết cấu hình electron của A và của B với đầy đủ các ô lượng tử.


b) Xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm) của A và của B trong bảng tuần hoàn. Cho biết tên A và B.

c) Viết công thức electron của hợp chất có thể có giữa A và B.

Trong mỗi phân tử, lớp electron ngoài cùng của B có bao nhiêu electron?


(Trích đề thi tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM, năm 1998)

GIẢI





Chu kì 2, nhóm VIA. A là oxi.

$Z = 15$



Chu kì 3, nhóm VA. B là photpho.

Hợp chất A và B.



70. a) Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt các loại là 28, trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8 hạt.

Xác định A viết cấu hình electron, nêu vị trí A trong bảng tuần hoàn. Viết các phương trình phản ứng của A với dung dịch rất kiềm loãng,  $KClO_4$  rắn.

b) Nguyên tố R là phi kim nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tỷ lệ giữa phần trăm nguyên tố R trong oxit cao nhất và phần trăm R trong hợp chất khí với hydro bằng 0,5955.

Cho 4,05 gam một kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng hết với đơn chất R thì thu được 40,05 gam muối. Xác định nguyên tố R và M.

GIẢI

a) Đặt số proton, nơtron là Z và N, ta có:


$$\begin{cases} 2Z + N = 28 \\ 2Z - N = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z = 9 \\ N = 10 \end{cases}$$

A là  ${}^{19}_9F$

F ( $Z = 9$ ):  $1s^2 2s^2 2p^5$ : chu kì 2, nhóm VIIA.

Các phản ứng:

A qua dung dịch kiềm loãng:



A tác dụng với  $\text{KClO}_4$  rắn:



b) Đặt hoá trị của R là x. Hợp chất với oxi có công thức  $\text{R}_2\text{O}_x$

Hợp chất với hidro có công thức  $\text{RH}_{8-x}$



Theo đầu bài: 
$$\frac{\frac{2R}{2R + 16x} \cdot R}{R + 8 - x} = 0,5955$$

$$\frac{2R(R + 8 - x)}{(2R + 16x)R} = 0,5955$$

$$2R + 16 - 2x = 1,191R + 9,528x$$

x	4	5	6	7
R	37	51	60	80

R là brom.



$$4,05 \quad 40,05$$

$$2M \times 40,05 = 4,05(2M + 160x)$$

$$80,1M = 8,1M + 648x$$

$$72M = 648x$$

x	1	2	3
M	9	18	27

Nguyên tố R là Br

Nguyên tố M là Al.

71. Ba nguyên tố A, B, C cùng chu kì và là những nguyên tố phổ biến trong vỏ Trái Đất. Hoá trị cao nhất với oxi của B bằng hoá trị của nó với hidro. C là nguyên tố phi kim, khi kết hợp B với C tạo  $\text{BC}_4$ . C tác dụng mãnh liệt với A tạo thành AC. Cho biết tên các nguyên tố này.

*GIẢI*

Đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì, hoá trị cao nhất của các nguyên tố với oxi tăng từ 1 đến 7; hoá trị cao nhất với hidro giảm từ 1 đến 4. Ta có thể biểu diễn như sau:

1	2	3	4	5	6	7
			4	3	2	1

Vậy nguyên tố B có hoá trị cao nhất với oxi bằng hoá trị của nó với hidro phải nhóm IVA.

Khi B kết hợp với C tạo ra hợp chất có công thức  $BC_4$ , suy ra C hoá trị I và thuộc nhóm VIIA (vì C là nguyên tố không kim loại) nhóm halogen. Khi A kết hợp với C tạo hợp chất AC và phản ứng mãnh liệt. Vậy A hoá trị I và thuộc nhóm IA, nhóm kim loại kiềm. Các nguyên tố này lại phổ biến trong vỏ Trái Đất. Vậy các nguyên tố này là: Na, Si, Cl.

Các nguyên tố này thoả mãn 3 dữ kiện của đầu bài:

- Cùng chu kì.
- Phổ biến trong vỏ Trái Đất.
- Hai nguyên tố hoá trị bằng nhau và bằng I, một nguyên tố hoá trị IV.

72. Cho 2 nguyên tố A và B cùng nằm trong một nhóm A của 2 chu kì liên tiếp. Tổng số điện tích hạt nhân của A và B bằng 24.

Hai nguyên tố C và D đứng kế tiếp nhau trong một chu kì; tổng số khối của chúng là 51, số nơtron của D lớn hơn của C là 2, số electron của C bằng số nơtron của nó.

- Xác định các nguyên tố trên và viết cấu hình electron của chúng.
- Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng tính khử.
- Hãy viết công thức các hợp chất giữa chúng, nếu có.
- Ứng với mỗi nguyên tố C hoặc D, hãy viết mỗi cặp oxi hoá - khử tương ứng.

#### GIẢI

a) Xác định các nguyên tố và cấu hình electron của chúng:

- Xác định A, B:

$$\bullet p_B - p_A = 8 \text{ và } p_B + p_A = 24$$

Vậy  $Z_A = 8 \rightarrow A$  là oxi

$$Z_B = 16 \rightarrow B \text{ là lưu huỳnh}$$

$$\bullet Z_B - Z_A = 18 \text{ và } Z_B + Z_A = 24$$

Vậy  $Z_A = 3 \rightarrow A$  là liti,  $Z_B = 21 \rightarrow B$  là Sc, nghiệm này không thoả mãn.

- Xác định C, D:

$$\begin{cases} Z_C + Z_D + N_C + N_D = 51 \\ Z_D - Z_C = 1 \\ N_D - N_C = 2 \\ E_C = N_C = Z_C \end{cases}$$

$$Z_C = 12 \text{ và } N_C = 12 \rightarrow C \text{ là magie}$$

$Z_D = 13$  và  $N_D = 14 \rightarrow D$  là nhôm

– Cấu hình electron:

O:  $1s^2 2s^2 2p^4$

S:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Mg:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Al:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

b) Xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng tính khử:

O, S, Al, Mg

c) Công thức các hợp chất của chúng:

$SO_2$ ,  $SO_3$ ,  $Al_2O_3$ ,  $MgO$ ,  $Al_2S_3$ ,  $MgS$ .

73. a) Tìm vị trí các nguyên tố có  $Z = 19, 31, 32, 35, 36, 24, 25, 29$ , mà không được dùng bảng tuần hoàn.

b) Các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là  $4s^1$ . Tìm vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

GIẢI

a) •  $Z = 19$  có cấu hình electron như sau:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ . Cấu hình lớp ngoài cùng là  $4s^1$ , vậy nguyên tố này thuộc chu kì 4, nhóm IA.

•  $Z = 31$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$ . Cấu hình lớp ngoài cùng là  $4s^2 4p^1$ , nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIIA.

$Z = 32, 35, 36$  làm tương tự.

•  $Z = 24$  có cấu hình electron như sau:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$  phải viết lại

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ .

Nguyên tố này có cấu hình lớp ngoài cùng  $3d^5 4s^1$ , vậy thuộc chu kì 4, nhóm VIB.

b) Các nguyên tố này phải thuộc chu kì 4.

– Nếu thuộc nhóm A thì nguyên tố này có lớp e ngoài cùng  $4s^1$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$   $Z = 19$  chu kì 4 nhóm IA

– Nếu thuộc nhóm B.  $(n-1)d^a ns^b$ ,  $3d^a 4s^2$  trường hợp này xảy ra khi  $a = 5$  hoặc 10. Cấu hình đầy đủ là:



$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ ;  $Z = 24$  chu kì 4, nhóm VIB

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ ;  $Z = 29$  chu kì 4, nhóm IB.

74. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Sn chu kì 5 nhóm IVA

Ta chu kì 6 nhóm VB

Pd chu kì 5 nhóm IVA

Cs chu kì 6 nhóm IA

Ag chu kì 5 nhóm IB

Mo chu kì 5 nhóm VIB.

*GIẢI*

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của:

Sn:  $5s^2 5p^2$

Ta:  $5d^3 6s^2$

Ag:  $4d^{10} 5s^1$

Pb:  $6s^2 6p^2$

Mo:  $4d^5 5s^1$

Cs:  $6s^1$ .

75. Cho hai nguyên tử A và B có cấu hình electron ngoài cùng lần lượt là  $3s^x$  và  $3p^5$ .

a) Xác định số điện tích hạt nhân của A và B. Biết rằng phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron.

b) Dựa vào quy tắc Hund hãy tìm electron độc thân của A và B.

c) Cho các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron ngoài cùng lần lượt là:  $X = (n-1)p^4$ ;  $Y = np^4$ ;  $Z = (n+1)s^1$ , với  $n = 3$ ,  $n = 4$ , xác định X, Y, Z.

*GIẢI*

a) Với nguyên tố B cấu hình là:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ;

$Z = 17$

Với nguyên tố A ở phân lớp 3s chỉ có 1 electron (theo giả thiết của đầu bài), vậy A có cấu hình:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ;

$Z = 11$

b) Số electron độc thân của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  ↑

Số electron độc thân của B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

↑↓ ↑↓ ↑

c)

$X \backslash \text{Giá trị } n$	3	4
X: $(n-1)p^4$	$2p^4$ : chu kì 2, nhóm VIA	$3p^4$ : chu kì 3, nhóm VIA
Y: $np^4$	$3p^4$ : chu kì 3, nhóm VIA	$4p^4$ : chu kì 4, nhóm VIA
Z: $(n+1)s^1$	$4s^1$ : chu kì 4, nhóm IA	$5s^1$ : chu kì 5, nhóm IA

76. Các nguyên tố A, B, C có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng lần lượt là  $3s^2 3p^1$ ,  $3s^2 3p^4$ ,  $2s^2 2p^2$ .

a) Hãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, phân nhóm) và tên của A, B, C.

b) Viết phương trình phản ứng khi cho A lần lượt tác dụng với B và C ở nhiệt độ cao. Gọi tên sản phẩm tạo thành.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, năm 1999)

### GIẢI



a) Xác định vị trí của A, B, C:

– A có cấu hình electron ngoài cùng  $3s^2 3p^1$  ở chu kì 3, nhóm IIIA, số thứ tự 13 – nhôm.

– B có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $3s^2 3p^4$  ở chu kì 3, nhóm VIA, số thứ tự 16 – lưu huỳnh (S).

– C có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $2s^2 2p^2$  ở chu kì 2, nhóm IVA, số thứ tự 6 – C là cacbon.

b) Các phương trình phản ứng:




77. a) Nguyên tố X có số thứ tự 19, nguyên tố Y có số thứ tự 8, nguyên tố Z có số thứ tự 16.

(1) Viết cấu hình electron của các nguyên tố trên.

(2) Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

(3) Giữa các nguyên tố này có thể tạo thành những hợp chất hoá học nào?

b) Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron như sau:



(1) Cho biết vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn.

(2) Những anion nào có cấu hình electron trên?

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1997–1998)

### GIẢI

a) (1) Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ : X ở chu kì 4, nhóm IA. (kali).

(2) Cấu hình electron của Y:  $1s^2 2s^2 2p^4$ : Y ở chu kì 2, nhóm VIA (oxi).

Cấu hình electron của Z:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ : X ở chu kì 3, nhóm VIA (lưu huỳnh).


(3) Các hợp chất tạo thành giữa các nguyên tố:



b) Cấu hình electron của R:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

(1) Vị trí của R: ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA. R là argon.

(2) Các anion có cấu hình như trên:



78. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, lưu huỳnh và đồng là hai nguyên tố có số thứ tự tương ứng là  $Z = 16$  và  $Z = 29$ .


a) Viết cấu hình electron với đầy đủ các ô lượng tử của hai nguyên tố trên.

b) Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của từng nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

(Trích đề thi tuyển sinh Phân hiệu ĐH An ninh và ĐH Cảnh sát, năm 1998)


GIẢI

S có  $Z = 16$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$



Chu kì 3, nhóm VIA



Cu có  $Z = 29$



Chu kì 4, nhóm IB.

79. a) Thế nào là nguyên tố phóng xạ? Cho ví dụ.


b) Hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau:




Từ các phương trình trên, hãy cho biết vị trí (chu kì, nhóm) của A và X trong bảng tuần hoàn.

GIẢI

a) Một nguyên tố được gọi là phóng xạ khi hạt nhân của một số nguyên tử của nguyên tố đó tự phân rã thành hạt nhân của nguyên tử của một nguyên tố khác.



b) Các phản ứng hạt nhân:



Cấu hình electron của A:  $1s^2 2s^2 2p^2$ ; A là cacbon, số thứ tự 6; chu kì 2 nhóm IVA.

Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ; X là lưu huỳnh, số thứ tự 16; chu kì 3 nhóm VIA.

80. a) Nguyên tử của 1 nguyên tố  ${}^Z_A X$  có cấu hình electron là  $5f^3 6d^1 7s^2$ , dựa vào sự sắp xếp electron trong các lớp (không viết cấu hình electron) cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

b) Cho ba nguyên tố A, B, X thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố B thuộc cùng chu kì với A, A và B thuộc hai nhóm liên tiếp, X và A thuộc cùng nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Hidroxit của X, A, B có tính bazơ giảm dần theo thứ tự đó. Nguyên tử A có 2 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s.

(1) Xác định vị trí của A, B, X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.

(2) Viết cấu hình electron của X và B. Nêu tính chất hoá học căn bản của các nguyên tố trên.

### GIẢI

a)

Lớp	1	2	3	4	5	6	7
Số electron	2	8	18	32	21	9	2

$Z = 92$ , X thuộc ô 92, chu kì 7.

Thuộc ô thứ 3 họ actini (vì e ở phân lớp 5f).

b) (1) Cấu hình electron của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Từ cấu hình electron suy ra: A thuộc chu kì 3; nhóm IIA, ô thứ 12.

Vì B thuộc cùng chu kì với A nên B thuộc chu kì 3; A và B thuộc hai nhóm liên tiếp, nên B thuộc nhóm IA hoặc IIIA.

	IA	IIA	IIIA
Chu kì 2		Hoặc X	
Chu kì 3	Hoặc B	A	Hoặc B
Chu kì 4		Hoặc X	

Vì X thuộc cùng nhóm với A nên X thuộc nhóm IIA; X và A ở hai chu kì liên tiếp nên X ở chu kì II hoặc chu kì IV.

Theo đề bài tính bazơ giảm theo thứ tự:

hidroxit của X > hidroxit của A > hidroxit của B

Vậy: X phải thuộc chu kì 4, nhóm IIA và B phải thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

(2) Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

Cấu hình electron của B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

Các nguyên tố A, B, X đều là kim loại, nhưng tính khử của kim loại:  $X > A > B$ .

**81. a)** Một nguyên tử X có tổng số hạt các loại bằng 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 25 hạt.

Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

**b)** Phân tử khối của ba muối  $\text{XCO}_3$ ,  $\text{YCO}_3$ ,  $\text{Y}'\text{CO}_3$  lập thành một cấp số cộng với công sai bằng 16. Tổng số hạt proton, neutron của ba hạt nhân nguyên tử 3 nguyên tố trên là 120.

Xác định tên ba kim loại đó.

*GIẢI*

**a)** Kí hiệu neutron là N, electron là E, proton là Z:

$$\begin{cases} Z + E + N = 115 \\ Z + E - N = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z = E = 35 \\ N = 45 \end{cases}$$

Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

X ở chu kì 4, nhóm VIIA.

**b)**  $M_{\text{XCO}_3} = M_X + 60$

$$M_{\text{YCO}_3} = M_Y + 60 = M_X + 60 + 16 \rightarrow M_Y = M_X + 16$$

$$M_{\text{Y}'\text{CO}_3} = M_{Y'} + 60 = M_X + 60 + 32 \rightarrow M_{Y'} = M_X + 32$$

$$M_X + M_Y + M_{Y'} = 3M_X + 48 \quad (1)$$

$$Z_X + N_X + Z_Y + N_Y + Z_{Y'} + N_{Y'} = 120 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) rút ra:  $M_X = 24$  (Mg)

$$M_Y = 24 + 16 = 40 \text{ (Ca)}$$

$$M_{Y'} = 24 + 32 = 56 \text{ (Fe)}$$

Ba kim loại đó là Mg, Ca, Fe.

**82. a)** X là kim loại hoá trị II và Y là kim loại hoá trị III. Tổng số proton, neutron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một nguyên tử Y là 40.

(1) Hãy xác định tên của các kim loại X và Y.

(2) Một hợp kim chứa 4 kim loại X, Y, Cu và Ag. Hãy trình bày phương pháp để tách riêng từng kim loại.

**b)** Cho biết hàm lượng % của lưu huỳnh trong muối sunfat kim loại R hoá trị III là 24%.

R là kim loại gì? Viết cấu hình electron (dạng obitan) của  $\text{R}^{3+}$ .

*GIẢI*

**a)** (1)  $2Z + N = 36 \Rightarrow Z \leq 12 \Rightarrow X$  thuộc chu kì 2 hoặc 3.

$$1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$$

Suy ra:  $10,3 \leq Z \leq 12$

Z phải là số nguyên dương nên Z phải chọn các nghiệm 11 hoặc 12.

Nếu Z = 11: X có cấu hình electron:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \Rightarrow$  X thuộc chu kì 3, nhóm IA  $\rightarrow$  hoá trị I, loại nghiệm này.

Nếu Z = 12 thì X có cấu hình electron:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \Rightarrow$  X thuộc chu kì 3, nhóm IIA  $\rightarrow$  hoá trị II, nghiệm này phù hợp với đầu bài  $\Rightarrow$  Mg.

(2)  $2Z + N = 40 \Rightarrow Z \leq 13,3 \Rightarrow$  Y thuộc chu kì 2 hoặc 3

$$1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$$

Suy ra:  $11,4 \leq Z \leq 13,3$

Z phải nguyên, dương nên chọn các nghiệm 12 hoặc 13.

Z = 12 là Mg (loại vì hoá trị II)


Z = 13 là Al. Nghiệm này phù hợp với đề bài.

b)  $R_2(SO_4)_3$

$$\frac{3 \times 32}{2R + (96 \times 3)} = \frac{24}{100} \Rightarrow 9600 = 48R + 6912$$

$R = 56 \Rightarrow$  Sắt và  $Z = 26$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$



**83.** a) Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tổng điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32.

Xác định X và Y. Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố đó.

b) Cho nguyên tử của các nguyên tố A, B, D có electron cuối cùng điền vào ứng với bốn số lượng tử:

$$n = 3; l = 0; m = 0 \text{ và } s = +\frac{1}{2}$$

$$n = 3; l = 0; m = 0 \text{ và } s = -\frac{1}{2}$$

$$n = 4; l = 0; m = 0 \text{ và } s = +\frac{1}{2}$$

(1) Viết cấu hình của electron của A, B, D.

(2) Định vị trí của A, B, D trong bảng tuần hoàn.

(3) Viết công thức oxit cao nhất của A, B, D. Xếp các oxit này theo chiều tăng tính bazơ.

**GIẢI**

Như ta đã biết trong bảng hệ thống tuần hoàn:

Chu kì	Số lượng nguyên tố
1	2
2	8
3	8
4	18

Gọi số điện tích hạt nhân của X là  $Z_X$  của Y là  $Z_Y$

Theo đề bài 2 nguyên tố ở hai chu kì kế tiếp nhau nên có thể xảy ra các khả năng sau:

\* X, Y thuộc chu kì 2 và 3, khả năng này loại vì  $Z_X + Z_Y$  lớn nhất chỉ bằng  $10 + 18 = 28$  mà  $28 < 32$ .

\* X, Y thuộc chu kì 3 và 4

$$M_X = 2Z_X, M_Y = 2Z_Y \Rightarrow M_X + M_Y = 64$$

Vậy X và Y thuộc chu kì 3 và hàng lẻ chu kì 4 (Đầu hàng chẵn chu kì 4 là Cu có  $M = 64$ )

$$\begin{cases} Z_X - Z_Y = 8 \\ Z_X + Z_Y = 32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_X = 20 \text{ là canxi} \\ Z_Y = 12 \text{ là magie} \end{cases}$$

Nghiệm này phù hợp với đề bài.

\* X, Y thuộc chu kì 4 và 5, khả năng này loại vì:

Tổng ( $Z_X + Z_Y$ ) nhỏ nhất là:  $19 + 37 = 56$

- b) (1) A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$   
 B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$   
 D:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

- (2) A thuộc chu kì 3, nhóm IA, ô thứ 11  
 B thuộc chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12  
 D thuộc chu kì 4, nhóm IA, ô thứ 19.

	IA	IIA
Chu kì 3	A	B
Chu kì 4	D	

(3) Công thức oxit cao nhất:  $A_2O$ ;  $D_2O$ ;  $BO$

Chiều tăng tính bazơ của các oxit  $BO < A_2O < D_2O$ .

84. a) Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp có tổng số điện tích hạt nhân là 16.

(1) Xác định vị trí của hai nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.

(2) So sánh tính chất hoá học của chúng.

b) Trong bảng tuần hoàn Na thuộc nhóm IA, chu kì 3, Ca thuộc nhóm IIA, chu kì 4.

Hãy xác định electron ngoài cùng của các ion  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ . Chúng giống cấu hình electron của khí hiếm nào?

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) (1) X có  $Z = 4$  thuộc chu kì 2, nhóm IIA

Y có  $Z = 12$  thuộc chu kì 3, nhóm IIA

(2) X, Y đều là kim loại, Y có tính khử mạnh hơn X.

b) – Từ vị trí của Na, Ca trong bảng tuần hoàn ta suy ra cấu hình electron.

– Từ cấu hình electron của nguyên tử, ta có cấu hình của các ion tương ứng và suy ra cấu hình electron của khí hiếm.

85. Lựa chọn nguyên tử hoặc ion hoặc hợp chất thoả mãn điều kiện sau:

a) Ion có bán kính nhỏ nhất:  $\text{Ca}^{2+}$ ;  $\text{Mg}^{2+}$ ;  $\text{Ba}^{2+}$

b) Chất có tính khử mạnh nhất:  $\text{F}^-$ ;  $\text{Cl}^-$ ;  $\text{Br}^-$ ;  $\text{I}^-$

c) Chất có tính bazơ mạnh nhất:  $\text{NH}_3$ ;  $\text{PH}_3$ ;  $\text{SbH}_3$ .

#### GIẢI

a) Ion  $\text{Mg}^{2+}$ ; Mg ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn có bán kính nhỏ nhất so với Ca và Ba ở chu kì 4 và chu kì 6.

b) Ion  $\text{I}^-$  có tính khử mạnh nhất vì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân  $\text{F}^-$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$  bán kính nguyên tử tăng dần nên electron càng xa hạt nhân, do đó  $\text{I}^-$  dễ nhường electron nhất, tức có tính khử mạnh nhất.

c) Chất  $\text{NH}_3$  có tính bazơ mạnh nhất vì N có mật độ âm điện lớn nhất, dễ nhận proton vào nhất. Trong một nhóm, càng đi xuống, hợp chất hidrua càng có tính axit tăng dần nghĩa là càng có tính bazơ giảm.

86. Nguyên tố X có số thứ tự 8, nguyên tố Y có số thứ tự 17 và nguyên tố Z có số thứ tự 19.

a) Viết cấu hình electron của chúng (theo các lớp và các phân lớp).

b) Chúng thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn.

c) Tính chất hoá học đặc trưng chung của các nguyên tố này.

(Trích đề thi tuyển sinh vào Học viện Quan hệ Quốc tế, năm 1997–1998)

#### GIẢI

• X 2/6 (oxi)

– Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^4$

– Vị trí: chu kì 2; nhóm VIA.



- Tính chất hoá học đặc trưng: Tính oxi hoá mạnh.
- Y  $2/8/7$  (Cl)
- Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- Vị trí: chu kì 3; nhóm VIIA.
- Tính chất hoá học đặc trưng: Tính oxi hoá mạnh.
- Z  $2/8/8/1$  (K)
- Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
- Vị trí: chu kì 4; nhóm IA.
- Tính chất hoá học đặc trưng: Tính khử mạnh.

87. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số hiệu nguyên tử của A và B là 31. Xác định số hiệu nguyên tử, viết cấu hình electron của các nguyên tử A và B. Nêu tính chất hoá học đặc trưng của mỗi nguyên tố và viết cấu hình electron của các ion tạo thành từ tính chất hoá học đặc trưng đó.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 1998)



#### GIẢI

Đặt số hiệu nguyên tử của A là Z thì của B là  $Z + 1$ . Ta có:


$$Z + (Z + 1) = 31 \Rightarrow Z = 15$$

Số hiệu nguyên tử của A bằng 15, của B bằng 16.

Cấu hình electron của:



Tính chất đặc trưng của A và B là tính oxi hoá:



Ion  $A^{3-}$  có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Ion  $B^{2-}$  có cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ .

88. Hai nguyên tố X, Y, thuộc hai nhóm kế tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố; Y thuộc nhóm 5. Ở trạng thái đơn chất X, Y không tác dụng được với nhau. Tổng số điện tích dương hạt nhân của hai nguyên tố là 23.

Cho biết cấu tạo vỏ electron của hai nguyên tố và tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố.

#### GIẢI

• Cách 1: Y thuộc nhóm 5. Suy ra X thuộc nhóm 4 hay 6. Nếu Y thuộc chu kì  $\geq 4$  thì  $\Sigma$  điện tử của nguyên tố Y  $\geq 23$  trái với đề bài. Do đó hai nguyên tố có tổng số điện tích dương hạt nhân là 23 phải ở chu kì nhỏ.

– Gọi a, b là số lớp e trung gian (trừ lớp trong cùng và lớp ngoài cùng) của 2 nguyên tố X, Y thì:

a) Nếu X thuộc nhóm 4.

$$(2 + 8a + 4) + (2 + 8b + 5) = 23 \Rightarrow 8(a + b) = 10$$

a và b nguyên dương hoặc bằng không, nên phương trình trên không thỏa mãn.

b) Nếu X thuộc nhóm 6:

$$(2 + 8a + 6) + (2 + 8b + 5) = 23 \Rightarrow 8(a + b) = 8$$

\*  $a = 0 \Rightarrow b = 1 \Rightarrow X \overset{6}{\underset{2}{\text{nguyên tố}}}$  là oxi;  $Y \overset{5}{\underset{2}{\text{nguyên tố}}}$  là photpho.

\*  $a = 1 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow X \overset{6}{\underset{2}{\text{nguyên tố}}}$  là lưu huỳnh;  $Y \overset{5}{\underset{2}{\text{nguyên tố}}}$  là nitơ.

Theo đầu bài ở dạng đơn chất X, Y không tác dụng được với nhau X là S và Y là N.

• Cách 2: Giả sử Y ở chu kì 2. Nhóm 5:

X là S và Y là N. Phù hợp với đầu bài ở trạng thái đơn chất X, Y không phản ứng với nhau.

89. a) Anion  $X^{2-}$  có cấu hình electron lớp ngoài cùng là  $3s^2 3p^6$ . Xác định vị trí của (X) trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm,) và gọi tên (X).

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM, năm 2000)

b) Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron như sau:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ .

Cho biết vị trí R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và tên của nó. Những anion nào có cấu hình electron trên.

#### GIẢI

a)  $X^{2-}$  có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $3s^2 3p^6$ . Vậy X có cấu hình lớp ngoài cùng là  $3s^2 3p^4$


Vị trí nguyên tố X trong bảng tuần hoàn.:

Số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA. X là nguyên tố lưu huỳnh.

b) R:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Vị trí của R: ô thứ 18, chu kì 3, nhóm VIIIA, R là argon.

Các anion có cấu hình như trên:



90. Một hợp chất ion có công thức AB. Hai nguyên tố A, B thuộc hai chu kì kế cận nhau trong bảng tuần hoàn. A thuộc nhóm IA, IIA; còn B thuộc VIA, VIIA. Xác định A, B biết rằng tổng số electron trong AB bằng 20.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM đợt 3, năm 1997)

GIẢI

Xác định A, B.

A thuộc nhóm IA, IIA nên A có điện hoá trị +1 và +2.

B thuộc nhóm VIA, VIIA nên B có điện hoá trị -2 và -1. Ngoài ra  $Z_A + Z_B = 20$ . ( $Z_A, Z_B$  điện tích hạt nhân của A, B) vì A, B thuộc 2 chu kì kế cận nên: nghiệm thích hợp là :

- $Z_A = 11$  thì  $Z_B = 9$  là Na; B là F: AB là NaF
- $Z_A = 12$  thì  $Z_B = 8$  là Mg; B là O: AB là MgO.

91. Nguyên tử X, anion  $Y^-$ , cation  $Z^+$  đều có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là  $4s^2 4p^6$ .

- Các nguyên tố X, Y, Z là phi kim hay kim loại?
- Cho biết vị trí (chu kì, nhóm) của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn.
- Nêu tính chất hoá học đặc trưng nhất của Y và Z, minh họa bằng phản ứng hoá học.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH Sư phạm I và HV Hành chính Quốc gia, năm 2000)



GIẢI

Nguyên tử X, anion  $Y^-$ , cation  $Z^+$  đều có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là  $4s^2 4p^6$ .

- Y là phi kim (lớp ngoài cùng có 7e)  
Z là kim loại (lớp ngoài cùng có 1e:  $5s^1$ )  
X là khí hiếm (lớp ngoài cùng có 8e)
- Với X: chu kì 4, VIIIA.  
Với Y: chu kì 4, nhóm VIIA.  
Với Z: chu kì 5, nhóm IA.



c) Tính chất hoá học đặc trưng của Y:

Tính oxi hoá mạnh:



– Tính chất hoá học đặc trưng của Z:

Tính khử mạnh:



92. Phi kim X có electron sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng số đại số bằng 2,5.

Xác định phi kim X và cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn. Biết rằng electron lần lượt chiếm các orbital bắt đầu từ m có trị số nhỏ trước.

### GIẢI

Cách 1: • X là phi kim

$$• n + l + m + s = 2,5$$

n	1	2	3
l	0	0 1	0 1 2
m	0	0 -1 0 +1	0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2
s	$\pm 1/2$	$\pm 1/2$ $\pm 1/2$	$\pm 1/2$ $\pm 1/2$
		$\boxed{\uparrow} \quad \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow}$	$\boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow}$
		$2s^1 \quad 2p^5$	$3s^2 \quad 3p^4 \quad 3d^6$
Nguyên tố	Li	F	Mg S Fe

Cách 2:

X là phi kim nên  $l = 1$  (không phải H, He)

Khi  $l = 1 \rightarrow m$  có giá trị từ -1, 0, +1 và  $n \geq 2$ .

Như vậy có 3 trường hợp là có nghiệm phù hợp.

$$n = 2; l = 1; m = -1; m_s = +1/2$$

$$2p^1 \rightarrow (B)$$

$$n = 2; l = 1; m = 0; m_s = -1/2$$

$$2p^5 \rightarrow (F, Cl)$$

$$n = 3; l = 1; m = -1; m_s = -1/2$$

$$3p^4 \rightarrow (\text{Lưu huỳnh})$$

B: Chu kì 2, nhóm IIIA, số thứ tự: 5





F: Chu kì 2, nhóm VIIA, số thứ tự: 9

S: Chu kì 3, nhóm VIA, số thứ tự: 16

93. Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng ( $n = 3$ ) tương ứng là  $ns^1$ ,  $ns^2p^1$ ,  $ns^2p^5$ .

a) Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, số thứ tự) của A, M, X trong bảng tuần hoàn.

b) Viết các phương trình phản ứng dạng ion theo sơ đồ sau:



Trong đó  $A_1$ , M, X là các nguyên tố tìm thấy ở phần a.






(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, năm 1995)

**GIẢI**

a) A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  ở chu kì 3; nhóm IA; ô 11 (Na).

M:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ ; ở chu kì 3; nhóm IIIA; ô 13 (Al).

X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ; ở chu kì 3; nhóm VIIA; ô 17 (Cl).



94. Nguyên tố X có số thứ tự 20

a) Hãy viết cấu hình electron của X.

b) Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn, tên của nguyên tố X.

c) Cho biết liên kết hoá học trong hợp chất của X với clo.

d) Viết các phương trình phản ứng xảy ra tại các điện cực khi điện phân dung dịch nước của  $\text{XCl}_2$  dùng bình điện phân có màng ngăn, catot bằng sắt, anot bằng than chì.

Độ pH của dung dịch thay đổi như thế nào trong quá trình điện phân?

*(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2000)*

**GIẢI**

Nguyên tố X có số thứ tự 20:


a) Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$


b) X ở chu kì 4, nhóm IIA, X là nguyên tố Ca.

c) Liên kết hoá học trong hợp chất của X với clo là liên kết ion ( $\text{CaCl}_2$ ).

d) Phương trình phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch nước của  $\text{XCl}_2$  (có màng ngăn, catot (Fe), anot (C)):

Điện phân trong dung dịch nước:





Trong quá trình điện phân pH của dung dịch tăng dần.

## CHỦ ĐỀ 2

**Xác định công thức, tính chất hoá học đơn chất và hợp chất của một nguyên tố khi biết vị trí của nó trong bảng tuần hoàn**

**LỜI DẪN:**

**a) Xác định tính chất hoá học của đơn chất:**

– Các nguyên tố thuộc nhóm A: Nhóm I, II, III là kim loại, nhóm V, VI, VII là phi kim, với nhóm IVA những nguyên tố ở phía trên là phi kim, những nguyên tố phía dưới chuyển dần thành kim loại.

– Các nguyên tố thuộc nhóm B hầu hết là kim loại.

**b) Xác định tính chất hoá học của các hợp chất**

– **Viết công thức các hợp chất của nguyên tố**

Phân nhóm chính	I	II	III	IV	V	VI	VII
Hợp chất với oxi	R <sub>2</sub> O	RO	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	RO <sub>3</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
Hóa trị cao nhất oxi	I	II	III	IV	V	VI	VII
Hợp chất với hiđro	RH rắn	RH <sub>2</sub> rắn	RH <sub>3</sub> rắn	RH <sub>4</sub> khí	RH <sub>3</sub> khí	RH <sub>2</sub> (H <sub>2</sub> R) khí	RH (HR) khí
Hóa trị cao nhất với hiđro	I	II	III	IV	III	II	I
Hợp chất với hiđro	ROH	R(OH) <sub>2</sub>	R(OH) <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> RO <sub>3</sub>	HRO <sub>3</sub> H <sub>3</sub> RO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> RO <sub>4</sub>	HR HRO HRO <sub>3</sub> HRO <sub>4</sub>

– **Viết công thức các hidroxit.**

**Cách viết công thức các hidroxit khi biết công thức oxit.**

+ Nguyên tố không phải oxi trong oxit có hoá trị bao nhiêu thì phải có bấy nhiêu nhóm OH trong phân tử (trừ NO<sub>2</sub>, CO và NO).


+ Trong phân tử hidroxit số nguyên tử H không được quá 3, số nguyên tử O không được quá 4 nếu quá phải trừ đi số nguyên lần phân tử H<sub>2</sub>O khỏi hidroxit đó.

**Thí dụ:** Viết hidroxit tương ứng với oxit Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

Mn có hoá trị VII vậy có 7 nhóm OH là Mn(OH)<sub>7</sub>, số nguyên tử H và O đều quá ngưỡng phải loại 3 phân tử H<sub>2</sub>O, vậy trong hidroxit còn lại 1 nguyên tử H và 4 nguyên tử O. Công thức hidroxit là HMnO<sub>4</sub>.

+ Nếu số nguyên tử oxi và H bằng nhau ta viết theo kiểu lập thừa số chung và hidroxit đó là bazơ:  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ... Nếu số nguyên tử O và H không bằng nhau thì H viết đầu tiên, O sau cùng và đó là các axit.

Dưới đây là dãy điện hoá của kim loại:



## BÀI TẬP

95. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. B thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất, A và B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23.

a) Viết cấu hình electron của A và B.

b) Từ các đơn chất A, B và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế hai axit trong đó A và B có số oxi hoá dương cao nhất.

### HƯỚNG DẪN GIẢI

– Nguyên tố A và B ở 2 nhóm A liên tiếp, B ở nhóm V, A ở nhóm mấy?

– Nguyên tố A và B có ở cùng chu kì không? Nếu ở cùng chu kì có trái với đề ra không?


– Giả sử A, B đều ở chu kì nhỏ, xét các lớp electron của: C ; N ; O.

Si ; P ; S.

Từ đó rút ra trường hợp nào đúng, lưu ý là A và B không phản ứng với nhau ở trạng thái đơn chất.

– Viết các phương trình phản ứng điều chế hai axit từ các đơn chất A, B trong đó A và B có số oxi hoá dương cao nhất.

96. a) Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:



Cho biết  $\text{A}_1$  là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là  $3,2 \cdot 10^{-18}$  culông;  $\text{B}_1$  là oxit phi kim, B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là  $2s^2 2p^2$ .

(Đề thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1998-1999)

b) (1) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hoá trị?

(2) Tại sao Ca chỉ có một trạng thái hoá trị là hoá trị II, còn Fe lại có nhiều trạng thái hoá trị?

(3) Hãy so sánh tính khử của Ca với Fe; tính bazơ của  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  và  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ . Nêu ví dụ để minh họa.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1998-1999)










*Giải*

a) Số điện tích hạt nhân của A =  $\frac{3,2 \cdot 10^{-18}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 20$  (Ca)

Vậy A<sub>1</sub> là CaO.

- B ở chu kì 2, nhóm IVA (B là cacbon). Vậy B<sub>1</sub> là CO<sub>2</sub>.

Các phản ứng:



b) Electron hoá trị là electron gây nên tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố hoá học.

(1) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng.

Với nhóm B: là các electron ở lớp ngoài cùng và một phần ở lớp thứ hai sát lớp ngoài cùng.

(2) Ca (2/8/8/2): có 2 electron hoá trị nên chỉ có một trạng thái hoá trị II.

Fe (2/8/14/2): lớp thứ hai sát lớp ngoài cùng chưa đủ 18 electron nên Fe có hoá trị II hoặc III.


(3) Tính khử Ca > Fe. Ví dụ:



Tính bazơ: Fe(OH)<sub>2</sub> > Fe(OH)<sub>3</sub>. Ví dụ:







97. Cation  $R^+$  có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là  $2p^6$ .

a) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo orbital của nguyên tố R.

b) Nguyên tố R thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? Là nguyên tố gì? Giải thích bản chất liên kết của R với halogen.

c) Tính chất hoá học đặc trưng nhất của R là gì? Lấy 2 phản ứng để minh họa.


d) Từ  $R^+$  làm thế nào để điều chế được R?

e) Anion  $X^-$  có cấu hình electron giống  $R^+$ . Hỏi X là nguyên tố nào? Viết cấu hình electron của nó.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1998)



#### GIẢI

a) Vì cation  $R^+$  là do nguyên tử R mất đi 1e nên cấu hình electron của R:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  và electron phân bố như sau:




b) Nguyên tố R thuộc chu kì 3, thuộc nhóm IA, đó là Na. Khi tác dụng với halogen, ví dụ clo, natri nhường 1e cho clo để biến thành các ion  $\text{Na}^+$  và  $\text{Cl}^-$ , sau đó hai ion này hút nhau theo lực hút tĩnh điện tạo thành phân tử NaCl. Như vậy liên kết ở đây là liên kết ion.

c) Tính chất hoá học đặc trưng nhất của natri là tính khử, dễ nhường electron. Ví dụ:



d) Từ  $\text{Na}^+$  có thể điều chế Na bằng cách điện phân muối NaCl hoặc NaOH nóng chảy chẳng hạn:





e) Vì anion  $X^-$  là do nguyên tử X thu 1 electron mà thành nên cấu hình electron của nó là  $1s^2 2s^2 2p^5$ , đó là flo, anion là  $\text{F}^-$ .

98. Hai nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì nhỏ, X giữ vai trò rất quan trọng trong giới động vật và thực vật, Y có đặc tính là tác dụng với nước thì giải phóng oxi nguyên tử. Hai nguyên tố này tạo thành một hợp chất có thành phần X = 7,8%; Y = 92,2% và có khối lượng phân tử là 154. Tìm công thức của hợp chất đó.

**GIẢI**

X và Y phải thuộc hai trong ba chu kì 1, 2 và 3. Theo đầu bài X là cacbon ở chu kì 2, Y là một nguyên tố không kim loại ở chu kì 3, nó chính là clo vì:



Công thức của hợp chất là  $\text{C}_x\text{Cl}_y$

$$\frac{12x}{35,5y} = \frac{7,8}{92,2} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{276,9}{1106,4} \approx \frac{1}{4}$$

Vậy công thức của hợp chất là  $\text{CCl}_4$ , công thức này thỏa mãn với dữ kiện của đề bài có khối lượng phân tử là 154.

99. a) Phát biểu định luật tuần hoàn theo quan niệm hiện nay.

b) Không dùng bảng tuần hoàn, hãy xếp các nguyên tố có số hiệu sau đây:  $_{12}\text{A}$ ,  $_{19}\text{B}$ ,  $_{20}\text{C}$ ,  $_{13}\text{D}$ .

– Theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

– Viết công thức hidroxit của các nguyên tố trên và xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần.

(Trích đề thi học kì 1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, năm 1995–1996)

**GIẢI**

a) Phát biểu định luật tuần hoàn: “Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân”.

b)  $_{12}\text{A}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ : chu kì 3, nhóm IIA

$_{19}\text{B}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ : chu kì 4, nhóm IA

$_{20}\text{C}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ : chu kì 4, nhóm IIA

$_{13}\text{D}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ : chu kì 3, nhóm IIIA.

Chu kì	Nhóm		
	1	2	3
3		A	D
4	B	C	

– Xếp theo chiều tính kim loại tăng dần: D A C B

– Công thức các hidroxit: BOH, A(OH)<sub>2</sub>, C(OH)<sub>2</sub>, D(OH)<sub>3</sub>

– Xếp theo chiều tính bazơ giảm dần: BOH, C(OH)<sub>2</sub>, A(OH)<sub>2</sub>, D(OH)<sub>3</sub>.

**100.** Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố A, B và có phân tử khối là 76. A và B có số oxi hoá cao nhất trong các oxit là  $+n_0$  và  $+m_0$  và có số oxi hoá âm trong các hợp chất với hydro là  $-n_H$  và  $-m_H$  thỏa mãn các điều kiện  $|n_0| = |n_H|$  và  $|m_0| = 3|m_H|$ .

Hãy thiết lập công thức phân tử của X. Biết rằng A có số oxi hoá cao nhất trong X.

#### GIẢI

Ta biết các nguyên tố nhóm I, II, III trong bảng tuần hoàn không có số oxi hoá âm, chỉ có nhóm IV thì  $|n_0| = |n_H|$ . Vậy A thuộc nhóm IV và công thức cả hai hợp chất là  $AO_2$  và  $AH_4$ .

Vì số electron mà B nhận để trở thành ion âm bằng  $8 - m_0$  (trong đó  $m_0$  là số electron lớp ngoài cùng của B, tức là số oxi hoá dương cao nhất), do đó:

$m_0 = 3(8 - m_0)$  tức  $m_0 = 6$ , nghĩa là B thuộc nhóm VI và công thức các hợp chất là  $BO_3$  và  $H_2B$ . Như vậy X có công thức là  $AB_2$ , và  $M_H < \frac{76}{2} = 38$ , nên B chỉ có thể là oxi ( $M = 16$ ) hoặc lưu huỳnh ( $M = 32$ ).

Suy ra  $M_A = 76 - 2 \cdot 16 = 44$  hoặc  $M_A = 76 - 2 \times 32 = 12$ . Trong nhóm IV không có nguyên tố ứng với khối lượng nguyên tử là 44, do đó A phải là cacbon ( $M = 12$ ) và B là lưu huỳnh.

Vậy công thức của X là  $CS_2$  (cacbon sunfua).

**101.** a) Viết công thức các hidroxit của các nguyên tố thuộc nhóm VA. Nhận xét về sự biến đổi tính chất của các hidroxit.

b) Hãy sắp xếp 6 nguyên tố thuộc chu kì III: lưu huỳnh, magiê, natri, nhôm, photpho và silic theo thứ tự tăng dần tính phi kim.

Viết công thức phân tử và gọi tên 6 loại muối trung tính (ứng với 6 gốc axit khác nhau), có thành phần chỉ gồm các nguyên tố cho trên và oxi; trong số các axit ứng với các muối đó thì axit nào có tính khử, cho thí dụ (phản ứng) minh họa.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học các tỉnh phía Nam, năm 1984)

#### GIẢI

a) Phân nhóm chính nhóm 5 gồm các nguyên tố: N, P, As, Sb, Bi. Các hidroxit:

$HNO_3$	$H_3PO_4$	$H_3AsO_4$	$Sb(OH)_3$	$Bi(OH)_3$
Axit mạnh	Axit trung bình	Axit yếu	Lưỡng tính	Bazơ rất yếu
Các hidroxit có tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần.				



b) Xếp theo tính phi kim tăng dần: Na, Mg, Al, Si, P, S.

Các loại muối:

1.  $NaAlO_2$ : natri aluminat
2.  $Na_2SiO_3$ : natri silicat

3.  $\text{Na}_2\text{S}$ : natri sunfua
4.  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ : natri sunfit
5.  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ : natri sunfat
6.  $\text{Na}_3\text{PO}_4$ : natri photphat

Các axit có tính khử:



102. a) Có các nguyên tố A, B, C, D, E có điện tích hạt nhân tương ứng là +16, +8, +1, +17, +11.

\* Không tra "Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học", viết cấu tạo vỏ điện tử để xác định: số thứ tự nhóm, chu kì và tên của các nguyên tố.

\* Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo một số hợp chất thường có tạo thành từ các nguyên tố trên (axit, bazơ, oxit axit, oxit bazơ, muối axit, muối trung hòa).

b) Lấy các nguyên tố thuộc chu kì 3 và các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn để minh họa quy luật: Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính bazơ của hidroxit yếu dần, đồng thời tính axit mạnh dần. Trong một nhóm A, đi từ trên xuống tính bazơ của các hidroxit mạnh dần.

### GIẢI

a)

6	6	7	1
A 8	B 2	D 8	E 8
2		2	2
(S)	(O)	(Cl)	(Na)
Chu kì 3	Chu kì 2	Chu kì 3	Chu kì 3
Nhóm VI	Nhóm VI	Nhóm VII	Nhóm I
Axit:	$\text{HCl}, \text{H}_2\text{S}, \text{H}_2\text{SO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4, \text{HClO}, \text{HClO}_3, \text{HClO}_4$		
Bazơ:	$\text{NaOH}$		
Oxit axit:	$\text{SO}_2, \text{SO}_3, \text{Cl}_2\text{O}, \text{Cl}_2\text{O}_3, \text{ClO}_2, \text{Cl}_2\text{O}_6, \text{Cl}_2\text{O}_7$		
Oxit bazơ:	$\text{Na}_2\text{O}$		
Muối axit	$\text{NaHS}, \text{NaHSO}_3, \text{NaHSO}_4, \text{NaClO}, \text{NaClO}_3, \text{NaClO}_4$		

b) – Trong chu kì 3 từ trái sang phải tính axit tăng:

$\text{NaOH}$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{H}_2\text{SiO}_3$	$\text{H}_3\text{PO}_4$	$\text{H}_2\text{SO}_4$	$\text{HClO}_4$
kiềm	bazơ yếu	lưỡng tính	axit yếu	axit trung bình	axit mạnh	axit rất mạnh

– Trong nhóm II đi từ trên xuống dưới tính bazơ tăng:

$\text{Be}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Sr}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
lưỡng tính	bazơ yếu	bazơ khá mạnh	bazơ mạnh	bazơ mạnh

103. a) Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức  $\text{RO}_3$ , với hidro nó tạo thành một hợp chất khí chứa 94,12%R. Tìm công thức các hợp chất.

b) Một hợp chất ion cấu tạo từ ion  $\text{M}^+$  và ion  $\text{X}^{2-}$ . Trong phân tử  $\text{M}_2\text{X}$  có tổng số hạt (proton, neutron, electron) là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion  $\text{M}^+$  lớn hơn số khối của ion  $\text{X}^{2-}$  là 23. Tổng số hạt trong ion  $\text{M}^+$  nhiều hơn  $\text{X}^{2-}$  là 31 hạt.

(1) Viết cấu hình electron của các ion  $\text{M}^+$  và  $\text{X}^{2-}$ .

(2) Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần hoàn, những hợp chất hoá học có thể có giữa M và X, nêu tính chất hoá học của các hợp chất đó.

#### GIẢI

a) Oxit cao nhất là  $\text{RO}_3$  nên R có hoá trị VI với oxi, do đó R thuộc nhóm VI. Công thức với hidro  $\text{H}_2\text{R}$ .

$$\text{H}\% = 100 - 94,12 = 5,88\%$$

Gọi R là khối lượng nguyên tử của R ta có tỉ lệ:

$$\frac{\text{R}}{\text{R}\%} = \frac{2 \times 1}{\text{H}\%}. \text{ Thay số vào ta có:}$$

$$\frac{\text{R}}{94,12} = \frac{2}{5,88} \rightarrow \text{R} = 32 (\text{S})$$

Vậy công thức của các hợp chất là  $\text{SO}_3$  và  $\text{H}_2\text{S}$ .

b) (1) Trong nguyên tử M có: Z proton, E electron, N neutron. Trong nguyên tử X có: Z' proton, E' electron, N' neutron.

Ta đã biết  $Z = E$ ;  $Z' = E'$

$$\text{Số khối của M} = Z + N$$

$$\text{Số khối của X} = Z' + N'$$

Trong phân tử  $\text{M}_2\text{X}$  có:

$$4Z + 2N + 2Z' + N' = 140 \quad (1)$$

$$(4Z + 2Z') - (2N + N') = 44 \quad (2)$$

$$(Z + N) - (Z' + N') = 23 \quad (3)$$

Khi tạo thành liên kết thì:  $\text{M} - 1\text{e} \rightarrow \text{M}^+$   
 $\text{X} + 2\text{e} \rightarrow \text{X}^{2-}$

$$\text{Do đó ta có: } (2Z - 1 + N) - (2Z' + 2 + N') = 31$$

$$\text{hay } 2Z - 2Z' + N - N' = 34 \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) rút ra: } Z - Z' = 11 \quad (5)$$

$$\text{Từ (1) và (2) rút ra: } 2N + N' = 48 \quad (6)$$

$$\text{Từ (3), (5) và (6) rút ra: } N = 20 ; N' = 8$$

$$\text{Từ (2), (5) và (6) rút ra: } Z = 19 ; Z' = 8$$

$$(2) \text{ Cấu hình electron của } M^*: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$$

$$X^{2-}: 1s^2 2s^2 2p^6$$

$$M: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$$

Vị trí của M ở ô 19, chu kì 4, nhóm IA là K.

Vị trí của X ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA là oxi.

Hợp chất của M với X là  $K_2O$  là oxit bazơ, dễ tan trong nước, tác dụng với các dung dịch axit, dung dịch muối...

104. a) Một nguyên tố A tạo ra hai loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Xác định nguyên tử khối và gọi tên A.

b) Hợp chất M tạo bởi anion  $Y^{3-}$  và cation  $X^+$ , cả hai ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. A là một nguyên tố trong  $X^+$  có hoá trị âm là  $-a$ , B là một nguyên tố trong  $Y^{3-}$ . Trong các hợp chất, A và B đều có hoá trị dương cao nhất  $a+2$ . Phân tử khối của M bằng 149, trong đó:

$$\frac{M_{Y^{3-}}}{M_{X^+}} > 5$$

Hãy xác lập công thức phân tử của M.

GIẢI

a) Công thức 2 oxit là  $A_2O_x$  và  $A_2O_y$

Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là: 50% và 60%. Vậy tỉ lệ khối lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{16x}{2A} = \frac{50}{50} = 1 \rightarrow 16x = 2A \\ \frac{16y}{2A} = \frac{60}{40} = 1,5 \rightarrow 16y = 3A \end{array} \right\} \rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{3} \\ y = 1,5x$$

Chỉ có cặp x, y sau có thể chấp nhận:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$$

- Nếu chọn  $x = 2$ , ta có  $32 = 2A \Rightarrow A = 16$  (loại), vì  $A = 16$  là oxi.

- Nếu chọn  $x = 4$ , ta có  $64 = 2A \Rightarrow A = 32$  (nhận),  $A$  là S.

Vậy 2 oxit là  $S_2O_4$  và  $S_2O_6$ , giản ước, ta có công thức hai oxit là  $SO_2$  và  $SO_3$ .

b) Xác định công thức của M:

-  $A$  vừa có hoá trị âm, vừa có hoá trị dương  $\rightarrow A$  là phi kim.

-  $A$  và  $B$  có hoá trị cao nhất là  $a + 2$ . Hai nguyên tố thuộc cùng nhóm  $a + 2$ .

- Tổng hoá trị âm và dương về giá trị tuyệt đối bao giờ cũng bằng 8.

-  $M$  có công thức  $X_3Y$  vì tạo bởi  $X^+$  và  $Y^{3-}$  (phân tử trung hòa về điện).

$a + a + 2 = 8 \rightarrow a = 3 \rightarrow A, B$  thuộc nhóm 5.

Theo đầu bài  $\frac{M_{Y^{3-}}}{M_{X^+}} > 5 \rightarrow M_{Y^{3-}} > 5M_{X^+}$  hay:

$$3M_{X^+} + M_{Y^{3-}} > 8M_{X^+} \rightarrow M_{X^+} < \frac{3M_{X^+} + M_{Y^{3-}}}{8} = \frac{149}{8} = 18,6$$

Theo đầu bài  $M_{X^+}$  do 5 nguyên tử tạo nên, vậy khối lượng nguyên tử trung bình  $< \frac{18,6}{5} = 3,72$ , nguyên tử có khối lượng nguyên tử  $< 3$  chỉ có H,  $X^+$  là  $(AH_4)^+$ .

$M_A < 18,6 - 4$  chỉ có N có khối lượng nguyên tử bằng 14, nhóm 5, có hoá trị  $-3$ .  
 $Y^{3-}$  là  $(BC_4)^{3-}$ ;  $M_{Y^{3-}} = 149 - 3 \times 18 = 95$ .

Khối lượng nguyên tử trung bình  $= \frac{95}{5} = 19$ ; C có khối lượng nguyên tử  $< 19$  thuộc nhóm 6 có hoá trị  $-2$  là oxi;  $M_B = 95 - 16 \times 4 = 31$ . (P).

Vậy công thức của M:  $(NH_4)_3PO_4$ .

**105.** A và B là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. B và D là hai nguyên tố kế cận nhau trong cùng một chu kì.

a) A có 6e ngoài cùng, hợp chất (X) của A với hiđro chứa 11,1% hiđro. Tìm khối lượng phân tử của (X), suy ra tên A, B.

b) Hợp chất (Y) có công thức  $AD_2$  trong đó lớp electron ngoài cùng có cấu hình bốn giống khí hiếm. Định tên nguyên tố D. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y).

GIẢI


a) Công thức phân tử của X:  $H_2A$

$$\text{Ta có: } \frac{2}{A} = \frac{11,1}{88,9} \Rightarrow A = 2 \times \frac{88,9}{11,1} \approx 16$$







Vậy A là oxi, B lưu huỳnh.

b) Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay clo. Tuy nhiên chỉ có clo là thoả điều kiện trong hợp chất  $AD_2$  lớp electron ngoài cùng của cả A lẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm.



## BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

106. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau:



Các mệnh đề nào sau đây đúng?

- a) Cả bốn nguyên tố đều thuộc chu kì 3.
- b) Các nguyên tố A, B là kim loại; C, D là phi kim.
- c) Một trong bốn nguyên tố là khí hiếm.
- d) Tất cả các mệnh đề trên đều sai.

*Mệnh đề đúng: (a); (c).*

107. Nguyên tử X có cấu hình electron  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$  thì ion tạo nên từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây:

- a)  $1s^2 2s^2 2p^5$  ;      b)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  ;      c)  $1s^2 2s^2 2p^6$  ;
- d)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$  ;      e) Tất cả đều sai.

*Câu trả lời đúng: c).*

108. Cation  $R^+$  có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp  $3p^6$ . Vậy R thuộc:

- a) Chu kì 2, nhóm VIA ;      b) Chu kì 3, nhóm IA ;
- c) Chu kì 4, nhóm IA ;      d) Chu kì 4, nhóm VIA ;
- e) Không xác định.

*Câu trả lời đúng: câu c).*

109. Cơ cấu bền của khí trơ là:

- a) Cơ cấu bền duy nhất mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc phải đạt được.
- b) Cơ cấu có 2 hay 8 electron lớp ngoài cùng.



- c) Một trong số các cơ cấu bền thường gặp.  
 d) Cơ cấu có một lớp duy nhất 2e hoặc từ 2 lớp trở lên với 8e ngoài cùng.  
 e) Câu c, d đúng.

*Câu trả lời đúng: câu c).*

**110.** Cho các nguyên tố A, B, C, D, E, F lần lượt có cấu hình electron như sau:

A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

D:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

E:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

C:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

F:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

Các nguyên tố nào thuộc cùng chu kì:

a) A, D, F

b) B, C, E

c) C, D

d) A, B, F

e) Cả a, b đều đúng.

*Câu trả lời đúng: câu c).*

**111.** Cho các nguyên tố có cấu hình electron của các nguyên tố sau:

A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$  ;

B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$

C:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$  ;

D:  $1s^2 2s^2 2p^6$

Các nguyên tố là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây:

a) A, B, D ;

b) A, B ;

c) C, D

d) B, C, D ;

e) A, B, C, D ;

h) Tất cả đều sai

*A là kim loại; B là kim loại; C là phi kim; D là khí hiếm. Vậy câu trả lời đúng là b) A, B.*

**112.** Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn:

a) Nguyên tử khối

b) Số lớp electron




c) Thành phần các oxit, hidroxit cao nhất

d) Hoá trị cao nhất với oxi

e) Số electron lớp ngoài cùng.

*Những tính chất biến đổi tuần hoàn: c, d, e.*



**113.** Nguyên tử X có cấu hình electron  $1s^2 2s^2 2p^5$  thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây:



d) Tất cả đều sai.





*Câu trả lời đúng: c).*

114. a) Cấu hình electron của một ion là  $1s^2 2s^2 2p^6$ . Cấu hình electron của nguyên tử tạo ra ion đó có thể là trường hợp nào sau đây?



(E) Tất cả đều đúng.

b) Cấu hình electron của một ion  $X^{2+}$  là  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ . Cấu hình electron của nguyên tử tạo ion đó là:



(E) Tất cả đều sai.

a) Đầu bài không cho biết là ion dương hay âm nên câu trả lời đúng là (E): Tất cả đều đúng.

b) Câu trả lời đúng: (B).

115. a) Cho nguyên tố  ${}_{19}^{39}\text{X}$ . X có đặc điểm





(A) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA.

(B) Số neutron trong nhân nguyên tử X là 20.

(C) X là nguyên tố kim loại có tính khử mạnh, có cấu hình ion  $X^+$  là:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ .

(D) Cả (A), (B), (C) đều đúng.

b) Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E như sau:



Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố là trường hợp nào sau đây:

(a) A, B, C, D, E

(b) A, C, D, E

(c) B, A, C, D, E

(d) Tất cả đều sai.

a) Câu trả lời đúng là (D).

b) Câu trả lời đúng: (a).

## BÀI TẬP TỰ GIẢI

**116.** A và B là hai nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn.

a) Nguyên tử A có 2 electron lớp ngoài cùng và hợp chất X của A đối với hidro có 4,76% khối lượng hidro. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A.

b) Nguyên tử B có 7 electron lớp ngoài cùng, Y là hợp chất của B với hidro. Biết 16,8 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Y 14,6% cho khí C và dung dịch D. Xác định nguyên tử khối của B, tính nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch D.

**117.** a) Cho biết số thứ tự nguyên tố của Ni là 28 và lớp ngoài cùng có 2 electron, hãy:

(1) Viết cấu hình electron của Ni và ion  $Ni^{2+}$

(2) Xác định số thứ tự, chu kì và phân nhóm của Ni.

b) Cho 2 nguyên tố X, Y có bộ 4 số lượng tử của electron chót cùng là:

$$X: n = 3; l = 1; m = 0; m_s = -\frac{1}{2}$$

$$Y: n = 3; l = 0; m = 0; m_s = -\frac{1}{2}$$

Viết cấu hình electron của X, Y. Xác định vị trí X, Y trong bảng tuần hoàn.

**118.** a) Hai nguyên tố A và B cùng nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp. Tổng số proton của 2 nguyên tử thuộc 2 nguyên tố đó là 32. Tìm vị trí của 2 nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn.

b) Cho nguyên tử của 3 nguyên tố A, B và D có electron ngoài cùng có bộ 4 số lượng tử lần lượt sau:

$$n = 4; l = 0; m = 0; m_s = +\frac{1}{2}$$

$$n = 3; l = 1; m = -1; m_s = -\frac{1}{2}$$

$$n = 3; l = 1; m = 0; m_s = -\frac{1}{2}$$

Viết cấu hình electron của 3 nguyên tố trên. Xác định vị trí của A, B và D trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố nào là kim loại, là phi kim?

**119.** Cho 3 nguyên tố sau:

– Nguyên tố A: một nguyên tử của nguyên tố này có tổng số các hạt là 76; tỉ số giữa các hạt không mang điện đối với hạt mang điện là 0,583.

– Nguyên tố B: lớp electron ngoài cùng của nguyên tố này có 1 electron ở lớp thứ 7.

– Nguyên tố C: tổng số electron của mỗi nguyên tử là 17.

Hãy xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và dự đoán nguyên tố nào là phi kim hay kim loại?

**120.** a) Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuần hoàn, có tổng điện tích dương hạt nhân là 25.

Cho biết A, B thuộc chu kì nào? nhóm nào? Gọi tên A, B.





b) Cho một nguyên tố có số thứ tự 20 trong bảng tuần hoàn.

Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố này là kim loại hay phi kim?

121. Có một hợp chất  $MX_3$ , tổng số các hạt là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn của M là 8. Tổng số các hạt trong ion  $X^-$  nhiều hơn trong ion  $M^{3+}$  là 16. Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần hoàn.

122. a) Nguyên tố có tổng số proton, neutron và electron bằng 60 thuộc chu kì mấy trong bảng hệ thống tuần hoàn.

b) Một số nguyên tố có cấu hình electron như sau:



Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm, phân nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn.

123. Ba nguyên tố A, B và C: A thuộc nhóm II, B thuộc nhóm IV và C thuộc nhóm VI. B và C ở cùng một chu kì và hình thành với nhau hai hợp chất: một cháy được và một không cháy. Hợp chất hình thành từ 3 nguyên tố này có rất nhiều trong tự nhiên và được dùng nhiều trong xây dựng. Gọi tên 3 nguyên tố này.

124. a) Viết công thức các hidroxít của các nguyên tố trong chu kì 3. Giải thích sự biến đổi tính chất của các hidroxít đó. Sự biến đổi đó có tuân theo một quy luật nào không?

b) P nằm giữa N, As, Si và S trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Dựa vào vị trí của chúng, nêu lên những tương quan về tính chất hoá học giữa P với những nguyên tố trên.

125. a) Những nguyên tố nào đặc trưng hoá hợp với hidro tạo thành những hợp chất khí? Những nguyên tố đó nằm ở nhóm nào? Những hidrua nào có tính axit?

b) Một nguyên tố khi tác dụng với oxi tạo ra một oxít tạo muối có công thức  $R_2O_5$ , khi tác dụng với hidro tạo ra một hợp chất khí chứa 3,85% hidro. Cho biết tên nguyên tố đó.

126. a) Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố ứng với công thức  $RH_4$ ; oxít cao nhất của nó chứa 53,3% oxi. Gọi tên nguyên tố đó.

b) Giải thích tại sao trong một chu kì tính kim loại giảm từ trái sang phải, trong một nhóm A tính kim loại giảm từ dưới lên trên?

127. a) Xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại yếu dần:

\* Mg, K, Ca, Al, Rb

\* Cs, Rb, Sr, Ca, B.

b) Xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim mạnh dần:

\* Sb, Te, Br, Cl

\* As, Se, S, Cl, F.

128 a) Viết công thức hợp chất:

– Oxít cao nhất

– Hợp chất với hidro

– Hidroxít ứng với oxít cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 3. Cho biết trong các hidroxít chất nào là axit, chất nào là bazơ.

b) Hãy dự đoán tính chất căn bản của hai nguyên tố có số thứ tự là 85 và 87. Nó giống tính chất của nguyên tố nào nhiều nhất?

c) Xác định số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố có số thứ tự là 15, 16, 17. Cho biết công thức, tính chất của oxit cao nhất và hidroxit của các nguyên tố đó.

**129.** a) Cho biết A, B, C là 3 nguyên tố thuộc 3 chu kì liên tiếp và thuộc cùng một phân nhóm, trong đó  $Z_A > Z_B > Z_C$  và  $Z_A + Z_B = 50$ . (Z là số hiệu nguyên tử).

\* Xác định số hiệu nguyên tử của A, B, C.

\* Viết công thức phân tử và công thức electron của các hợp chất của B với clo và với hidro.

b) Nguyên tố R, hợp chất khí với hidro có công thức  $RH_3$ , công thức của oxit cao nhất là:

(1):  $R_2O$  ; (2)  $R_2O_3$  ; (3):  $R_2O_2$  ; (4):  $R_2O_5$

**130.** a) Nguyên tố A có công thức của oxit cao nhất là  $RO_2$ , trong đó % khối lượng của A và O bằng nhau. Nguyên tố A là:

(1) C ; (2) N ; (3) S ; (4) Tất cả đều sai.

b) Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là  $RO_2$ , hợp chất với hidro của R chứa 75% khối lượng R; R là:

(1) C ; (2) S ; (3) Cl ; (4) Si.

**131.** a) Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6 gam M tác dụng hết với nước thu được 6,16 lít khí hidro đo ở  $27,3^\circ C$ , 1atm, M là:

(1) Be ; (2) Mg ; (3) Ca ; (4) Ba.

b) Cation  $R^+$  có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp  $3p^6$ , vậy R thuộc:

(1) Chu kì 2, nhóm VIA

(2) Chu kì 3, nhóm IA

(3) Chu kì 4, nhóm IA

(4) Chu kì 4, nhóm VIA.

**132.** a) Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn dựa vào các cấu hình electron sau:

(1)  $1s^2 2s^2 2p^3$

(2)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

(3)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

b) Cấu tạo lớp vỏ electron lớp ngoài cùng của một số nguyên tố có dạng như sau:

$2s^2 2p^5$  ;  $3s^2 3p^4$  ;  $3p^6 4s^1$  ;  $3d^1 4s^2$

Chỉ rõ vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

**133.** a) Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong chu kì nhỏ và chu kì lớn khác nhau như thế nào? Lấy chu kì 3 và chu kì 4 làm dẫn chứng. Giải thích sự khác nhau đó.

b) Những nguyên tố nào đặc trưng hoá hợp với hidro tạo thành hợp chất khí? Những nguyên tố đó ở nhóm nào?

**134.** Nguyên tố X có số thứ tự là 26 trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

a) Chu kì 3, nhóm VIA

c) Chu kì 4, nhóm VIB

b) Chu kì 4, nhóm VIIIB

d) Tất cả đều sai.

135. Nguyên tố A ( $Z = 13$ ); B ( $Z = 16$ )

- a) Tính kim loại của A > B
- b) Bán kính nguyên tử của A > B
- c) Độ âm điện của A < B.
- d) Tất cả đều đúng

136. Trong kí hiệu  ${}_Z^AX$  thì:

- a) A là số khối luôn luôn nguyên và là khối lượng nguyên tử gần đúng của X.
- b) Z là số electron ở lớp vỏ.
- c) Z là số proton trong hạt nhân
- d) Z là số điện tích hạt nhân
- e) Tất cả 4 câu trên đều đúng.

137. Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác:

Trong chu kì:

- a) Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
- b) Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.
- c) Tất cả đều có cùng số lớp electron.
- d) Đi từ trái sang phải, độ âm điện tăng dần.

138. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức  $RH_3$ . Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

- a) Nitơ; b) Photpho; c) Lưu huỳnh; d) Cacbon.


## HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG II

116. a) Vì A thuộc nhóm A và có hai electron ở lớp ngoài cùng nên A thuộc IIA. Vì vậy X có công thức:  $AH_2$

Ta có:  $\frac{2}{A+2} \times 100 = 4,76\% \Rightarrow A = 40$ . Vậy A là Ca; X là  $CaH_2$ .

b) B có 7 electron lớp ngoài cùng và B thuộc nhóm A nên B thuộc nhóm VIIA. Hợp chất của B với hidro có công thức: HB.

Số mol của  $CaH_2$  là  $16,8 : 42 = 0,4$  mol



Ta có:  $\frac{200 \times 14,6}{100} = (1 + B)0,8 \Rightarrow B = 35,5$ . Vậy B là Cl

Khối lượng chất tan  $CaCl_2$  là  $111 \times 0,4 = 44,4$ gam



Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng:

$$200 + 16,8 - 0,8 \times 2 = 215,2 \text{ gam}$$

Vậy nồng độ % của dung dịch thu được:


$$\frac{44,4}{215,2} \times 100\% = 20,63\%.$$

117. a) Cấu hình electron:



Ni ở chu kì 4 ở nhóm VIII, thuộc nhóm B.

b) X:  $3p^5 \Rightarrow$  cấu hình  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$



X: chu kì 3, ô số 17, nhóm VIIA

Y: chu kì 3, ô số 12, nhóm IIA

118. a) Hai nguyên tố ở 2 chu kì liên tiếp, lại cùng nhóm A thì số proton hơn kém nhau là 8 hoặc 18.


Nếu số proton hơn nhau là 8

$$Z_B - Z_A = 8$$

$$Z_B + Z_A = 32$$

$$\frac{2Z_B = 40}{Z_B = 20} \Rightarrow \begin{matrix} Z_B = 20 \\ Z_A = 12 \end{matrix}$$

- Cấu hình electron của B.



B thuộc chu kì 4 nhóm IIA

- Cấu hình electron của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

A thuộc chu kì 3, nhóm IIA

Vậy nghiệm  $Z_B = 20$  Canxi


$Z_A = 12$  Mg thỏa mãn đầu bài

Cặp 2:  $Z_B - Z_A = 18$


$$Z_B + Z_A = 32$$

$$\frac{Z_B = 25}{Z_B = 25} \Rightarrow Z_A = 7$$

- Cấu hình electron của A:  $Z_A = 7$



- Cấu hình electron của B:  $Z_B = 25$





Cặp nghiệm này loại vì trái với giả thiết của đầu bài.

b) A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

D:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Nguyên tố A: số thứ tự 19 ở chu kì 4, nhóm IA là kim loại.

Nguyên tố B: số thứ tự 16 ở chu kì 3, nhóm VIA là phi kim.

Nguyên tố D: số thứ tự 17 ở chu kì 3, nhóm VIIA là phi kim.

119. Dựa vào dữ kiện của đề cho tìm thấy:

Nguyên tố A: số thứ tự 24, chu kì 4, nhóm VIB, là kim loại

Nguyên tố B: số thứ tự 87, chu kì 7, nhóm IA, là kim loại

Nguyên tố C: số thứ tự 35, chu kì 4, nhóm VIIA, là phi kim.


120. a) Theo đầu bài 2 nguyên tố kế tiếp nhau, nên cách nhau một điện tích dương. Giả sử  $Z_A, Z_B$

$$Z_A = \frac{25-1}{2} = 12; Z_B = 13$$

Cấu hình electron của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ; A ở chu kì 3, nhóm IIA.

Cấu hình electron của B:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ ; B ở chu kì 3, nhóm IIIA.

b) Theo đầu bài cho  $Z = 20$ , nguyên tử trung hoà về điện nên nguyên tử có 20 electron. Do đó cấu hình e là:



Vậy nguyên tố ở chu kì 4, nhóm IIA.

Có 2 electron hoá trị nên nguyên tố này là kim loại mạnh.

121. Trong M có Z proton; E electron; N nơtron.

Trong X có Z' proton; E' electron; N' nơtron. Hợp chất là  $MX_3$ .

Vì  $Z = E$  nên:  $(2Z + N) + (6Z' + 3N) = 196$

$$(2Z + 6Z') - (N + 3N') = 60$$

$$(Z' + N') - (Z + N) = 8$$

$$(2Z' + N' + 1) - (2Z + N - 3) = 16$$

Giải hệ 4 phương trình trên ta có:  $Z = 13$ ;  $N = 14$  (Al)

$$Z' = 17; N' = 18$$
 (Cl)

M:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ : chu kì 3, nhóm IIIA



X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ : chu kì 3, nhóm VIIA

122. a) Vì số proton (Z) = số electron

$$2Z + N = 60 \Rightarrow Z \leq \frac{60}{3} = 20 \Rightarrow X \text{ thuộc chu kì 2, 3 hoặc 4.}$$

$$\text{Nên có: } 1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$$

Suy ra:  $17,1 \leq Z \leq 20$

Vậy nguyên tố này phải thuộc chu kì 4 và nếu thuộc chu kì 3, có  $Z = 18$  là Ar.

Tổng số các hạt trong Ar là  $18 + 40 = 58$  (loại)

$Z = 19$ : tổng số các hạt:  $39 + 19 = 58$  (loại)

$Z = 20$ : tổng số các hạt:  $20 + 40 = 60$

Vậy  $Z = 20$  là canxi, chu kì 4.

134. Câu b) đúng.

135. Câu d) đúng.

136. Câu e) đúng.

137. Câu trả lời chưa chính xác: b)

138. Câu a) đúng.

CHỦ ĐỀ 1

Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo phẳng của phân tử



BÀI TẬP

139. a) Viết công thức cấu tạo phẳng của một số hợp chất sau:  $\text{H}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HAlO}_2$ ,  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  và  $\text{NaHSO}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{S}_3$ .



b) Viết công thức cấu tạo của một số hợp chất sau: Fluorit, Cryolit, Fluor apatit.

GIẢI

a)



b)



140. a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo các hidroxit tạo bởi ba nguyên tố clo, hidro và oxi. So sánh tính axit của chúng theo chiều tăng số oxi hoá của clo.

b) Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo không gian của phân tử metan  $\text{CH}_4$ .


GIẢI

CTPT	Công thức cấu tạo	
$\text{HClO}$	$\text{H}-\text{O}-\text{Cl}$	
$\text{HClO}_2$	$\text{H}-\text{O}-\text{Cl}=\text{O}$	$\text{H}-\text{O}-\text{Cl}\rightarrow\text{O}$
$\text{HClO}_3$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{Cl} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \nearrow \\ \text{H}-\text{O}-\text{Cl} \\ \searrow \\ \text{O} \end{array}$
$\text{HClO}_4$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{Cl}=\text{O} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\   \\ \text{H}-\text{O}-\text{Cl}\rightarrow\text{O} \\   \\ \text{O} \end{array}$

Chiều tăng tính axit  $\text{HClO}^{+1} < \text{HClO}_2^{+3} < \text{HClO}_3^{+5} < \text{HClO}_4^{+7}$

Do số oxi hoá của clo tăng từ +1 đến +7 nên tính axit tăng dần.


b) Phân tử  $\text{CH}_4$  có 4 liên kết  $\sigma$  (giữa nguyên tử C và 4 nguyên tử H) từ tâm hướng về 4 đỉnh của một tứ diện đều, mỗi góc  $\text{HCH} = 109^\circ 28'$  và toàn bộ phân tử không ở trên một mặt phẳng.




141. Giải thích tại sao nitơ là một khí tương đối trơ ở nhiệt độ thường? Viết công thức electron, công thức cấu tạo của  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{HNO}_3$ .


GIẢI

Do cấu hình electron của nitơ là  $1s^2 2s^2 2p^3$  và sự phân bố electron ở các obitan:



Mỗi nguyên tử nitơ có 3e độc thân, nên 2 nguyên tử nitơ liên kết với nhau thành phân tử  $\text{N}_2$  bằng một nối ba  $\text{N}\equiv\text{N}$  rất bền, năng lượng liên kết lớn, chỉ ở nhiệt độ cao thì phân tử nitơ mới bị phân tích thành 2 nguyên tử nitơ.





**142.** Viết công thức cấu tạo và công thức electron của các phân tử

- Các oxit:  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Cl}_2\text{O}_7$ ,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CO}_2$ .
- Các hidroxit:  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ,  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HMnO}_4$ .
- Các muối:  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{NaHSO}_4$ ,  $\text{CaHPO}_4$ ,  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ .
- Hợp chất với hidro:  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CH}_4$ .

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

– Nếu là hợp chất có hai nguyên tố hãy tính hiệu số độ âm điện để xét xem hợp chất đó có liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị. Hiệu số độ âm điện  $\Delta\chi > 1,7$ , hợp chất có liên kết ion ( $\Delta\chi$  đọc là delta khapa).

Ví dụ:  $\text{MgCl}_2$   $\Delta\chi = 1,8$  hợp chất này có liên kết ion, biểu diễn công thức cấu tạo:  $\text{Mg}^{2+}2\text{Cl}^-$ .

Nếu liên kết cộng hoá trị biểu diễn đôi điện tử dùng chung bằng các gạch nối giữa 2 nguyên tử (chú ý nếu nguyên tử nào mà sau khi dùng chung điện tử có quá 8 electron thì phải biểu diễn liên kết phối trí, trừ một số trường hợp ngoại lệ).

– Hợp chất hidroxit: các hidroxit dù là axit hay bazơ thì trong phân tử đều có nhóm OH, có bao nhiêu nguyên tử H có bấy nhiêu nhóm OH. Trong bazơ OH dính với kim loại. Trong axit OH dính với phi kim.

– Hợp chất muối: muối là hợp chất phân tử gồm cation kim loại và anion gốc axit. Gốc axit là phần còn lại của phân tử axit sau khi loại bỏ 1 phần hay toàn bộ số nguyên tử H.

Vậy để viết công thức cấu tạo của muối trước hết hãy viết công thức cấu tạo của axit, rồi bỏ nguyên tử H và thay thế H bằng kim loại. Chú ý kim loại hoá trị 1 thay cho 1 nguyên tử H. Nếu kim loại hoá trị 2 hoặc 3 thì thay cho 2 hoặc 3 nguyên tử H. Từ hướng dẫn giải các bạn tự viết công thức cấu tạo và công thức electron của các chất trên.

**143.** Trong hợp chất  $\text{AB}_2$ , A và B là hai nguyên tố ở cùng một nhóm A thuộc hai chu kì liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 24.

- Viết cấu hình electron của A, B và các ion  $\text{A}^{2-}$ ,  $\text{B}^{2-}$ .
- Viết công thức cấu tạo của hợp chất  $\text{AB}_2$  và cho biết trong phân tử đó có các loại liên kết nào?

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TP HCM, năm 1996)

#### GIẢI

- Cấu hình electron của A, B và các ion  $\text{A}^{2-}$ ,  $\text{B}^{2-}$ .

Đặt:  $p_A$ : số proton của A ;  $p_B$ : số proton của B

Theo đề bài:  $p_A + p_B = 24$

Số proton trung bình của A, B:  $\bar{p} = \frac{24}{2} = 12$

Vì nguyên tử Na đứng đầu chu kì 3 có số proton  $p = 11$  nên không thể có A hoặc B ở chu kì 4. Vậy A, B phải thuộc hai chu kì nhỏ. Ngoài ra A và B ở hai chu kì kế tiếp nhau A và B có số proton hơn kém nhau 8 proton.


$\Rightarrow p_A = p_B + 8$  (giả sử  $p_A > p_B$ )

Vậy ta có: 
$$\begin{cases} p_A + p_B = 24 \\ p_A = p_B + 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_A = 16 \\ p_B = 8 \end{cases}$$

- Cấu hình electron của A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ . Vậy A là S. Cấu hình electron của  $S^{2-}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ .

- Cấu hình electron của B:  $1s^2 2s^2 2p^4$ . Vậy B là O. Cấu hình electron của  $B^{2-}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$ . Vậy  $B^{2-}$  là  $O^{2-}$ .

- Hợp chất  $AB_2$  là  $SO_2$  có công thức cấu tạo:



$O = S$  : liên kết cộng hoá trị phân cực

$S \rightarrow O$  : liên kết cho nhận.

## CHỦ ĐỀ 2

### Xác định một số liên kết hình thành trong hợp chất

144. a) Cho các hợp chất sau:  $K_2SO_4$ ,  $CaOCl_2$ ,  $Mg(NO_3)_2$ ,  $Fe(HCO_3)_2$ . Trong các hợp chất trên, hợp chất nào:

(1) Liên kết ion-cộng hoá trị?


(2) Liên kết ion-cộng hoá trị-cho nhận?



b) (1) Hợp chất (Y) có công thức  $AD_2$  (A là oxi) trong đó lớp electron ngoài cùng có cấu hình bền giống khí hiếm. Định tên nguyên tố D. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y).

(2) Hợp chất (Z) gồm 3 nguyên tố lưu huỳnh (B), A, D có tỉ lệ khối lượng  $m_B : m_A : m_D = 1 : 1 : 2,22$ . Phân tử khối (Z) = 135. Định công thức phân tử và giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử (Z), biết (Z) tác dụng với  $H_2O$  cho một sản phẩm là  $H_2SO_4$ .


GIẢI

a) (1) Liên kết ion - cộng hoá trị





(2) Liên kết ion – cộng hoá trị – cho nhận:  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_4$




b) (1) Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay clo. Tuy nhiên, chỉ có clo là thỏa điều kiện trong hợp chất  $\text{AD}_2$  lớp electron ngoài cùng của A lẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm.




(2) Công thức phân tử của Z:  $\text{S}_x\text{O}_y\text{Cl}_z$

$$x : y : z = \frac{1}{32} : \frac{1}{16} : \frac{2,22}{35,5} = 0,03125 : 0,0625 : 0,0625 = 1 : 2 : 2$$



$$\Rightarrow 135n = 135 \Rightarrow \text{CTPT: } \text{SO}_2\text{Cl}_2 \text{ (phù hợp quy tắc bát tử)}$$

145. a) Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực của liên kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử các chất sau:



Phân tử chất nào có chứa liên kết ion? liên kết cộng hoá trị có cực, không cực.

b) Dựa vào bản chất của liên kết hiđro giữa các phân tử, hãy cho biết trong những chất sau đây:  $\text{CO}_2$ ,  $\text{F}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$

- \* Chất nào dễ hoá lỏng nhất?
- \* Chất nào dễ tan trong nước nhất?

*GIẢI*

a) Xếp theo chiều tăng độ phân cực

Độ phân cực tăng <span style="float: right;">→</span>								
	N <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	BCl <sub>3</sub>	AlCl <sub>3</sub>	AlN	NaBr	MgO	CaO
Δ	0	0,4	1	1,3	1,5	1,9	2,3	2,5
		Liên kết cộng hoá trị có cực				Liên kết ion		

b) Xét chất nào có nguyên tử H linh động thì dễ hoá lỏng, chất nào có nguyên tử H linh động và tạo liên kết hiđro với H<sub>2</sub>O thì dễ tan trong nước nhất.


146. Hãy nêu bản chất các dạng liên kết trong phân tử các chất: N<sub>2</sub>, AgCl, HBr, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.

*GIẢI*

Liên kết: N≡N là liên kết cộng hoá trị không cực

Ag-Cl là liên kết ion

H-Br; NH<sub>3</sub> là liên kết cộng hoá trị có cực



147. Một nguyên tố R và một nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là ...3s<sup>1</sup> và ...3s<sup>2</sup> 3p<sup>5</sup>.

a) Xác định các nguyên tố R, X, công thức hợp chất giữa chúng và loại liên kết hình thành trong hợp chất thu được.

b) Xác định nguyên tố A có cấu hình electron ngoài cùng là ...4s<sup>1</sup>. Xác định công thức hợp chất có thể có giữa A, X.

Cho biết:

Số thứ tự	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Kí hiệu	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn

(Trích đề thi học sinh giỏi cấp thành phố (TPHCM) năm học 1996-1997)

**GIẢI**

a) Nguyên tố: R: Na

X: Cl

• Hợp chất và các loại liên kết: NaCl, liên kết ion.

b) Xác định nguyên tố A

A có thể là:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 \rightarrow$  Số thứ tự 19: K

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1 \rightarrow$  Số thứ tự 24: Cr

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1 \rightarrow$  Số thứ tự 29: Cu

Công thức hợp chất giữa A, X

KCl, CrCl<sub>3</sub>, CuCl, CuCl<sub>2</sub>.

148. a) Cho biết độ âm điện của các nguyên tố sau:

Nguyên tố	<sub>4</sub> Be	<sub>13</sub> Al	<sub>15</sub> P	<sub>16</sub> S	<sub>17</sub> Cl	<sub>9</sub> F
Độ âm điện	1,5	1,6	2,2	2,6	3,1	4,0

Hãy cho biết trong các hợp chất BeCl<sub>2</sub>, AlCl<sub>3</sub>, PCl<sub>5</sub>, SF<sub>6</sub> là liên kết cộng hoá trị hay liên kết ion. Nếu là liên kết cộng hoá trị thì phải giải thích như thế nào theo quan điểm của thuyết cơ học lượng tử.

*(Trích đề thi học sinh giỏi cấp thành phố (TPHCM) năm học 1996 -1997)*

b) N<sub>2</sub> và Cl<sub>2</sub> đều có độ âm điện bằng 3, nhưng ở điều kiện thường N<sub>2</sub> có tính oxi hoá kém clo, hãy giải thích?

**GIẢI**

BeCl<sub>2</sub> có Δχ = 1,6, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá sp

AlCl<sub>3</sub> có Δχ = 1,5, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá sp<sup>2</sup>

PCl<sub>5</sub> có Δχ = 0,9, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá sp<sup>3</sup>d<sup>1</sup>

SF<sub>6</sub> có Δχ = 1,4, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá sp<sup>3</sup>d<sup>2</sup>.

b) N<sub>2</sub> và Cl<sub>2</sub> mặc dù có độ âm điện bằng nhau nhưng phân tử Cl<sub>2</sub> có 1 liên kết đơn (σ) còn phân tử N<sub>2</sub> (N≡N) có liên kết ba (1 liên kết σ và 2 liên kết π) do đó phân tử N<sub>2</sub> bền vững hơn Cl<sub>2</sub>. Muốn tham gia phản ứng, phải cần năng lượng để phá vỡ liên kết, vì vậy ở điều kiện thường phân tử N<sub>2</sub> bền vững hơn Cl<sub>2</sub>, nên thể hiện tính oxi hoá yếu hơn.

149. a) Dựa vào độ âm điện, hãy nêu bản chất liên kết trong các phân tử và ion: HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, HClO, KHS.


b) (1) Tìm cation M<sup>+</sup> có cấu hình electron là 2p<sup>6</sup> và anion X<sup>-</sup> có cấu hình electron là: 3p<sup>6</sup>.



(2) Cho biết liên kết hoá học giữa 2 ion trên thuộc loại liên kết gì? Trình bày phương pháp nhận biết 2 ion trên từ hợp chất MX?

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Cao đẳng Kiểm sát, năm 2000)

**GIẢI**



+ Liên kết H-O có  $\Delta\chi = 1,4$ . Liên kết cộng hoá trị có cực.

+ Liên kết O-C có  $\Delta\chi = 1$ . Liên kết cộng hoá trị có cực.


– Phân tử HClO (H-O-Cl)

+ Liên kết H-O có  $\Delta\chi = 1,4$ . Liên kết cộng hoá trị có cực.

– Phân tử KHS (K-S-H).

+ Liên kết K-S có  $\Delta\chi = 1,7$ . Liên kết ion

+ Liên kết H-S có  $\Delta\chi = 0,4$ . Liên kết cộng hoá trị có cực.



M:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ . Tổng electron = Tổng proton = 11. Vậy  $\text{M}^+$  là ion  $\text{Na}^+$ .



X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ . Tổng electron = Tổng proton = 17. Vậy  $\text{X}^-$  là ion  $\text{Cl}^-$ .

(2) Hợp chất giữa chúng là phân tử NaCl có liên kết ion do lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện trái dấu.

Hòa tan NaCl vào nước:

*Thí nghiệm 1:* Dùng thìa thủy tinh sạch có gắn sợi Pt sạch nhúng vào dung dịch rồi đốt trên ngọn lửa không màu (đèn khí) ngọn lửa nhuộm màu vàng, kết luận có ion  $\text{Na}^+$ .

*Thí nghiệm 2:* Lấy một ít dung dịch cho thêm vào đó vài giọt dung dịch  $\text{AgNO}_3$  thấy có kết tủa trắng, kết luận có ion  $\text{Cl}^-$ .

150. a) Thế nào là liên kết  $\sigma$ , liên kết  $\pi$ ? Hãy mô tả sự xen phủ orbital nguyên tử tạo liên kết trong phân tử  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{N}_2$ , HCl.

b) Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực của liên kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử các chất sau:



Nêu những liên kết chính trong các phân tử.

c) Cặp chất nào sau đây mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho nhận).

- (1)  $\text{NaCl}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ;                      (2)  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ;                      (3)  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{KNO}_3$   
 (4)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ;                      (5)  $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$ .

### GIẢI

a) – Liên kết  $\sigma$  là liên kết cộng hoá trị do sự xen phủ của 2 obitan nằm trên trục nối hai hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết.

– Liên kết  $\pi$  là loại liên kết cộng hoá trị mà vùng xen phủ của 2 obitan ở hai bên của trục liên kết.


– Nguyên tử clo có 1 electron ở obitan 3p chưa ghép đôi nên khi tạo ra phân tử  $\text{Cl}_2$  hình thành liên kết  $\sigma$  (p-p)

(do sự xen phủ của 2 obitan 3p)



$\text{Cl}_2$  ( $\sigma_{p-p}$ )


– Trong phân tử H-Cl, obitan 1s của H và 1 obitan 3p của Cl đã xen phủ vào nhau tạo liên kết  $\sigma$  (s-p)



HCl ( $\sigma_{s-p}$ )


– Trong phân tử  $\text{N}_2$ , nguyên tử N có 3 electron độc thân ở obitan 2p nên khi hình thành phân tử  $\text{N}_2$  tạo ra:

+ 1 liên kết  $\sigma$  (xen phủ của 2 obitan 2p nằm trên trục nối hai hạt nhân).




Sự tạo thành liên kết  $\sigma$  trong  $\text{N}_2$

+ 2 liên kết  $\pi$  do sự xen phủ hai bên của 4 obitan 2p



a)



b)

Sự tạo thành liên kết  $\pi$  trong  $\text{N}_2$

b) Khi xét mức độ phân cực của liên kết cần dựa vào các điểm sau:


– Sự chênh lệch về độ âm điện ( $\Delta\chi$ ) càng lớn thì độ phân cực càng lớn.

- Nếu:  $\Delta\chi \geq 1,7$  thì liên kết là liên kết ion
- $0,4 \leq \Delta\chi < 1,7$  thì liên kết là liên kết cộng hoá trị có cực.
- $0 \leq \Delta\chi < 0,4$  thì liên kết là liên kết cộng hoá trị không cực.

	N <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	BCl <sub>3</sub>	AlCl <sub>3</sub>	AlN	NaBr	MgO	CaO
$\Delta\chi$	0	0,4	1,0	1,3	1,5	1,9	2,3	2,5
	Độ phân cực tăng $\rightarrow$							

- Các hợp chất CaO, MgO, NaBr: là hợp chất ion
- Phân tử N<sub>2</sub>: Hợp chất cộng hoá trị không phân cực.
- Các hợp chất còn lại đều là hợp chất cộng hoá trị phân cực.

c) Trong các hợp chất trên chỉ có K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KNO<sub>3</sub> mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết:






### CHỦ ĐỀ 3



#### Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion

151. a) Cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion sau: NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, NH<sub>3</sub>, BF<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>. Cho biết phân tử nào có cực? không cực?

b) Cho biết kiểu lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau: PCl<sub>5</sub>, SF<sub>6</sub>, SO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, CaH<sub>2</sub>, NF<sub>3</sub>, ClF<sub>3</sub>.


GIẢI






b) PCl<sub>5</sub> P: lai hoá sp<sup>3</sup>d SF<sub>6</sub> S: lai hoá sp<sup>3</sup>d<sup>2</sup>

- P có cấu hình e ở trạng thái cơ bản



- P ở trạng thái lai tạo trước khi tham gia liên kết



SO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> S: lai hoá sp<sup>3</sup> CaH<sub>2</sub> Ca: lai hoá sp.

NF<sub>3</sub> N: lai hoá sp<sup>3</sup>; ClF<sub>3</sub>: lai hoá sp<sup>3</sup>d

#### CHỦ ĐỀ 4

**Ảnh hưởng của liên kết hoá học đến nhiệt độ nóng chảy và độ tan**

152. a) Hãy cho biết trạng thái lai hoá của S, C trong SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, so sánh nhiệt độ sôi và độ hoà tan của SO<sub>2</sub> và CO<sub>2</sub> trong nước.

b) (1) So sánh tính axit, tính oxi hoá của các axit sau:




(2) So sánh tính axit, nhiệt độ sôi của các axit sau:



*GIẢI*

a) - Trong phân tử CO<sub>2</sub>: O=C=O

C ở trạng thái lai hoá  $sp^2$  nên phân tử  $CO_2$  thẳng hàng, hai lưỡng cực nối.



S ở trạng thái lai hoá  $sp^2$  nên phân tử  $SO_2$  có góc hoá trị bằng  $120^\circ$ . Phân tử  $SO_2$  có cực.

So sánh nhiệt độ sôi và độ hoà tan của  $SO_2$  và  $CO_2$ .

- Phân tử  $SO_2$  có cực nên nhiệt độ sôi cao hơn phân tử  $CO_2$  không cực.
- Phân tử  $H_2O$  là dung môi phân cực nên  $SO_2$  dễ hoà tan hơn  $CO_2$ . Do đó độ hoà tan của  $SO_2$  lớn hơn  $CO_2$  trong cùng điều kiện.

b) (1) Tính bền tăng, tính axit giảm, tính oxi hoá giảm:



(2) Tính axit tăng do độ bền liên kết giảm:



Nhiệt độ sôi giảm từ HF xuống HCl sau đó tăng dần đến HI. HF tạo được liên kết hidro. Từ HCl đến HI khối lượng phân tử tăng, năng lượng tương tác khuếch tán tăng.

153. Cho nguyên tố A thuộc chu kì 3, nhóm IA, ô thứ 11, nguyên tố B thuộc chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12.

So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan (khả năng tan trong nước) của hợp chất tạo bởi A và clo và hợp chất tạo bởi B và oxi. Giải thích.

#### GIẢI

$ACl$  và  $BO$  đều là hợp chất ion.

Bán kính ion:  $A^+$  lớn hơn  $B^{2+}$  (vì chúng là hai ion dương trong cùng chu kì,  $A^+$  ở đầu chu kì nên bán kính lớn hơn).

Bán kính ion:  $Cl^-$  lớn hơn  $O^{2-}$  (vì ion  $Cl^-$  có 3 lớp electron và ion  $O^{2-}$  có hai lớp electron).

Do đó:  $d_{A-Cl} > d_{B-O}$

Điện tích của  $A^+$  nhỏ hơn  $B^{2+}$

Điện tích của  $Cl^-$  nhỏ hơn  $O^{2-}$

Do đó năng lượng phân li liên kết của  $ACl$  nhỏ hơn của  $BO$ .

Vì vậy  $BO$  có nhiệt độ nóng chảy cao hơn  $ACl$  và  $ACl$  dễ tan hơn  $BO$ .

## BÀI TẬP TỰ GIẢI

154. a) Trình bày sự hình thành liên kết hoá học trong phân tử:  $N_2O_4$ ;  $NO_2$ ;  $H_2S$ ;  $SO_3$  bằng thuyết lai hoá.

b) Cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau:  $PCl_3$ ,  $BCl_3$ ,  $AsCl_5$ ,  $BF_4$ ,  $ZnCl_2$ ,  $AlCl_3$ .

155. a) Viết công thức cấu tạo các chất sau:  $H_3BNF_3$ ,  $H_3PO_3$ .

b) Hãy cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong phân tử  $H_2O$ ,  $H_2S$  sắp xếp góc hoá trị của  $\widehat{HOH}$ ,  $\widehat{HSH}$  theo chiều giảm dần, có giải thích.

c) Dựa vào thuyết obitan phân tử, hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử sau:  $O_2$ ,  $O_3$ ,  $CO$ ,  $NO_2$ ,  $NO$ ,  $H_3PO_3$ .

156. a) Năng lượng liên kết là gì? Năng lượng liên kết có ảnh hưởng gì đến hiệu ứng nhiệt của phản ứng.

b) Trong các loại mạng tinh thể (nguyên tử, phân tử, kim loại, ion) thì kim cương, P trắng, nước đá, KCl, Mg thuộc loại mạng tinh thể nào.

c) Hai nguyên tố X và Y có: Tổng điện tích hạt nhân bằng 15; hiệu số điện tích hạt nhân bằng 1.

(1) Xác định vị trí của X và Y trong hệ thống tuần hoàn?

(2) Viết công thức electron và công thức cấu tạo có thể có của hợp chất tạo thành bởi X, Y và hiđro.

157. a) Hãy giải thích vì sao: CaO và NaCl đều có cấu trúc lập phương đơn giản và khoảng cách giữa các ion xấp xỉ bằng nhau.

Vì sao nhiệt độ nóng chảy của CaO là 2973K trong khi đó NaCl chỉ nóng chảy ở 1074K?

b) Có bao nhiêu cặp electron liên kết, bao nhiêu cặp electron không liên kết trong các phân tử sau:  $H_2O$ ,  $NH_3$ ,  $HF$ ?

c) Trong các hợp chất sau đây thì hợp chất nào có liên kết gần liên kết cộng hoá trị nhất?

$BF_3$ ;  $NaF$ ;  $MgF_2$ .

158. Hợp chất A có công thức  $RX$  trong đó R chiếm 22,33% về khối lượng. Tổng số các hạt trong A = 149. Tổng số P của R và X là 46. Số neutron của X = 3,75 lần số N của R.

(1) Xác định số hiệu. Viết cấu hình electron của R, X.

(2) Liên kết trong phân tử A là liên kết gì? Vẽ sơ đồ sự hình thành liên kết đó?

159. a) Nitơ có thể tạo thành tối đa bao nhiêu obitan lai hoá? Vì sao?

Lưu huỳnh có thể tạo thành tối đa bao nhiêu obitan lai hoá? Vì sao?

b) Ba nguyên tố X, Y, Z thuộc 1 nhóm và nằm ở 3 hàng liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hợp chất  $XH_2$  chứa 11,1% H, Y và Z hình thành hai hợp chất với X trong đó thành phần của X là 60% và 48%. Nguyên tố Z không tạo thành hợp chất với hiđro. Hãy xác định X, Y, Z. Viết công thức của hợp chất giữa X và Z? giữa Y và X?

160. a) Giải thích tại sao naphthalen và iot lại dễ thăng hoa nhưng không dẫn điện, trái lại NaCl lại rất khó thăng hoa nhưng lại dẫn điện khi nóng chảy?

b) Tìm hai nguyên tố A và B ở hai chu kì liên tiếp nhau, có tổng số điện tích hạt nhân nguyên tử bằng 23?

Biết A, B ở hai nhóm liên tiếp và rất dễ tác dụng với nhau tạo hợp chất X. Xác định đúng A, B, viết công thức phân tử của X (B có nguyên tử khối lớn hơn A).

161. a) Độ phân cực của các liên kết trong các oxit sau đây thay đổi như thế nào? Biết rằng khi đi từ trái sang phải tính kim loại của các nguyên tố yếu dần:  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{Cl}_2\text{O}_7$ .

b) Dự đoán xem hợp chất nào sau đây hoà tan trong nước nhiều hơn

(1)  $\text{RbCl}$  hay  $\text{NaCl}$ ?

(2)  $\text{CsI}$  hay  $\text{CsBr}$ ?

(3)  $\text{NaI}$  hay  $\text{LiF}$ ?

162. a) Viết công thức cấu tạo của:  $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Từ đó suy ra hoá trị của S trong mỗi hợp chất. Có nhận xét gì về cộng hoá trị của S.

b) Ba nguyên tố A, B, C (có  $Z_A < Z_B < Z_C$ ) kế tiếp nhau trong cùng một chu kì có tổng số điện tích hạt nhân là 48.

(1) Viết cấu hình electron của A, B, C.

(2) Viết công thức cấu tạo của  $\text{H}_4\text{A}_2\text{O}_7$ ; oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của nguyên tố C.

(3) Viết sơ đồ hình thành phân tử giữa B và Al.

163. a) Trong phân tử  $\text{CO}_2$  và  $\text{H}_2\text{O}$  mỗi phân tử đều chứa liên kết cộng hoá trị có cực, nhưng tại sao phân tử  $\text{H}_2\text{O}$  có tính phân cực còn phân tử  $\text{CO}_2$  lại không phân cực.

b) Liên kết trong tinh thể kim cương thuộc loại liên kết gì?

Tại sao kim cương và than chì cùng cấu tạo bởi các nguyên tử cacbon nhưng kim cương thì rắn, than chì thì mềm?

Tính chất hoá học của kim cương và than chì có khác nhau không? Nêu dẫn chứng.

164. a) Hãy nêu nhận xét chung về trạng thái (ở điều kiện thường); nhiệt độ nóng chảy; nhiệt độ sôi; độ dẫn điện, khả năng hoà tan trong nước của các hợp chất ion.

b) Lấy thí dụ về sự xen phủ các obitan s-s, s-p, p-p trong sự tạo thành liên kết hoá học?

165. a) So sánh độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau:  $\text{NH}_3$ ;  $\text{H}_2\text{S}$ ;  $\text{H}_2\text{O}$ ;  $\text{CsCl}$ ;  $\text{CaS}$ ;  $\text{H}_2\text{Se}$ ;  $\text{BaF}_2$ .

b) Tổng số proton trong hai loại đồng vị bền của hai nguyên tố A và B là 70 và hiệu số proton này là 14.

(1) Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn? Tính số khối của A, B.

(2) Nguyên tố A ở chu kì lớn hơn. Nguyên tử của A có 3 đồng vị, số neutron hơn kém nhau 1 hạt. Đồng vị nhỏ nhất có số khối tính ở câu 1 và có số nguyên tử bằng 12,33 lần tổng số nguyên tử của hai đồng vị kia. Tổng số khối lượng của 140 nguyên tử của A bằng 3934,7. Tính phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

(3) Viết công thức phân tử, công thức electron và công thức cấu tạo của hợp chất tạo bởi A, B.



**166.** Trong phân tử  $M_2X$  có tổng số các hạt là 140 hạt. Trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối  $M^+$  nhiều hơn  $X^{2-}$  là 23. Tổng số hạt trong  $M^+$  nhiều hơn  $X^{2-}$  là 31 hạt.

- (1) Viết cấu hình electron của  $M^+$  và  $X^{2-}$ .
- (2) Xác định vị trí của M và X trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố.
- (3) Biểu diễn bằng sơ đồ sự hình thành liên kết hoá học trong  $M_2X$ .

**167. a)** Cho các phân tử sau:

- $CH_4$ ,  $NCI_3$ ,  $BF_3$ ,  $CS_2$ .
- $H_2O$ ,  $NH_3$ ,  $CO_2$ ,  $ClF$ ,  $CCl_4$ .

- (1) Phân tử nào có liên kết có cực nhất?
- (2) Phân tử nào phân cực? Không cực? Vì sao?

**b)** Cho ba nguyên tố A ( $Z = 1$ ); B ( $Z = 17$ ), C ( $Z = 8$ )

(1) Viết công thức và giải thích sự thành lập phân tử ba hợp chất từ hai trong ba loại nguyên tố trên.

(2) Giải thích sự tạo thành phân tử ABC, có thể tạo thành phân tử  $ABC_2$ ,  $ABC_3$ ,  $ABC_4$  được không? Viết công thức cấu tạo của chúng.

**c)** Trong các hợp chất sau đây thì hợp chất nào có liên kết gần liên kết ion nhất?



**168. a)** Không nhìn bảng độ âm điện, so sánh độ phân cực của các liên kết trong các hợp chất sau (có giải thích):



**b)** Các phân tử nào sau đây có cực? Không cực?



**c)** Các liên kết trong các hợp chất sau đây thuộc loại liên kết nào?



**169. a)** Một nguyên tố R có tổng số phần tử trong một loại nguyên tử bằng 52.

(1) Xác định số thứ tự của R trong bảng tuần hoàn.

(2) Nguyên tố R có hai loại đồng vị. Đồng vị thứ hai có tổng số phần tử nhiều hơn đồng vị thứ nhất nói trên 2 hạt và cứ 120 nguyên tử của nguyên tố R thì có 30 nguyên tử đồng vị thứ hai. Hãy xác định nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R.

(3) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của oxit bậc cao nhất của R

**170. a)** Dự đoán xem hợp chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

- $BaO$  hay  $MgO$ ?
- $NaI$  hay  $LiF$ ?
- $NaCl$  hay  $MgCl_2$ ?

**b)** Liên kết trong các hợp chất sau đây thuộc loại liên kết nào?



CS<sub>2</sub>, AlCl<sub>3</sub>, CaO, HI, SnCl<sub>2</sub>

c) Liên kết cho nhận là gì? Liên kết trong các hợp chất sau đây có những điểm gì giống nhau và khác nhau?

NH<sub>4</sub>Cl, Cl<sub>2</sub>, NaF, SnCl<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>.

### HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG III

156. c)

$$(1) \begin{cases} Z_X + Z_Y = 15 \\ Z_X - Z_Y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_X = 8 \\ Z_Y = 7 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{X là oxi} \\ \text{Y là nitơ} \end{array}$$


<sub>8</sub>O có cấu hình electron 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>4</sup> oxi thuộc chu kì 2 nhóm VIA

<sub>7</sub>N có cấu hình electron 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>3</sup> nitơ thuộc chu kì 2 nhóm VA

(2) Hợp chất tạo bởi N, H, O có thể là:

HNO<sub>3</sub>, HNO<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub>

Công thức cấu tạo và công thức electron của các chất trên:



$$158. (1) \begin{cases} 2Z_R + N_R + 2Z_X + N_X = 149 \\ Z_R + Z_X = 46 \end{cases}$$

$$\Rightarrow N_R + N_X = 57$$

$$N_X = 3,75N_R$$

$$\Rightarrow N_R = 12 \text{ và } N_X = 45$$

$$M_{RX} = Z_R + Z_X + N_R + N_X = 46 + 57 = 103$$

$$M_R = 103 \times 22,33\% = 23 \quad \text{Suy ra R là Na}$$

$$M_X = 103 - 23 = 80$$

Suy ra X là brom


$$Z_{Na} = 23 - 12 = 11$$

$$Z_{Br} = 80 - 45 = 35$$

Cấu hình electron của R:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

Cấu hình electron của X:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

(2) Liên kết trong phân tử A là liên kết ion:



159. b) Tính  $M_X$ . Trong  $\text{XH}_2$  H chiếm 11,1%, vậy X chiếm 88,9%.

$$\frac{H_2}{M_X} = \frac{11,1}{88,9} \Rightarrow M_X = \frac{2 \times 88,9}{11,1} = 16$$

X có hoá trị với H là 2 thì thuộc nhóm VIA

$M_X = 16 \Rightarrow X$  là oxi.

\* Y cùng nhóm oxi và nằm ở chu kì liên tiếp, vậy nó là S và hợp chất với oxi là  $\text{S}_2\text{O}_n$ :

$$\frac{16n}{2S} = \frac{60}{40} \Rightarrow n = \frac{64 \times 60}{40 \times 16} = 6$$

Công thức  $\text{S}_2\text{O}_6$ , tối giản thì có:  $\text{SO}_3$ .

\* Z cùng nhóm với S ở hàng liên tiếp, vậy Z là crom, công thức với oxi là  $\text{Cr}_2\text{O}_n$ :

$$\frac{16n}{2Cr} = \frac{48}{52} \Rightarrow n = \frac{2 \times 52 \times 48}{52 \times 16} = 6$$

Công thức  $\text{Cr}_2\text{O}_6$ , tối giản thì có:  $\text{CrO}_3$ .

160. b)  $\bar{Z}_A \text{ và } B = \frac{23}{2} = 11,5$ . Vậy  $Z_A < 11,5$  và B ở chu kì liên tiếp nên A phải ở chu kì thứ 2, B ở chu kì thứ 3. A, B lại ở hai phân nhóm liên tiếp, vậy sự liên quan giữa  $Z_A$  và  $Z_B$  có thể là:

$$Z_B = Z_A + 8 + 1 \text{ hoặc } Z_B = Z_A + 8 - 1$$

$$* Z_A + Z_A + 8 + 1 = 23 \Rightarrow Z_A = 7$$

$$\text{hoặc } * Z_A + Z_A + 8 - 1 = 23 \Rightarrow Z_A = 8$$

$$Z_A = 7 \text{ thì } Z_B = 16 \text{ A là N; B là S}$$

$$Z_A = 8 \text{ thì } Z_B = 15 \text{ A là O; B là P}$$

A và B rất dễ tác dụng với nhau vậy A và B là O và P; N và S khó tác dụng nên loại trường hợp này.

X có công thức  $P_2O_5$  hoặc  $P_2O_3$ .

$$165. b) \begin{cases} (2Z_A + N_A) + (2Z_B + N_B) = 70 \\ (2Z_A + N_A) - (2Z_B + N_B) = 14 \end{cases}$$

$$2Z_A + N_A = 42 \text{ và } 2Z_B + N_B = 28$$

Tính  $Z_A$ :  $2Z_A + N_A = 42$  và  $Z_A$  nằm trong khoảng 14 và 21, vậy có tỉ lệ:

$$1 \leq \frac{N_A}{Z_A} \leq 1,5 \Rightarrow 14 \geq Z_A \geq 12 \Rightarrow Z_A = 12, Z_A = 13, Z_A = 14$$

Z	12	13	14
A	30	29	28

Tính  $Z_B$ : tương tự  $Z_B < 20$ :

$$1 \leq \frac{N_B}{Z_B} \leq 1,5 \Rightarrow 9,3 \geq Z_B \geq 8 \Rightarrow Z_B = 8, Z_B = 9$$

Z	8	9
A	20	19

Vị trí của A trong bảng tuần hoàn:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 \Rightarrow A \text{ ở chu kì 3, nhóm IVA, số khối 28.}$$

Vị trí của B trong bảng tuần hoàn:

$$1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow B \text{ ở chu kì 2, nhóm VIIA, số khối 19.}$$

$$166. \begin{cases} 2(2Z_M + N_M) + (2Z_X + N_X) = 140 & (1) \\ 2(2Z_M + Z_X) - (2N_M + N_X) = 44 & (2) \\ (Z_M + N_M) - (Z_X + N_X) = 23 & (3) \\ (2Z_M + N_M - 1) - (2Z_X + N_X + 2) = 31 & (4) \end{cases}$$

Giải hệ 4 phương trình ta được:

$$\begin{aligned} Z_M &= 19; N_M = 20 & M \text{ là kali} \\ Z_X &= 8; N_X = 8 & X \text{ là oxi} \end{aligned}$$

Cấu hình electron của kali:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

kali ở chu kì 4 nhóm IA

Cấu hình electron của oxi:  $1s^2 2s^2 2p^4$

oxi ở chu kì 2 nhóm VIA

169. a) (1) R có tổng số hạt là 52

$$2Z + N = 52$$

$$1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5 \Rightarrow N \leq 1,5Z$$

$$2Z + 1,5Z \geq 52$$

$$Z \geq 14,5$$

Với  $Z \leq N$

$$2Z + Z \leq 52$$

$$Z \leq 17,3$$

$Z_R$  có thể là 15, 16 hoặc 17

$$A = 52 - Z$$

Z	15	16	17
A	37	36	35

R là clo

(2) Clo có 2 đồng vị:  $^{35}\text{Cl}$  và  $^{37}\text{Cl}$

(Vì tổng số phân tử hơn kém nhau 2 phân tử)



$$\bar{M}_{\text{Cl}} = \frac{(35 \times 120) + (37 \times 30)}{150} = 35,4.$$

## CHỦ ĐỀ 1

- Xét chiều hướng phản ứng
- Xác định chất oxi hoá - chất khử

**LỜI DẶN:** Giữa hai cặp oxi hoá-khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều chất (dạng) oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất (dạng) khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

**Ví dụ:** Có hai cặp oxi hoá-khử  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  và  $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ . Tính oxi hoá của  $\text{Cu}^{2+}$  mạnh hơn của  $\text{Al}^{3+}$ , tính khử của Al mạnh hơn của Cu. Do đó phản ứng xảy ra theo chiều:



## BÀI TẬP

171. a) (1) Hãy cho biết chiều phản ứng của các cặp oxi hoá khử.

(2) Cho các cặp oxi hoá khử sau:  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ ;  $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ ;  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ;  $\text{H}^+/\text{H}$ ;  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ .



Hãy sắp xếp các cặp theo thứ tự tăng dần khả năng oxi hoá của các dạng oxi hoá. Dẫn ra các phương trình phản ứng để minh họa sự đúng đắn của thứ tự đã sắp xếp.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2000)

b) Cho các cặp oxi hoá khử sau:  $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ ;  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ ;  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

Cho biết tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự:  $\text{Sn}^{4+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ , tính khử giảm dần theo thứ tự:  $\text{Sn}^{2+}$ , Cu,  $\text{Fe}^{2+}$ .

Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra không? Viết phương trình phản ứng (nếu có).



## GIẢI


a) (1) Chiều phản ứng của các cặp oxi hoá khử:

Giữa hai cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều chất (dạng) oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất (dạng) khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.









**Ví dụ:** có hai cặp oxi hoá-khử  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  và  $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ . Tính oxi hoá của  $\text{Cu}^{2+}$  mạnh hơn của  $\text{Al}^{3+}$ , tính khử Al mạnh hơn của Cu. Do đó phản ứng xảy ra theo chiều:





(2) Thứ tự tăng dần khả năng oxi hoá của các dạng oxi hoá:



– Các phương trình phản ứng minh họa sự đúng đắn của cách sắp xếp trên:



b) Các phản ứng xảy ra và có phương trình như sau:






172. a) Các chất sau đây chất nào có tính oxi hoá, chất nào có tính chất khử? Nêu rõ lí do và mỗi trường hợp chọn 1 ví dụ cụ thể:  $\text{Cl}_2$ ;  $\text{H}_2\text{S}$ ;  $\text{SO}_2$ ;  $\text{KClO}_3$ ?

b) (1) Viết công thức các chất ứng với những số oxi hoá khác nhau của clo.


(2) Hoàn thành các phản ứng (nếu có):  $\text{Cl}_2 + \text{HI}$ ;  $\text{I}_2 + \text{HCl}$ ;  $\text{Cl}_2 + \text{Fe}$ ;  $\text{I}_2 + \text{Fe}$ ;  $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{S}$  (dung dịch) và  $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S}$  (dung dịch).

### GIẢI


a)  $\text{Cl}_2$  là chất oxi hoá mạnh vì  $\text{Cl}_2$  là một phi kim có độ âm điện lớn dễ nhận electron.



• Trong phản ứng tự oxi hoá khử  $\text{Cl}_2$  vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử:



•  $\text{H}_2\text{S}$  là chất khử mạnh vì trong  $\text{H}_2\text{S}$ , S có số oxi hoá thấp nhất bằng -2.




•  $\text{SO}_2$  vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.


\* Khi tác dụng với chất khử mạnh  $\text{SO}_2$  là chất oxi hoá và S trong  $\text{SO}_2$  có số oxi hoá giảm.




\* Khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh  $\text{SO}_2$  là chất khử và S trong  $\text{SO}_2$  có số oxi hoá tăng.





•  $\text{KClO}_3$  là chất oxi hoá vì trong  $\text{KClO}_3$ , Cl có số oxi hoá +5



b) (1) Công thức các chất của clo có số oxi hoá khác nhau:



(2) Hoàn thành các phản ứng:



173. a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi dùng nước vôi để loại bỏ mỗi khí độc sau đây ra khỏi không khí bị ô nhiễm:  $\text{Cl}_2$ ;  $\text{SO}_2$ ;  $\text{H}_2\text{S}$ ;  $\text{NO}_2$ . Trong các phản ứng đó, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử? Tại sao?



b) Trong môi trường axit  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{O}_3$ ,  $\text{MnO}_4^-$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  đều oxi hoá được Cl thành  $\text{Cl}_2$ , lúc đó  $\overset{+4}{\text{Mn}}$  bị khử thành  $\overset{+2}{\text{Mn}}$ ,  $\overset{+2}{\text{Mn}}$  thành  $\overset{+3}{\text{Mn}}$ ,  $\overset{+6}{\text{Cr}}$  thành  $\overset{+3}{\text{Cr}}$  và  $\text{O}_3$  thành  $\text{O}_2$ . Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

c) Bằng phương pháp thăng bằng electron, cân bằng các phản ứng oxi hoá khử sau:





GIẢI

a) Các phương trình phản ứng:








(1), (2) là phản ứng oxi hoá-khử vì: (1) có sự thay đổi số oxi hoá của clo; (2) có sự thay đổi số oxi hoá của N.



$\text{FeS}_2$ : chất khử;  $\text{HNO}_3$ : chất oxi hoá



174. a) Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử, phản ứng nào là phản ứng trao đổi.



b) Cân bằng phương trình phản ứng sau (viết phản ứng ở dạng tổng quát):




- Viết phản ứng (1) dưới dạng phương trình ion rút gọn.

- Với giá trị nào của x ở phản ứng (2) sẽ là phản ứng oxi hoá-khử hoặc phản ứng trao đổi?

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM, năm 1998)


**GIẢI**




Nếu  $x = 2$ ;  $y = 3$  là phản ứng trao đổi.

Trường hợp khác là phản ứng oxi hoá - khử.

Phương trình ion:



b) Cân bằng các phản ứng:







Khi  $x = 3$ : phản ứng trao đổi ion

Khi  $x = 1$  hoặc  $x = 2$ : phản ứng oxi hoá - khử.



175. a) Cân bằng các phản ứng sau và nói rõ chất oxi hoá, chất khử:





(Trích đề thi tuyển sinh Học viện Quốc tế, năm 1997)

b) Cân bằng phản ứng oxi hoá khử sau bằng phương pháp thăng bằng số electron:  
 $\text{FeS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$


Hãy cho biết trong phản ứng trên, nguyên tố nào bị oxi hoá, nguyên tố nào bị khử? Giải thích.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM, năm 2000)

GIẢI








$(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  có cả hai tính: oxi hoá và khử, trong đó  $\text{Cr}^{6+}$  trong vai trò chất oxi hoá;  $\text{N}^{-3}$  đóng vai trò chất khử.



$\text{NH}_4\text{NO}_2$  có cả hai tính chất oxi hoá và khử.



b) Cân bằng phản ứng



Nguyên tố bị oxi hoá: Fe và S vì chúng nhường electron

Nguyên tố bị khử: N vì chúng nhận electron.

176. a) Xác định chất oxi hoá, chất khử và cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:





b) Cân bằng phản ứng oxi hoá khử sau bằng phương pháp ion-electron và xác định chất oxi hoá, chất khử.





GIẢI


a) Xác định chất oxi hoá, chất khử và cân bằng phương trình:





Phương trình cân bằng:




Phương trình cân bằng:



Phương trình cân bằng:




Phương trình cân bằng:




- Vai trò:  $\text{Cr}_2\text{S}_3$ : chất khử  
 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ : chất oxi hoá


– Sơ đồ electron:



– Phương trình ion rút gọn:



– Hoàn thành phương trình phân tử:





177. Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:



- a)  $\text{K}_2\text{S} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{S} + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$   
b)  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$   
c)  $\text{CuS}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$   
d)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$   
e)  $\text{FeSO}_4 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{HCl}$

GIẢI


- a)  $\text{K}_2\text{S} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{S} + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$





- b)  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$





- c)  $\text{CuS}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$



- d)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$







## CHỦ ĐỀ 2

Phản ứng có chất hoá học là tổ hợp của hai chất khử













### PHƯƠNG PHÁP:

- Viết tất cả phương trình biểu diễn sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.
- Chú ý sự ràng buộc hệ số ở vế của phản ứng và ràng buộc hệ số trong cùng phân tử.
- Nếu một phân tử có nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hoá có thể xét chuyển nhóm hoặc toàn bộ phân tử.



178. Cân bằng phản ứng oxi hoá-khử sau:





### GIẢI






179. Cân bằng phản ứng oxi hoá-khử sau:





GIẢI



(Có thể tính số oxi hoá các nguyên tố trong hợp chất  $\overset{+1}{\text{Cu}}\overset{+3}{\text{Fe}}\overset{-2}{\text{S}}_2$  kết quả cũng giống như trên).






180. Hoàn thành phản ứng oxi hoá-khử, viết phương trình trao đổi điện tử giữa chất oxi hoá và chất khử của các phản ứng sau:








(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Đà Nẵng, năm 1997)






GIẢI

Hoàn thành các phản ứng oxi hoá-khử:





Cũng có trường hợp:




### CHỦ ĐỀ 3

#### Phản ứng oxi hoá-khử có hệ số bằng chữ

**LỜI DẶN:** Cần xác định đúng sự tăng, giảm số oxi hoá của các nguyên tố.

### BÀI TẬP

**181.** Cân bằng phản ứng oxi hoá-khử sau:










b) Hoà tan kim loại M trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  thu được một muối nitrat, khí  $\text{N}_x\text{O}_y$  và  $\text{H}_2\text{O}$ .  
Viết và cân bằng phương trình phản ứng







d) Khi cho một kim loại vào dung dịch  $\text{HNO}_3$  ta thu được hai loại muối. Viết và cân bằng phương trình phản ứng.

*GIẢI*





182. Cân bằng các phản ứng oxi hoá-khử sau:



#### CHỦ ĐỀ 4

Phản ứng có nguyên tố tăng hay giảm số oxi hoá ở nhiều mức

LỜI DẶN:

**Phương pháp 1:** – Viết tất cả phương trình có nguyên tố thay đổi số oxi hoá.


– Đặt ẩn số cho từng mức tăng, giảm số oxi hoá.

**Phương pháp 2:** – Tách ra thành hai hay nhiều phương trình phản ứng với từng mức số oxi hoá tăng hay giảm.

– Nhân hệ số trước khi gộp các phản ứng lại.



## BÀI TẬP

183. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử sau:




GIẢI

Cách 1:



Cách 2: Tách thành hai phương trình phản ứng:



(Nhận xét: Phương trình phản ứng giải theo cách 2 có  $a = 3x$ ;  $b = y$  so với cách

1) (Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương trình không cần gộp lại).

184. Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitric thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và  $\text{N}_2\text{O}$  có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 16,75. Tính m?

GIẢI

Gọi a, b lần lượt là số mol NO và  $\text{N}_2\text{O}$  trong hỗn hợp

$$n_{\text{hh}} = a + b = \frac{8,96}{22,4} = 0,4 \text{ mol} \quad (1)$$

$$M_{\text{hh}} = \frac{30a + 44b}{0,4} = 16,75 \times 2 \rightarrow 30a + 44b = 13,4 \quad (2)$$

Từ (1), (2) cho  $a = 0,3 \text{ mol}$  và  $b = 0,1 \text{ mol}$




$$\sum n_{\text{Al}} = 0,3 + \frac{0,8}{3} = \frac{1,7}{3}$$

$$m_{\text{Al}} = \frac{1,7}{3} \times 27 = 15,3 \text{ gam}$$

Nếu giải theo cách khác: Vì  $n_{\text{NO}} : n_{\text{N}_2\text{O}} = 3 : 1$  nên:





$$m_{\text{Al}} = \frac{1,7}{3} \times 27 = 15,3 \text{ gam.}$$

**185.** Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới  $100^\circ\text{C}$ .

a) Trong mỗi trường hợp, hãy viết và cân bằng phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp cân bằng electron. Cho biết chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử?


b) Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu?

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM, năm 1997)

**GIẢI**



a) Luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH:

Dung dịch một loãng và nguội:



Clo vừa là chất oxi hoá và là chất khử (tự oxi hoá-khử)

Dung dịch hai đậm đặc, nóng đến  $100^\circ\text{C}$ :



Clo là chất tự oxi hoá-khử.

b) Tỉ lệ thể tích khí clo qua hai dung dịch khi lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau.



Theo (1): 5 mol  $\text{Cl}_2$  cho 5 mol KCl hay  $5 \times 74,5\text{g} = 372,5\text{g}$

Theo (2): 3 mol  $\text{Cl}_2$  cho 5 mol KCl hay  $5 \times 74,5\text{g} = 372,5\text{g}$

Vậy khi khối lượng KCl trong hai dung dịch không đổi thì tỉ lệ thể tích  $\text{Cl}_2$  trong trường hợp 1 đối với trường hợp 2 bằng tỉ lệ trị số mol của  $\text{Cl}_2$  tương ứng.

$$\frac{V_{\text{Cl}_2(1)}}{V_{\text{Cl}_2(2)}} = \frac{\text{số mol Cl}_2(1)}{\text{số mol Cl}_2(2)} = \frac{5}{3}$$








186. Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá-khử sau theo phương pháp cân bằng electron:




(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM, năm 1997)

### GIẢI

Cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá-khử:



187. a) Trong điều kiện thí nghiệm cụ thể, Al tác dụng với  $\text{HNO}_3$  tạo hỗn hợp khí X gồm: NO,  $\text{NO}_2$  theo phương trình phản ứng:



Hãy cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá-khử cho mỗi trường hợp:

(1)  $d_{\text{X}/40} = 1,02$

(2)  $d_{\text{X}/40} = 1,122$



b) Cân bằng phương trình sau:





$$n_{\text{NO}_2} : n_{\text{NO}} = a : b$$

### GIẢI




a) (1)  $\Rightarrow$  Tỉ lệ  $n_{\text{NO}} : n_{\text{NO}_2} = 0,325 : 0,675 = 13 : 27$



$$(2) \Rightarrow \text{Ti lệ } n_{\text{NO}} : n_{\text{NO}_2} = 0,07 : 0,93 \approx 1 : 13$$



$$n_{\text{NO}_2} : n_{\text{NO}} = a : b$$



### CHỦ ĐỀ 5

#### Phản ứng không xác định rõ môi trường



#### PHƯƠNG PHÁP:

- Trước tiên cân bằng phản ứng oxi hoá-khử theo phương pháp thăng bằng electron.
- Sau đó cân bằng các nguyên tố bằng phương pháp đại số (nguyên tố này không cân bằng được theo phương pháp thăng bằng electron).
- Khi gộp nhiều phản ứng lại, cần phân tích để xác định giai đoạn nào là oxi hoá-khử.


**188.** Cân bằng phương trình phản ứng sau và xác định chất oxi hoá-chất khử.



*GIẢI*






Tổng hợp hai giai đoạn ta có phương trình phản ứng:




Al là chất khử, H<sub>2</sub>O là chất oxi hoá.

b) Cân bằng phương trình phản ứng trên qua hai giai đoạn:

– Cân bằng phương trình theo phản ứng oxi hoá-khử:



– Cân bằng phương trình bằng phương pháp đại số:



$$(\text{K}) \quad 12 + a = 2b \quad (1)$$


$$(\text{S}) \quad 5 + a = 2 + b \quad (2)$$

$$(\text{H}) \quad a = 2c \quad (3)$$

Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2), ta có:

$$7 = b - 2 \rightarrow b = 9$$

Thay b = 9 vào phương trình (2), ta có a = 6, thay a = 6 vào phương trình (3), ta có c = 3.



## CHỦ ĐỀ 6


### Xác định các chất tạo thành sau phản ứng hoá học

#### PHƯƠNG PHÁP:

- Xác định chất oxi hoá, chất khử mạnh hay yếu.
- Chọn khả năng số oxi hoá của nguyên tố thay đổi cho phù hợp với đề bài (Chú ý môi trường tiến hành phản ứng của các chất, ion).



#### LỜI DẶN:


Trong một số chất, chất oxi hoá và chất khử còn phụ thuộc vào môi trường tiến hành phản ứng:











### BÀI TẬP

**189.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình hoá học sau:






*GIẢI*






**190.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau:



*GIẢI*

Các phản ứng oxi hoá khử:




**191.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau:



- c)  $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots$   
d)  $\text{Al} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{NO} + \dots$  (Tỉ lệ  $n_{\text{N}_2\text{O}} : n_{\text{NO}} = 1 : 3$ )  
e)  $\text{M}_2(\text{CO}_3)_n + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{M}(\text{NO}_3)_m + \text{NO} + \dots$   
g)  $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \dots$



GIẢI




$$\begin{array}{l} (3x-2y) \times \left| \begin{array}{l} \overset{+5}{\text{nN}} + (5n-2m)\text{e} = \overset{+2m/n}{\text{nN}} \\ \overset{+2y/x}{\text{xFe}} \rightarrow \overset{+3}{\text{xFe}} + (3x-2y)\text{e} \end{array} \right. \\ (5n-2m) \times \left| \begin{array}{l} \overset{+2y/x}{\text{xFe}} + (3x-2y)\overset{+5}{\text{nN}} \rightarrow (3x-2y)\overset{+2m/n}{\text{nN}} + (5n-2m)\overset{+3}{\text{xFe}} \end{array} \right. \\ (5n-2m)\text{Fe}_x\text{O}_y + (18nx-6mx-2yn)\text{HNO}_3 \rightarrow (5n-2m)\text{xFe}(\text{NO}_3)_3 + \\ + (3x-2y)\text{N}_n\text{O}_m + (9nx-3mx-yn)\text{H}_2\text{O} \end{array}$$




$$\begin{array}{l} \overset{-1}{\text{S}} + 1\text{e} \rightarrow \overset{-2}{\text{S}} \\ \overset{-1}{\text{S}} \rightarrow \overset{0}{\text{S}} + 1\text{e} \\ \hline \overset{-1}{2\text{S}} \rightarrow \overset{-2}{\text{S}} + \overset{0}{\text{S}} \end{array}$$




$$\begin{array}{l} 3 \times \left| \begin{array}{l} \overset{+5}{\text{As}_2\text{S}_3} \rightarrow 2\overset{+5}{\text{As}} + 3\overset{+6}{\text{S}} + 28\text{e} \\ \overset{+5}{\text{N}} + 3\text{e} \rightarrow \overset{+2}{\text{N}} \end{array} \right. \\ 28 \times \left| \begin{array}{l} \overset{+5}{\text{N}} + 3\text{e} \rightarrow \overset{+2}{\text{N}} \end{array} \right. \end{array}$$



$$\begin{array}{l} 17 \times \left| \begin{array}{l} \overset{0}{\text{Al}} \rightarrow \overset{+3}{\text{Al}} + 3\text{e} \\ \overset{+5}{5\text{N}} + 17\text{e} \rightarrow 3\overset{+2}{\text{N}} + 2\overset{+1}{\text{N}} \end{array} \right. \\ 3 \times \left| \begin{array}{l} \overset{+5}{5\text{N}} + 17\text{e} \rightarrow 3\overset{+2}{\text{N}} + 2\overset{+1}{\text{N}} \end{array} \right. \\ 17\overset{0}{\text{Al}} + 15\overset{+5}{\text{N}} \rightarrow 17\overset{+3}{\text{Al}} + 9\overset{+2}{\text{N}} + 6\overset{+1}{\text{N}} \end{array}$$















$$\begin{array}{l} 3 \times \left| \begin{array}{l} \overset{+n}{2\text{M}} \rightarrow 2\overset{+m}{\text{M}} + 2(m-n)\text{e} \\ \overset{+5}{\text{N}} + 3\text{e} \rightarrow \overset{+2}{\text{N}} \end{array} \right. \\ 2(m-n) \times \left| \begin{array}{l} \overset{+5}{\text{N}} + 3\text{e} \rightarrow \overset{+2}{\text{N}} \end{array} \right. \\ 6\overset{+n}{\text{M}} + 2(m-n)\overset{+5}{\text{N}} \rightarrow 6\overset{+m}{\text{M}} + 2(m-n)\overset{+2}{\text{N}} \end{array}$$





**192.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau bằng phương pháp ion-electron:

- a)  $\text{SO}_3^{2-} + \text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \dots + \dots$   
 b)  $\text{SO}_3^{2-} + \text{MnO}_4^- + \text{OH}^- \rightarrow \dots + \dots + \dots$   
 c)  $\text{OCl}^- + \text{I}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{I}_2 + \dots$   
 d)  $\text{FeS}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{N}_2\text{O}_x + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$   
 e)  $\text{CrO}_2^- + \text{H}^+ + \text{KI} \rightarrow \text{Cr}^{2+} + \dots$

*GIẢI*








**193.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau:



(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học An ninh nhân dân Hà Nội, năm 1995)






**GIẢI**






**194.** a) Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng phương trình phản ứng hoá học sau theo phương pháp cân bằng ion-electron:





b) Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng sau:







**GIẢI**



Trong bất cứ môi trường nào  $\text{MnO}_4^-$  cũng có tính oxi hoá, tính oxi hoá mạnh nhất trong môi trường axit ( $\overset{+7}{\text{Mn}} \rightarrow \overset{+2}{\text{Mn}}$ ) và yếu nhất trong môi trường kiềm ( $\overset{+7}{\text{Mn}} \rightarrow \overset{+6}{\text{Mn}}$ )













195. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau bằng phương pháp cân bằng ion-điện tử (nếu có):







(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM, năm 1991)

### GIẢI




Hoàn thành và cân bằng các phản ứng oxi hoá khử:



d) Vì  $\text{CuFeS}_2$ ,  $\text{Cu}_2\text{S}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ : đều là chất rắn và  $\text{O}_2$ ,  $\text{SO}_2$  chất khí nên không viết ra dạng ion:




**196.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau dưới dạng phân tử và dạng ion:








*GIẢI*



a) Chỉ có 1 phương trình ion:



Nhưng có thể viết ở các phương trình phân tử với hệ số khác nhau:



Cân bằng phương trình ion trên đơn giản hơn so với các phương trình a), b), nhưng lại khó viết phương trình phân tử hơn vì trong dung dịch còn tồn tại cả ion  $\text{SO}_4^{2-}$ . Nên có 2 trường hợp xảy ra:



Mặc dù có các phương trình phân tử khác nhau, nhưng thực chất phản ứng c) chỉ xảy ra theo phương trình (1).

**197.** Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình sau theo phương pháp cân bằng ion-electron:



- b)  $\text{Cl}_2 + \text{I}^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{IO}_4^{2-} + \dots + \dots$   
 c)  $\text{OCl}^- + \text{I}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{I}_2 + \dots$   
 d)  $\text{Cl}_2 + \text{OH}^-$  đặc nóng  $\rightarrow \dots + \dots + \dots$   
 e)  $\text{Cu}_2\text{S} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$

**GIẢI**

- a) 
$$\begin{array}{l} 3 \times \left| \begin{array}{l} \text{Cl}_2 + 2\text{e} \rightarrow 2\text{Cl}^- \\ \text{c.oxh} \end{array} \right. \\ 1 \times \left| \begin{array}{l} \text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{IO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e} \\ \text{c.khử} \end{array} \right. \\ \hline 3\text{Cl}_2 + \text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cl}^- + \text{IO}_3^- + 6\text{H}^+ \end{array}$$
- b) 
$$\begin{array}{l} 7 \times \left| \begin{array}{l} \text{Cl}_2 + 2\text{e} \rightarrow 2\text{Cl}^- \\ \text{c.oxh} \end{array} \right. \\ 2 \times \left| \begin{array}{l} \text{I}^- + 8\text{OH}^- \rightarrow \text{IO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + 7\text{e} \\ \text{c.khử} \end{array} \right. \\ \hline 7\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- + 16\text{OH}^- \rightarrow 14\text{Cl}^- + 2\text{IO}_4^{2-} + 8\text{H}_2\text{O} \end{array}$$
- c) 
$$\begin{array}{l} 1 \times \left| \begin{array}{l} \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cl}^- + 2\text{OH}^- \\ \text{c.oxh} \end{array} \right. \\ 1 \times \left| \begin{array}{l} 2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e} \\ \text{c.khử} \end{array} \right. \\ \hline \text{ClO}^- + 2\text{I}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{I}_2 + 2\text{OH}^- \end{array}$$
- d) 
$$\begin{array}{l} 5 \times \left| \begin{array}{l} \text{Cl}_2 + 2\text{e} \rightarrow 2\text{Cl}^- \\ \text{c.oxh} \end{array} \right. \\ 1 \times \left| \begin{array}{l} \text{Cl}_2 + 12\text{OH}^- \rightarrow 2\text{ClO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O} + 10\text{e} \\ \text{c.khử} \end{array} \right. \\ \hline 3\text{Cl}_2 + 6\text{OH}^- \rightarrow 5\text{Cl}^- + \text{ClO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O} \end{array}$$
- e) 
$$\begin{array}{l} \text{Cu}_2\text{S} + \text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{NO} + \text{H}_2\text{O} \\ 3 \times \left| \begin{array}{l} \text{Cu}_2\text{S} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ + 10\text{e} \\ \text{c.khử} \end{array} \right. \\ 10 \times \left| \begin{array}{l} \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O} \\ \text{c.oxh} \end{array} \right. \\ \hline 3\text{Cu}_2\text{S} + 16\text{H}^+ + 10\text{NO}_3^- \rightarrow 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 10\text{NO} + 8\text{H}_2\text{O} \\ 3\text{Cu}_2\text{S} + 22\text{HNO}_3 \rightarrow 6\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 + 10\text{NO} + 8\text{H}_2\text{O} \end{array}$$

### BÀI TẬP TỔNG HỢP

**198.** a) Cho nguyên tố A có  $Z = 16$ .

(1) Xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn.

(2) A là kim loại hay phi kim? giải thích.

(3) A vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. Viết phương trình phản ứng minh họa

b) Cho các nguyên tố thuộc chu kì 3: P, Si, Cl, S.

(1) Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần tính phi kim và giải thích.



(2) Viết công thức phân tử các axit có oxi với số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố trên và so sánh tính axit của chúng.

*(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM, năm 1999)*

#### GIẢI

a) (1) A ( $Z = 16$ ):  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \Rightarrow A$  ở chu kì 3, nhóm VIA.

(2) A là phi kim. Vì A có 6e ở lớp ngoài cùng.



b) (1) Tính phi kim tăng dần:  $\text{Si} < \text{P} < \text{S} < \text{Cl}$

Vì bán kính nguyên tử giảm dần.

(2)  $\text{H}_2\text{SiO}_3 < \text{H}_3\text{PO}_4 < \text{H}_2\text{SO}_4 < \text{HClO}_4$  (tính axit)

**199.** a) Số oxi hoá của một nguyên tố là gì? Cho các chất:  $\text{N}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{HNO}_3$ .

(1) Xác định hoá trị và số oxi hoá của nitơ trong phân tử các chất trên.

(2) Chất nào tác dụng được với bazơ? với axit? Viết phương trình phản ứng.

*(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 2000)*

b) (1) Viết cấu hình electron crom (Cr) với  $Z = 24$ . Cho biết Cr thuộc chu kì nào, nhóm nào và tính chất hoá học chủ yếu của nó. Giải thích tại sao Cr có số oxi hoá từ +1 đến +6.

(2) Kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của kim loại Cr là  $7,19 \text{ gam/cm}^3$ . Hãy tính bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr.

#### GIẢI

a) Số oxi hoá của một nguyên tố là điện tích quy ước mà nguyên tử có được, nếu giả thiết cặp electron liên kết (do 2 nguyên tử góp chung) chuyển hoàn toàn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

Cho các chất:  $\text{N}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{HNO}_3$


(1) Trong phân tử  $\text{N}_2$ : nitơ hoá trị III, số oxi hoá bằng 0.

Trong phân tử  $\text{NH}_3$ : nitơ có hoá trị III, số oxi hoá bằng -3.

Trong phân tử  $\text{NH}_4^+$ : nitơ có hoá trị III, số oxi hoá bằng -3.

Trong phân tử  $\text{HNO}_3$ : nitơ có hoá trị V, số oxi hoá bằng +5.

(2) Chất tác dụng với bazơ:  $\text{HNO}_3$



Chất tác dụng với axit:  $\text{NH}_3$




b) (1) Cr (24): 2/8/13/1)

Cấu hình electron:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

*Ghi chú:* Vì chỉ biết  $Z = 24$  nên khi viết cấu hình electron học sinh phải nhớ có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

• Cr ở chu kỳ 4, nhóm VIB.

• Tính chất hoá học duy nhất của crom là tính khử. Ví dụ:



• Cr có số oxi hoá từ +1 đến +6 vì có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $3d^5 4s^1$  nên có khả năng tạo ra các hợp chất có số oxi hoá từ +1 đến +6.

(2) Thể tích mol/nguyên tử crom =  $52/7,19 = 7,232 \text{ cm}^3$ .

$$\text{Thể tích 1 nguyên tử Cr} = \frac{7,232}{6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 0,68 = 8,17 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3$$

Bán kính nguyên tử gần đúng của crom trong tinh thể:

$$r = \sqrt[3]{\frac{3}{4} \cdot \frac{V}{\pi}} \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3 \times 8,17 \cdot 10^{-24}}{4 \times 3,14}} = 1,25 \cdot 10^{-8} \text{ cm}.$$

**200.** a) Thế nào là hoá trị và số oxi hoá của nguyên tử của một nguyên tố? Viết công thức cấu tạo của clorua vôi và 2-cloetanal, cho biết hoá trị và số oxi hoá của mỗi nguyên tử trong các phân tử này.

b) Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai dãy sau:

Dãy 1: Fe,  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ; Zn,  $\text{Zn}^{2+}$ ; Ni,  $\text{Ni}^{2+}$ ; H,  $\text{H}^+$ ; Hg,  $\text{Hg}^{2+}$ ; Ag,  $\text{Ag}^+$ .

Dãy 2: Cl,  $\text{Cl}^-$ ; Br,  $\text{Br}^-$ ; F,  $\text{F}^-$ ; I,  $\text{I}^-$ .

#### GIẢI

a) Hoá trị là tính chất của nguyên tử của một nguyên tố chỉ hoá hợp được với một số nhất định nguyên tử của các nguyên tố khác.

Hoá trị của nguyên tử của nguyên tố là các số nguyên dương.

Số oxi hoá là điện tích của nguyên tử nếu giả định rằng các cặp electron trung chuyển hẳn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.





Số oxi hoá có giá trị dương hoặc âm, có thể là số nguyên hoặc bằng 0.

$\begin{array}{c} \text{O-Cl (1)} \\ \diagup \\ \text{Ca} \\ \diagdown \\ \text{Cl (2)} \end{array}$	Nguyên tử	Ca	O	Cl (1)	Cl (2)
	Hóa trị	2	2	1	1
	Số oxi hoá	+2	-2	+1	-1

$\begin{array}{c} \text{H O} \\      \\ \text{H-C-C} \\     \\ \text{Cl H} \end{array}$	Nguyên tử	H	O	Cl	C (1)	C(2)
	Hóa trị	1	2	1	4	4
	Số oxi hoá	+1	-2	-1	-1	+1

b) Sắp xếp:



201. a) (1) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hoá trị?

(2) Tại sao Ca chỉ có một trạng thái hoá trị là hoá trị 2, còn Fe lại có nhiều trạng thái hoá trị?

(3) Hãy so sánh tính khử của Ca với Fe, tính bazơ của  $\text{Fe(OH)}_2$  và  $\text{Fe(OH)}_3$ . Nêu ví dụ để minh hoạ.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của clo. Từ đó cho biết clo có hoá tính gì đặc trưng. So sánh tính oxi hoá giữa clo và iot, giải thích. Viết các phản ứng xảy ra giữa clo, iot với Fe, NaBr và  $\text{H}_2\text{S}$ .

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM và ĐH Đại cương, năm 1996)

### GIẢI


a) (1) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng.

Nhóm B là các electron ở lớp ngoài cùng và một phần ở lớp thứ 2 sát lớp ngoài cùng.


(2) Ca (2/8/8/2): có 2e hoá trị nên chỉ có một trạng thái hoá trị là hoá trị 2.

Fe (2/8/14/2): lớp thứ 2 sát lớp ngoài cùng chưa đủ 18e nên có nhiều trạng thái hoá trị.


(3) Tính khử  $\text{Ca} > \text{Fe}$ . Ví dụ:



Tính bazơ  $\text{Fe}(\text{OH})_2 > \text{Fe}(\text{OH})_3$ . Ví dụ:



b) Viết cấu hình electron nguyên tử clo:







\* Số electron hoá trị của clo là 7, clo có tính chất hoá học đặc trưng: tính oxi hoá mạnh:  $\text{Cl} + 1e \rightarrow \text{Cl}^-$

\* Tính oxi hoá của clo  $>$  iot. Vì bán kính nguyên tử của clo nhỏ hơn iot.



Cho nên khả năng nhận electron của clo  $>$  iot.

\* Các phản ứng:




202. a) Viết cấu hình electron của ion  $\text{Fe}^{2+}$  và  $\text{Fe}^{3+}$ . Cho ví dụ chứng tỏ nguyên tử Fe bị oxi hoá thành ion  $\text{Fe}^{2+}$  và  $\text{Fe}^{3+}$  (viết phương trình ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn), biết  $Z_{\text{Fe}} = 26$



(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải, năm 2000)

b) (1) Hãy viết sơ đồ phân bố electron vào các obitan trong nguyên tử S và ion  $\text{S}^{2-}$ , từ đó cho biết vì sao ion  $\text{S}^{2-}$  chỉ có tính khử còn S vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử?


(2) Trong hai phản ứng sau đây  $\text{H}_2\text{S}$  thể hiện tính axit hay bazơ, tính oxi hoá hay tính khử? Tại sao?



GIẢI









b) (1) Sơ đồ phân bố electron vào các obitan

Nguyên tử S




Ion  $\text{S}^{2-}$ :



Các obitan trong  $\text{S}^{2-}$  đã được lấp đầy các electron nên không thể thu thêm electron để thể hiện tính oxi hoá; chỉ có khả năng tách electron ra khỏi một số obitan để tăng số oxi hoá, thể hiện tính khử.

Trong nguyên tử S còn 2e độc thân ở 2 obitan 3p nên sẽ có khả năng thu thêm 2e để thể hiện tính oxi hoá.


(2)  $\text{H}_2\text{S}$  trong phản ứng:  $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$  thể hiện tính axit (cho proton) còn trong phản ứng:




203. Hoà tan hoàn toàn một khối lượng m gam  $\text{Fe}_x\text{O}_y$  bằng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng ta thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6g muối. Mặt khác cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Xác định công thức của oxit sắt.

*GIẢI*

- Phản ứng hoà tan  $\text{Fe}_x\text{O}_y$



Khí A là khí  $\text{SO}_2$ , khí này bị hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư nên chỉ tạo muối  $\text{Na}_2\text{SO}_3$



$$64\text{gam} \qquad 126\text{gam}$$

$$6,4\text{gam} \qquad 12,6\text{gam}$$

$$n_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3} = \frac{120}{400} = 0,3 \text{ mol}$$

$$n_{\text{SO}_2} = \frac{6,4}{64} = 0,1 \text{ mol}$$

Theo phương trình phản ứng (1) ta có:

$$\frac{(3x - 2y)}{x} = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}$$

Rút ra  $\frac{x}{y} = \frac{3}{4}$ . Công thức sắt oxit là  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .

**204.** Một kim loại M tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng thu được  $\text{M}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  và hỗn hợp khí E chứa  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$ . Khi hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại M trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng thu được 604,8ml hỗn hợp khí E (ở đktc) có tỉ khối hơi đối với  $\text{H}_2$  là 18,45. Xác định kim loại M.

*GIẢI*

Phương trình phản ứng:



$$x \text{ mol} \qquad \qquad \qquad \frac{3x}{10} \text{ mol}$$



$$y \text{ mol} \qquad \qquad \qquad \frac{3y}{8} \text{ mol}$$

$$\begin{cases} 0,3x + \frac{3y}{8} = \frac{604,8}{22400} = 0,027 \\ 28 \times 0,3x + 44 \times \frac{3y}{8} = 0,027 \times 2 \times 18,45 = 0,996 \\ \text{M}(x + y) = 2,16 \end{cases}$$


Giải các phương trình trên ta được  $\text{M} = 27$  (Al).

**205.** Hoà tan hoàn toàn 46,4g một kim loại oxit bằng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng (vừa đủ) thu được 2,24 lít khí  $\text{SO}_2$  (đktc) và 120 gam muối. Xác định công thức của kim loại oxit.

*GIẢI*

Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại.

Gọi công thức của oxit  $\text{M}_x\text{O}_y$  có số mol là a.



Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

$$46,4 + 98a(\text{nx}-\text{y}) = 120 + \frac{2,24}{22,4} \times 64 + 18a(\text{nx}-\text{y})$$

$$a(nx - y) = 1 \quad (1)$$

$$\text{Số mol SO}_2 = \frac{(nx - 2y)a}{2} = 0,1 \rightarrow (nx - 2y)a = 0,2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) rút ra: } nxa = 1,8 \quad (3)$$

$$ya = 0,8 \quad (4)$$

$$\text{Thay giá trị } ya = 0,8 \text{ vào phương trình } (xM + 16y)a = 46,4$$

$$xMa = 33,6 \quad (5)$$

$$\text{Từ phương trình } \frac{(5)}{(3)} = \frac{xMa}{nxa} = \frac{33,6}{1,8}. \text{ Rút ra } M = \frac{56}{3}n$$

Vì M nguyên nên  $n = 3 \rightarrow M = 56$ ; M là Fe.

$$\text{Từ phương trình } \frac{(3)}{(4)} = \frac{nxa}{ya} = \frac{3x}{y} = \frac{1,8}{0,8} = \frac{9}{4} \rightarrow \frac{x}{y} = \frac{3}{4}$$




Công thức của kim loại oxit:  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .

206. Hoà tan hoàn toàn 1,805 gam một hỗn hợp gồm Fe và một kim loại A có hoá trị n duy nhất bằng dung dịch HCl thu được 1,064 lít khí  $\text{H}_2$ , còn khi hoà tan 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng, dư thì thu được 0,896 lít khí NO duy nhất. Hãy xác định kim loại A và tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

GIẢI

Gọi x, y là số mol Fe và kim loại A. Kí hiệu A là nguyên tử khối của kim loại.

Các phương trình phản ứng:



Theo các phương trình phản ứng trên ta có:

$$\begin{cases} x + \frac{ny}{2} = \frac{1,064}{22,4} & (1) \\ x + \frac{ny}{3} = \frac{0,896}{22,4} & (2) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta có:  $x = 0,025$   
 $ny = 0,045$  (3)

Mặt khác theo khối lượng của hỗn hợp:

$$\begin{aligned} 0,025 \times 56 + yA &= 1,805 \\ yA &= 0,405 \end{aligned} \quad (4)$$

Từ phương trình  $\frac{(4)}{(3)} = \frac{yA}{ny} = \frac{0,405}{0,045}$  Rút ra  $A = 9n$

Nghiem duy nhất là  $n = 3$  và  $y = 0,015$

$$\%Fe = \frac{0,025 \times 56}{1,805} \times 100\% = 77,56\%$$

$$\%Al = 100 - 77,56 = 22,44\%.$$




207. Cho 3,61 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe tác dụng với 100ml dung dịch chứa  $AgNO_3$  và  $Cu(NO_3)_2$ , khuấy kĩ tới phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 8,12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Hoà tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 0,672 lít  $H_2$  (đktc).

Tính nồng độ mol của  $AgNO_3$  và  $Cu(NO_3)_2$  trong dung dịch ban đầu của chúng. Biết hiệu suất các phản ứng là 100%, số mol của Al và Fe là 0,03 mol và 0,05 mol.

#### GIẢI

Vì Al hoạt động hoá học mạnh hơn Fe và vì chất rắn B gồm 3 kim loại nên chúng phải là Ag, Cu và Fe dư.

Các phản ứng có thể xảy ra:



Các phản ứng (1) và (5) chắc chắn xảy ra, còn (2), (3) và (4) xảy ra hay không còn tùy thuộc lượng Al hay  $AgNO_3$  thừa thiếu. Dù các phản ứng xảy ra như thế nào, tất cả:  $Al - 3e \rightarrow Al^{3+}$ ;  $Fe - 2e \rightarrow Fe^{2+}$ ;  $Ag^+ + 1e \rightarrow Ag$ ;  $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$ ;  $2H^+ + 2e \rightarrow H_2$  ta vẫn có phương trình bảo toàn electron.

Gọi a, b là số mol  $\text{AgNO}_3$  và  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  trong 100ml dung dịch

$$\text{Số mol H}_2 = \frac{0,672}{22,4} = 0,03$$

Ta có phương trình:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0,03 \times 3 & + & 0,05 \times 2 & = & a \times 1 & + & 0,03 \times 2 & + & b \times 2 & (6) \\ \text{Số e Al} & & \text{Số e Fe} & & \text{Số e Ag}^+ & & \text{Số e H}^+ & & \text{Số e Cu}^{2+} \\ \text{cho} & & \text{cho} & & \text{nhận} & & \text{nhận} & & \text{nhận} \end{array}$$

$$\text{Hoặc: } a + 2b = 0,13$$

Mặt khác khối lượng B (gồm 3 kim loại) bằng

$$108a + 64b + 0,03 \times 56 = 8,12$$

$$108a + 64b = 6,44 \quad (7)$$

Giải hệ phương trình (6), (7) ta có:

$$a = 0,03 \text{ và } b = 0,05$$

$$[\text{AgNO}_3] = \frac{0,03}{0,1} = 0,3\text{M}$$

$$[\text{Cu}(\text{NO}_3)_2] = \frac{0,05}{0,1} = 0,5\text{M}.$$

## BÀI TẬP TỰ GIẢI

**208.** Phản ứng oxi hoá - khử là quá trình:

- a) diễn ra sự oxi hoá và chất khử.
- b) xảy ra sự trao đổi electron.
- c) phản ứng có kèm theo sự thay đổi số oxi hoá.
- d) diễn ra sự chuyển hoá chất này thành chất khác.

**209.** Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp cân bằng electron:

- a)  $\text{Al} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- b)  $\text{C} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- c)  $\text{Co} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Co}(\text{NO}_3)_2 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- d)  $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{MnCl}_2 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
- e)  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{NO} + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- f)  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HI} \rightarrow \text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- g)  $\text{Cl}_2 + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- h)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl} \rightarrow \text{KCl} + \text{CrCl}_3 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

- j)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{Fe} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{Fe}_3\text{O}_4$   
 k)  $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$   
 l)  $\text{KNO}_3 + \text{Al} + \text{KOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{KAlO}_2$   
 m)  $\text{KBr} + \text{PbO}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{Br}_2 + \text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$   
 n)  $\text{FeS} + \text{Cu}_2\text{S} + \text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{NO}\uparrow + \text{H}_2\text{O}$   
 o)  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc} \rightarrow \text{CO}_2\uparrow + \text{SO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$   
 p)  $\text{KClO}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{KNO}_3 + \text{KCl} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$   
 q)  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2 + \text{C} \rightarrow \text{P}_4 + \text{CaSiO}_3 + \text{CO}$

**210.** Cân bằng, viết dưới dạng ion thu gọn các phương trình hoá học sau:

- a)  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$   
 b)  $\text{FeS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O}$   
 c) Kim loại M phản ứng với dung dịch axit nitric thu được sản phẩm là muối nitrat, nước và một trong các chất NO,  $\text{N}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ .

d) Dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng tác dụng với  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , dung dịch  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{FeO}$ .

e)  $\text{C}_4\text{H}_8 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8(\text{OH})_2 + \text{KOH} + \text{MnO}_2$

**211.** Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng ion-electron.


- a)  $\text{KMnO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$   
 b)  $\text{KMnO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$   
 c)  $\text{P} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NO}$   
 d)  $\text{P} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$   
 e)  $\text{P} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NO}$   
 f)  $\text{P} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 + \text{KNO}_2$   
 g)  $\text{KMnO}_4 + \text{PH}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

**212.** Cân bằng các phản ứng hoá học sau theo phương pháp cân bằng electron:




- a)  $\text{M}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MOH} + \text{O}_2$  (M là kim loại kiềm)  
 b)  $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}$   
 c)  $\text{FeS} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NH}_4\text{NO}_3$   
 d)  $\text{CuFeS}_2 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$   
 e)  $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{KClO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{KCl}$   
 f)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{FeCl}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{CrCl}_3 + \text{Cl}_2 + \text{FeCl}_3 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$   
 g)  $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$   
 h)  $\text{C}_x\text{H}_y\text{O} + \text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{MnCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$

**213.** a) Viết và cân bằng phương trình phản ứng ở dạng lỏng quát khi cho nguyên tố M lưỡng tính tác dụng với dung dịch NaOH.



b) Cân bằng các phản ứng hoá học sau theo phương pháp ion-electron:







c) Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới dạng phân tử và dạng ion:







(6)  $Fe_xO_y$  với dung dịch HCl và dung dịch  $HNO_3$  (tạo ra khí NO nếu có). Trong các phản ứng này, trường hợp nào tạo ra phản ứng oxi hoá-khử? phản ứng trao đổi?



d) Hoàn thành phương trình phản ứng và viết dưới dạng phân tử, ion



e) Hoàn thành các phương trình phản ứng và viết dưới dạng phân tử



**214.** a) Cho các kim loại thông dụng sau đây: sắt, đồng, chì, nhôm. Những kim loại đó có tính chất hoá học quan trọng gì? Sắp xếp mức độ hoạt động của các kim loại trên.

Giải thích mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại.

b) Có 5 dung dịch, mỗi dung dịch có chứa một trong những ion sau:  $Zn^{2+}$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Fe^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Pb^{2+}$  và 5 kim loại Zn, Cu, Mg, Fe và Pb. Hãy cho biết những kim loại tác dụng với dung dịch nào? Hãy sắp xếp khả năng khử và khả năng oxi hoá tăng dần.

215. a) Cho lá Mn vào các dung dịch sau:

HCl,  $\text{SnSO}_4$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{AgNO}_3$ . Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion và ion thu gọn nếu có.

b) Dùng các phản ứng thích hợp để chứng minh thứ tự hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần trong dãy K, Ca, Mg, Al, Ni.

c) Để hoà tan 4 gam oxit  $\text{Fe}_x\text{O}_y$  cần 52,14ml dung dịch HCl 10% ( $d = 1,05\text{g/ml}$ ). Công thức phân tử của sắt oxit là:

- A. FeO    B.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$     C.  $\text{Fe}_3\text{O}_4$     D. Không xác định được.

216. Cho X lít CO (ở điều kiện tiêu chuẩn) đi qua ống sứ đựng a gam  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  đốt nóng. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}$ . Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y đi qua ống sứ, có tỉ khối so với heli là 8,5. Nếu hoà tan chất rắn Z còn lại trong ống sứ thấy tốn hết 50ml dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,5M, còn nếu dùng dung dịch  $\text{HNO}_3$  thì thu được một loại muối sắt duy nhất có khối lượng nhiều hơn chất rắn Z là 3,48g.

Thể tích các khí  $\text{CO}_2$  và CO lần lượt trong hỗn hợp Y là:

- A. 62,5% và 37,5%    B. 40% và 60%  
C. 50% và 50%    D. 37,5% và 62,5%.

217. Trộn đều 83 gam hỗn hợp bột Al,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm.

Giả sử lúc đó chỉ xảy ra 2 phản ứng khử oxit thành kim loại. Chia hỗn hợp sau phản ứng thành 2 phần có khối lượng chênh lệch nhau 66,4 gam. Lấy phần có khối lượng lớn hoà tan bằng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dư, thu được 23,3856 lít  $\text{H}_2$  (ở đktc), dung dịch X và chất rắn. Lấy 1/10 dung dịch X cho tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,018M (biết rằng trong môi trường axit  $\text{Mn}^{7+}$  bị khử thành  $\text{Mn}^{2+}$ )

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Cho biết trong hỗn hợp ban đầu có số mol của CuO gấp n lần số mol của  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , tính % mỗi oxit kim loại bị khử. Áp dụng  $n = \frac{3}{2}$ .

218. Lắc m gam bột Fe với dung dịch A gồm  $\text{AgNO}_3$  và  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  đến khi phản ứng kết thúc, thu được x gam chất rắn B. Tách B, thu được nước lọc C.

Cho nước lọc C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được a gam kết tủa hai hidroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn.

Cho chất rắn B tác dụng hết với dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng thu được V lít khí NO (đktc).

a) Lập biểu thức tính m theo a, b.

b) Cho  $a = 36,8$ ;  $b = 32$ ;  $x = 34,4$ .

(1) Tính giá trị của m.

(2) Tính số mol của mỗi muối trong dung dịch A ban đầu.

(3) Tính thể tích V của khí NO.

219. Oxi hoá hoàn toàn 4,368 gam bột Fe ta thu được 6,096 gam hỗn hợp hai sắt oxit (hỗn hợp X). Chia hỗn hợp X thành 3 phần bằng nhau.

a) Thể tích (lít) khí  $\text{H}_2$  (ở đktc) để khử hoàn toàn các oxit trong phần một là:



A. 0,64    B. 0,78    C. 0,8064    D. 0,8    E. Kết quả khác

b) Thể tích khí NO (lít) duy nhất bay ra (ở đktc) khi hoà tan hoàn toàn phần thứ hai bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng là:

A. 0,04    B. 0,048    C. 0,08    D. 0,0448    E. A đúng

c) Phần thứ ba trộn với 10,8gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (hiệu suất 100%). Hoà tan hỗn hợp thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư. Thể tích khí bay ra (ở đktc) là:

A. 13 lít    B. 15 lít    C. 14 lít    D. 15,2 lít    E. 13,82 lít

**220.** Hợp chất hữu cơ A chứa 9,09% hidro, 18,18% nitơ. Phần còn lại là cacbon và oxi. Khi đốt cháy 3,85 gam chất A ta thu được 2,464 lít  $\text{CO}_2$  ở  $27,3^\circ\text{C}$  và 760mmHg; khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của benzen.

a) Xác định công thức phân tử của A.

b) Cho 0,77 gam A tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, sau đó đem cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn khan. Tính m.

c) Trong một bình kín dung tích không đổi 2,24 lít chứa oxi (ở đktc) và 1,54 gam chất A (thể tích không đáng kể). Sau khi bật tia lửa điện, để đốt cháy hết A, giữ nhiệt độ bình ở  $136,5^\circ\text{C}$ , giả sử tất cả nitơ bị cháy hết thành  $\text{NO}_2$ , áp suất trong bình lúc này là bao nhiêu?

Cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 500 gam dung dịch KOH 11,2% ta được dung dịch B. Tính nồng độ % của KOH trong dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với  $\text{BaCl}_2$  dư được kết tủa và dung dịch D. Lọc bỏ kết tủa. Cho một lượng Zn (dư) tác dụng với dung dịch D. Tính thể tích (ở đktc) hỗn hợp khí thoát ra, biết rằng trong môi trường kiềm các ion nitrat và nitrit bị khử thành  $\text{NH}_3$ .

**221.** a) Cho oxit  $\text{A}_x\text{O}_y$  của kim loại A có hoá trị không đổi. Cho 1,53 gam  $\text{A}_x\text{O}_y$  nguyên chất tan trong  $\text{HNO}_3$  dư thu được 2,61 gam muối. Công thức của oxit trên là:

A. CaO    B. MgO    C. BaO    D. CuO    E. Kết quả khác.

b) Cho hỗn hợp bột Fe, Cu vào bình chứa 200ml dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng, dư thu được 4,48 lít khí  $\text{H}_2$  (ở điều kiện tiêu chuẩn), dung dịch A và một chất không tan B. Để oxi hoá hỗn hợp các sản phẩm còn trong bình, người ta phải cho thêm vào đó 20,2 gam  $\text{KNO}_3$ . Sau khi phản ứng xảy ra người ta thu được một khí không màu hoá nâu ngoài không khí và một dung dịch C. Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch người ta cần 200ml dung dịch NaOH 2M.

(1) Tính khối lượng các kim loại và thể tích khí không màu.

(2) Tính nồng độ mol/l của dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

**222.** a) Cho P vào 210 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  60%. Phản ứng tạo thành  $\text{H}_3\text{PO}_4$  và NO. Dung dịch sản phẩm có tính axit và phải trung hoà bằng 3,33 lít NaOH 1M mới hết tính axit. Khối lượng (gam) P đã tham gia phản ứng và thể tích khí NO (ở đktc) là:

A. 30    B. 31,5    C. 32    D. 31    E. Kết quả khác.


b) Hoà tan 1,44 gam hỗn hợp đồng kim loại và đồng oxit vào trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  đậm đặc, giải phóng 0,224 lít khí ở  $0^\circ\text{C}$  và áp suất 2 atm. Nếu lấy 7,2 gam hỗn hợp đó khử bằng  $\text{H}_2$  giải phóng 0,9 gam nước. Biết rằng hoá trị của đồng không thay đổi.

Công thức của đồng oxit là:

A.  $\text{Cu}_2\text{O}$     B.  $\text{Cu}_2\text{O}_2$     C.  $\text{Cu}_2\text{O}_3$     D. CuO.

## HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG IV

215. c) Đáp số đúng: B



$$n_{\text{HCl}} = \frac{52,14 \times 1,05 \times 10}{100 \times 36,5} = 0,15 \text{ mol}$$

Theo phương trình trên ta có tỉ lệ:  $\frac{4}{56x + 16y} = \frac{0,15}{2y}$







Giải ra ta có:  $x : y = 2 : 3$ . Vậy công thức của sắt oxit  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  các sắt oxit khác không tồn tại

216. Đáp số đúng D.

Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp Y: %  $V_{\text{CO}_2} = 37,5\%$ ; %  $V_{\text{CO}}$  chiếm 62,5%.

219. Đáp số đúng: a) C; b) D và c) E.

a) Các phản ứng có thể xảy ra:



Từ các phản ứng trên ta nhận thấy:


– Số oxi hoá của Fe không thay đổi.

– Số mol  $\text{H}_2 = 2$  số mol  $\text{O}_2$ . Thực chất là phản ứng:  $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

Như vậy hidro cho và oxi nhận electron:

$$n_{\text{H}_2} = 2n_{\text{O}_2} = 2 \times \frac{1}{3} \cdot \frac{6,096 - 4,368}{32} = 0,036 \Rightarrow V_{\text{H}_2} = 0,036 \times 22,4 = 0,8046 \text{ lít.}$$


b) Các phản ứng hoà tan có thể có:



Qua các phương trình oxi hoá khử từ ban đầu, thì tổng số electron mà chất khử cho phải bằng tổng số electron mà các chất oxi hoá nhận.

Ta nhận thấy: tất cả Fe từ số oxi hoá là 0 (Fe) là chất khử thành số oxi hoá +3 (Fe).

–  $\overset{+5}{\text{N}}$  là chất oxi hoá nhận 3e thành  $\overset{+2}{\text{N}}$ , nếu gọi số mol NO thoát ra là n, ta có:  
 $n\overset{+5}{\text{N}} + 3\text{ne} \rightarrow n\overset{+2}{\text{N}}$







Ta có phương trình bảo toàn electron:





$$3n + 0,018 \times 4 = \frac{4,368}{56} \times \frac{1}{3} \times 3 = 0,078 \Rightarrow n = 0,002 \text{ mol}$$

$$V_{\text{NO}} = 0,002 \times 22,4 = 0,0448 \text{ lít}$$

c) Các phản ứng có thể có:



Xét các phương trình phản ứng (1), (2), (3), (10), (11), (12), (13) và (14) ta thấy:



Gọi m là số mol  $\text{H}_2$  thoát ra:  $2\text{mH}^+ + 2\text{me} \rightarrow \text{mH}_2$



Ta có phương trình bảo toàn electron như sau:

$$\frac{0,078}{3} \times 2 + \frac{10,8}{27} \times 3 = 0,018 + m \times 2$$

$$m = 0,617 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{H}_2} = 0,617 \times 22,4 = 13,82 \text{ lít.}$$

221. a) Đáp số đúng: C

b) Viết phương trình phản ứng oxi hoá khử:



222. a) Đáp số đúng: D

– Lập phương trình tính số mol  $\text{HNO}_3$  tác dụng với P và NaOH.

– Lập phương trình tính số mol NaOH tác dụng với  $\text{HNO}_3$  và  $\text{H}_3\text{PO}_4$ .

Giải hệ phương trình ta tính được: Khối lượng P là 31 gam



$$V_{\text{NO}} = 37,24 \text{ lít.}$$

b) Đáp số đúng: D.





CHỦ ĐỀ 1

Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng


223. Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau:





GIẢI




















224. Bổ túc các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)






GIẢI




(D) (G)






GIẢI









(E)




(A) (B)



226. a) Viết các phản ứng thực hiện biến hoá sau:




b) Xác định các chất theo sơ đồ biến hoá sau:



GIẢI




(A)





(B)





(C)















(A)



227. a) Viết các phương trình biểu diễn chuỗi phản ứng sau:



GIẢI



### NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

#### 1. Lựa chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết các chất

##### a) Phương pháp:

Dựa vào tính chất vật lí, hoá học (tùy theo đề bài) để nhận biết các hoá chất như dựa trên dấu hiệu về màu sắc, mùi và tính tan hoặc phản ứng tạo chất kết tủa, bay hơi.

##### b) Các loại thuốc thử thường dùng:

###### (1) Quỳ tím:

- Nhận biết dung dịch axit quỳ tím hoá đỏ
- Nhận biết dung dịch bazơ quỳ tím hoá xanh
- Nhận biết dung dịch muối (của axit mạnh – bazơ yếu). Ví dụ:  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ...: quỳ tím hoá đỏ.
- Nhận biết dung dịch muối (của axit yếu – bazơ mạnh). Ví dụ:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ...: quỳ tím hoá xanh.

###### (2) Dung dịch $\text{AgNO}_3$ :

- Ion  $\text{Cl}^-$ :  $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow$  (màu trắng)
- Ion  $\text{Br}^-$ :  $\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \longrightarrow \text{AgBr} \downarrow$  (màu vàng nhạt)
- Ion  $\text{I}^-$ :  $\text{Ag}^+ + \text{I}^- \longrightarrow \text{AgI} \downarrow$  (màu vàng sậm)

### BÀI TẬP

228. a) Dùng thuốc thử thích hợp, hãy nhận biết các dung dịch sau đã mất nhãn:

(1)  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaBr}$ ,  $\text{KI}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{KOH}$

(2)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{NaNO}_3$ .

b) Dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết các dung dịch sau đây:

(1)  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{KBr}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{KI}$ ,  $\text{KOH}$

(2)  $\text{KI}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$

(3)  $\text{HCl}$ ,  $\text{HBr}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaOH}$

(4)  $\text{NaF}$ ,  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{KBr}$ ,  $\text{MgI}_2$ .



### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) (1) \* Dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch KOH,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , HCl. Dùng dung dịch  $\text{AgNO}_3$  để nhận biết dung dịch HCl, còn lại là dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (hoặc dùng dung dịch  $\text{BaCl}_2$  để nhận biết  $\text{H}_2\text{SO}_4$  còn lại là dung dịch HCl).

\* Phân biệt các dung dịch NaCl, NaBr, KI hoặc dùng khí clo hoặc nhận biết dựa vào màu sắc chất sinh ra khi đốt trên ngọn lửa đèn khí.

(2) \* Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

\* Còn lại dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , KCl,  $\text{NaNO}_3$  dùng dung dịch  $\text{BaCl}_2$  nhận biết được  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ . Dùng dung dịch  $\text{AgNO}_3$  nhận biết được KCl còn lại là dung dịch  $\text{NaNO}_3$ .

b) (1) Dùng quỳ tím nhận biết HCl, KOH.

Dùng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  nhận biết  $\text{BaCl}_2$  còn lại KI, KBr.

Dùng khí  $\text{Cl}_2$  phân biệt các dung dịch KI và KBr.

(2) Dùng quỳ tím nhận biết HCl,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Dùng dung dịch  $\text{BaCl}_2$  phân biệt HCl và  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Dùng dung dịch  $\text{AgNO}_3$  để phân biệt dung dịch KI và NaCl. ( $\text{AgI} \downarrow$  màu vàng tươi;  $\text{AgCl} \downarrow$  màu trắng).

Hoặc đốt: KI ngọn lửa màu tím; NaCl ngọn lửa màu vàng.

(3) Dùng quỳ tím nhận biết dung dịch các dung dịch NaOH, HCl, HBr.

Dùng  $\text{Cl}_2$  phân biệt HCl và HBr hoặc dùng  $\text{AgNO}_3$  cũng phân biệt được  $\text{AgBr} \downarrow$  (vàng) và  $\text{AgCl} \downarrow$  (màu trắng).

(4) Cho 4 mẫu thử tác dụng với dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  có hai mẫu thử có phản ứng là  $\text{CaCl}_2$  và  $\text{MgI}_2$ .

Phân biệt hai mẫu thử  $\text{CaCl}_2$  và  $\text{MgI}_2$  bằng  $\text{Cl}_2$ .

Phân biệt NaF và KBr cũng bằng  $\text{Cl}_2$ .

229. a) Có 5 lọ đựng khí riêng biệt các khí sau:  $\text{O}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ , HCl,  $\text{O}_3$ ,  $\text{SO}_2$ . Làm thế nào để nhận ra từng khí?

b) Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau:

(1)  $\text{MgCl}_2$ , KBr, NaI,  $\text{AgNO}_3$  và  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$

(2) NaBr,  $\text{ZnSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{AgNO}_3$  và  $\text{BaCl}_2$

c) Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau là: NaCl,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{MgCO}_3$ ,  $\text{BaCO}_3$ . Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình điện phân v.v...) Hãy trình bày cách nhận biết từng chất trên.

a) Khí  $\text{Cl}_2$  có màu vàng lục.


Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI nhận biết được  $\text{O}_3$ :



$\text{I}_2$  làm hồ tinh bột chuyển màu xanh.

Dùng quỳ tím thấm nước nhận biết được dung dịch HCl và  $\text{SO}_2$ . Còn lại là khí  $\text{O}_2$ .


– Phân biệt lọ khí HCl và  $\text{SO}_2$  bằng dung dịch nước brom.  $\text{SO}_2$  làm mất màu dung dịch brom



b) (1) \* Dùng dung dịch NaOH cho vào 5 mẫu thử:

$\text{MgCl}_2 \rightarrow$  kết tủa  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  màu trắng



$\text{AgNO}_3 \rightarrow$  kết tủa không bền dễ ngoài không khí cho  $\text{Ag}_2\text{O}$  (màu đen)





$\text{NH}_4\text{HCO}_3 \rightarrow$  khí mùi khai  $\text{NH}_3 \uparrow$

\* Dùng dung dịch  $\text{AgNO}_3$  để phân biệt KBr và KI ( $\text{AgBr} \downarrow$  màu vàng nhạt;  $\text{AgI} \downarrow$  màu vàng sậm hơn).

(2) \* Cho dung dịch HCl tác dụng với 5 mẫu thử sẽ có 2 mẫu thử cho phản ứng mà nhận biết được:



\* Dùng  $\text{AgNO}_3$  cho vào 3 mẫu thử còn lại sẽ có 2 mẫu thử cho kết tủa



Còn lại  $\text{ZnSO}_4 + \text{AgNO}_3$  không có biểu hiện gì.

c) Lấy từng lượng muối nhỏ để làm thí nghiệm:


– Hòa tan vào  $\text{H}_2\text{O}$ , tách thành 2 nhóm:

+ Nhóm I: Tan trong  $\text{H}_2\text{O}$  là  $\text{NaCl}$  và  $\text{AlCl}_3$

+ Nhóm II: Không tan là  $\text{MgCO}_3$  và  $\text{BaCO}_3$


– Điện phân dung dịch các muối nhóm I (có màng ngăn):







Khi kết thúc điện phân, ở vùng catot của bình điện phân nào có kết tủa keo xuất hiện, đó là bình đã chứa muối  $\text{AlCl}_3$ , bình kia là  $\text{NaCl}$ .

– Thực hiện phản ứng:





Hoà tan muối nhóm II vào dung dịch  $\text{HCl}$ :



Điện phân dung dịch  $\text{NaCl}$  (có màng ngăn) để thu dung dịch  $\text{NaOH}$ .

Dùng dung dịch  $\text{NaOH}$  để phân biệt muối  $\text{MgCl}_2$  và  $\text{BaCl}_2$ . Từ đó suy ra  $\text{MgCO}_3$  và  $\text{BaCO}_3$ :



**2. Không dùng thuốc thử khác. Chỉ dùng chất của đầu bài để phân biệt các chất đã cho.**

*Phương pháp:*

- Các phản ứng hoá học đặc trưng của các hoá chất cần nhận biết.
- Lập bảng để nhận biết. (Tùy theo đề bài).

## BÀI TẬP

**230.** a) Không dùng một hoá chất nào khác hãy phân biệt:  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  và  $\text{CaCl}_2$ .


b) Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch:  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , hãy nhận biết lọ nào đựng dung dịch gì mà không được dùng bất cứ thuốc thử nào.

### GIẢI


a)		$\text{NaHCO}_3$	$\text{NaCl}$	$\text{CaCl}_2$	$\text{Na}_2\text{CO}_3$
1.	$\text{NaHCO}_3$			Đun nhẹ $\text{CaCO}_3\downarrow$	
2.	$\text{NaCl}$				
3.	$\text{CaCl}_2$	Đun nhẹ $\text{CaCO}_3\downarrow$			$\text{CaCO}_3\downarrow$
4.	$\text{Na}_2\text{CO}_3$			$\text{CaCO}_3\downarrow$	

Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với 3 mẫu còn lại. Dựa vào bảng trên ta thấy khi cho một mẫu thử nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy ra một trong bốn trường

hợp. Trong các trường hợp trên, duy chỉ có trường hợp 3 chỉ thử một lần đã phân biệt được  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vì khi cho  $\text{CaCl}_2$  vào lúc đầu có kết tủa:



Dun nhẹ các dung dịch còn lại, lại xuất hiện kết tủa vì:






Như vậy dung dịch còn lại không tác dụng là  $\text{NaCl}$ .

b) Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với ba mẫu thử còn lại ta có kết quả:

	HCl	$\text{H}_2\text{SO}_4$	$\text{BaCl}_2$	$\text{Na}_2\text{CO}_3$
1. HCl				$\text{CO}_2\uparrow$
2. $\text{H}_2\text{SO}_4$			$\text{BaSO}_4\downarrow$	$\text{CO}_2\uparrow$
3. $\text{BaCl}_2$		$\text{BaSO}_4\downarrow$		$\text{BaCO}_3\downarrow$
4. $\text{Na}_2\text{CO}_3$	$\text{CO}_2\uparrow$	$\text{CO}_2\uparrow$	$\text{BaCO}_3\downarrow$	

Dựa vào bảng trên ta thấy khi cho một mẫu thử nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy ra một trong bốn trường hợp. Trong các trường hợp trên, duy nhất chỉ có trường hợp 2 là chỉ phải tiến hành một lần đã phát hiện được dung dịch  $\text{BaCl}_2$  và  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vì khi cho  $\text{H}_2\text{SO}_4$  vào 3 mẫu thử còn lại, một mẫu dung dịch trong suốt là HCl, một mẫu có kết tủa là  $\text{BaCl}_2$ , một mẫu có  $\text{CO}_2$  bay lên là  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .



**231.** Không dùng hoá chất nào khác hãy phân biệt 4 dung dịch chứa các hoá chất sau:  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{HCl}$ , phenolphtalein.

#### GIẢI

– Ta nhỏ lần lượt một mẫu thử vào ba mẫu thử còn lại đến khi nào thấy 2 mẫu thử nhỏ vào nhau biến thành màu hồng thì cặp đó là dung dịch  $\text{NaOH}$  và phenolphtalein. Còn lại là dung dịch  $\text{NaCl}$  và dung dịch  $\text{HCl}$ . Chia ống nghiệm có màu hồng thành hai phần. Lấy hai mẫu thử đựng dung dịch  $\text{NaCl}$  và dung dịch  $\text{HCl}$ , mỗi mẫu thử đổ vào một ống nghiệm màu hồng, mẫu nào làm màu hồng mất đi là dung dịch  $\text{HCl}$  (vì axit trung hoà hết  $\text{NaOH}$ , nên môi trường trung tính, phenolphtalein không đổi màu). Ta phân biệt được dung dịch  $\text{HCl}$  và dung dịch  $\text{NaCl}$ .

– Ống nghiệm từ màu hồng chuyển sang không màu, lúc này chỉ chứa  $\text{NaCl}$  và phenolphtalein. Ta dùng nó để nhận biết dung dịch  $\text{NaOH}$  bằng cách nhỏ vào một trong hai ống nghiệm chưa phân biệt, ống nghiệm nào biến thành màu hồng đó là  $\text{NaOH}$ , ống còn lại là phenolphtalein.

## TÁCH CÁC CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

232. a) Nêu cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp:

(1)  $\text{Cl}_2$  có lẫn  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2$

(2)  $\text{Cl}_2$  có lẫn  $\text{CO}_2$ .


b) Nêu cách tinh chế:

(1) Muối ăn có lẫn  $\text{MgCl}_2$  và  $\text{NaBr}$

(2) Axit clohidric có lẫn axit  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

GIẢI

a) (1) Cho dư khí  $\text{H}_2$  vào hỗn hợp rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho hỗn hợp khí qua nước ta được dung dịch  $\text{HCl}$ . Cho dung dịch  $\text{HCl}$  tác dụng với  $\text{MnO}_2$  ta được khí  $\text{Cl}_2$ .



(2) Cho dư khí  $\text{H}_2$  vào hỗn hợp, rồi lại tiến hành như trên.

b) (1) Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  dư vào dung dịch chứa 3 muối trên:




Lọc kết tủa, sau đó cho khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch chứa  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , có lẫn  $\text{NaBr}$ .



Cô cạn dung dịch, brom bay hơi, còn lại  $\text{NaCl}$  và  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , cho dung dịch  $\text{HCl}$  vào đến khi hết khí  $\text{CO}_2$  bay lên, cô cạn dung dịch được  $\text{NaCl}$ .

(2) Cho dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào dung dịch chứa  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$



Lọc lấy kết tủa, ta có dung dịch  $\text{HCl}$ . Nếu có dư  $\text{BaCl}_2$ , ta cho hỗn hợp sau phản ứng bay hơi, thu lấy hơi nước và khí  $\text{HCl}$ , ta được dung dịch  $\text{HCl}$ .

233. a) Một loại muối ăn có lẫn tạp chất  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{CaSO}_4$ . Hãy trình bày cách loại các tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết.



b) Hãy đề nghị cách tách lấy từng muối trong hỗn hợp rắn gồm: amoni clorua, bari clorua, magiê clorua. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

GIẢI

a) – Hoà tan muối ăn vào nước cất

– Thêm dung dịch  $\text{BaCl}_2$  dư để loại ion  $\text{SO}_4^{2-}$  ở dạng  $\text{BaSO}_4$  kết tủa trắng.


Phương trình phản ứng:



- Lọc bỏ kết tủa  $\text{BaSO}_4$
- Thêm  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  dư để loại ion  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ 

$$\text{MgCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{MgCO}_3\downarrow$$

$$\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3\downarrow$$
- Lọc bỏ kết tủa  $\text{MgCO}_3$ ,  $\text{CaCO}_3$ .
- Thêm dung dịch  $\text{HCl}$  để loại bỏ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  dư
$$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
- Cô cạn dung dịch ta thu được muối ăn tinh khiết



### CHỦ ĐỀ 3


**Xác định tên nguyên tố halogen và công thức phân tử muối halogenua**

#### PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

- Dựa vào cấu hình electron của các nguyên tố halogen.
- Dựa vào phương trình kết tủa  $\text{AgX}$  để xác định nguyên tố halogen:



- Dựa vào phương trình điện phân nóng chảy muối của kim loại hoạt động hoá học mạnh để xác định kim loại và nguyên tố halogen.



– Khi đề bài cho hai kim loại có cùng hoá trị, tác dụng với cùng một lượng muối, điều đó có nghĩa là số mol 2 kim loại tác dụng là như nhau.

234 a) Hai nguyên tử A, B có cấu hình e ngoài cùng lần lượt là  $3s^x$  và  $3p^5$ . Xác định vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn. Biết phân lớp 3s của 2 nguyên tử hơn kém nhau 1e.

b) Nguyên tố A có electron ở phân lớp ngoài cùng là  $3s^2 3p^5$ .

(1) Viết cấu hình electron, xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn.

(2) Nguyên tố A có thể có những số oxi hoá nào?

(3) Với các hidroxit ứng với oxi hoá dương của A, hãy cho biết:

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên
- Sự biến thiên tính bền, tính oxi hoá, tính axit.


**GIẢI**

a) A:  $3s^1$   
B:  $3s^2 3p^5$

x phải bằng 1 vì lớp 3s của A, B hơn kém nhau 1e mà 3s tối đa có 2e.

A:  $3s^1$ : chu kì 3, nhóm IA

B:  $3s^2 3p^5$ : chu kì 3, nhóm VIIA


b) (1) Nguyên tố A:  $3p^5$  

Cấu hình e: A:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Vậy A thuộc nhóm VIIA; chu kì 3 là clo.

(2) Số oxi hoá (có thể có) của clo: -1; 0; +1; +3; +5; +7

Giải thích: Do sự phân bố e ở lớp ngoài của nguyên tử các nguyên tố A

Clo   
 $3s^2 \quad 3p^5 \quad 3d$

Ở trạng thái cơ bản: clo có 1e độc thân.



Khi kích thích e lên các obitan d trống thì số e độc thân của Cl lần lượt là 3, 5, 7.

Vì vậy, khi kết hợp với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, thì:

Clo sẽ thể hiện số oxi hoá dương và là dương lẻ: +1; +3; +5; +7

(3) – Axit hipoclorơ:  $\text{HClO}$        $\text{H}-\text{O}-\text{Cl}$   
Axit clorơ:  $\text{HClO}_2$        $\text{H}-\text{O}-\text{Cl}=\text{O}$   
Axit cloric:  $\text{HClO}_3$        $\text{H}-\text{O}-\text{Cl} \begin{matrix} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{O} \end{matrix}$





- Tính bền tăng, tính axit tăng
- Tính oxi hoá giảm

235. a) Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tỷ lệ giữa phần trăm nguyên tố R trong oxit cao nhất và phần trăm R trong hợp chất khí với hidro bằng 0,5955.

Cho 4,05g một kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng hết với đơn chất R thì thu được 40,05g muối. Xác định công thức của muối M.

b) Điện phân nóng chảy a gam một muối A tạo bởi kim loại M và phi kim hoá trị 1 (X) thu được 0,896 lít khí nguyên chất (ở đktc). Hoà tan a gam muối A vào 100ml dung dịch HCl 1M rồi cho tác dụng với dung dịch  $\text{AgNO}_3$  dư thu được 25,83g kết tủa.

Xác định tên phi kim công thức tổng quát của muối A.

*GIẢI*

a) Đặt hoá trị của R là x





Hợp chất với oxi có công thức  $\text{R}_2\text{O}_x$

Hợp chất với hidro có công thức  $\text{RH}_{8-x}$

$$\begin{aligned} \text{Theo đầu bài: } \frac{\frac{2R}{R+8-x}}{\frac{2R+16x}{R}} &= 0,5955 \\ \frac{2R(R+8-x)}{(2R+16x).R} &= 0,5955 \end{aligned}$$

Giải phương trình trên ta có R là Br, viết phương trình M tác dụng với  $\text{Br}_2$ , từ đó lập phương trình tìm công thức muối là  $\text{AlBr}_4$ .

b) Kí hiệu M, X lần lượt là nguyên tử khối của kim loại M và phi kim X, n là hoá trị của kim loại.



Khối lượng kết tủa AgX là:  $25,83 - (0,1 \times 143,5) = 11,48\text{g}$



$$n_{X_2} \text{ có trong muối A: } \frac{0,896}{22,4} = 0,04 \text{ mol}$$

$$n_{AgX} \text{ thu được (phương trình 2)} = 0,08$$

$$M_{AgX} = \frac{11,48}{0,08} = 143,5$$

$$X = 143,5 - 108 = 35,5; \text{ X là Cl}$$

Vậy muối A có công thức tổng quát MCl.

**236.** a) Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch  $AgNO_3$  dư, thu được 57,34 gam kết tủa.

(1) Tìm công thức của NaX, NaY.

(2) Tính khối lượng mỗi muối.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TPHCM, năm 2000)

b) Một muối được tạo bởi kim loại M hoá trị II và phi kim hoá trị I. Hoà tan m gam muối này vào nước và chia dung dịch làm hai phần bằng nhau:

– Phần I: Cho tác dụng với dung dịch  $AgNO_3$  có dư thì được 5,74 gam kết tủa trắng.

– Phần II: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch muối, sau một thời gian phản ứng kết thúc khối lượng thanh sắt tăng lên 0,16 gam.

(1) Tìm công thức phân tử của muối.

(2) Xác định trị số của m.

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) – Viết phương trình phản ứng của NaX và NaY với  $AgNO_3$ .

– Lập hệ phương trình (gọi  $n_{NaX}$ : a mol ;  $n_{NaY}$ : b mol)

$$\left. \begin{array}{l} (23 + X)a + (23 + Y)b = 31,84 \\ (108 + X)a + (108 + Y)b = 57,34 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a + b = 0,3 \\ aX + bY = 24,94 \end{cases}$$

$$\text{Tìm } \bar{X} = \frac{24,94}{0,3} = 83,13$$

$$\text{Vì } X < \bar{X} < Y \Leftrightarrow X < 83,13 < Y$$

$$X = 80 < 80,13 \text{ nên X là brom và } Y = 127 > 83,13 \text{ nên Y là iot.}$$

Công thức của 2 muối là: NaBr và NaI.

$$\Rightarrow m_{NaBr} = 0,28 \times 103 = 28,84 \text{ gam}$$

$$m_{NaI} = 0,02 \times 150 = 3 \text{ gam}$$

b) (1) Gọi công thức phân tử muối của kim loại M hoá trị II và phi kim X hoá trị I là  $MX_2$ . Dựa vào phương trình phản ứng rút ra:

$$M_M = \frac{0,16M_X + 178}{2,87}$$

Vì X là phi kim hoá trị I và muối AgX là kết tủa trắng  $\Rightarrow$  X là nguyên tố halogen trừ F.

Nguyên tố halogen:	Cl	Br	I
$M_X$ :	35,5	80	127
$M_M$ :	64	66,5	69,1

Chọn  $M_X = 35,5 \Rightarrow$  X là Cl và  $M_M = 64 \Rightarrow$  M là Cu

Công thức phân tử muối là  $\text{CuCl}_2$

(2) Số mol của  $\frac{1}{2}$  lượng muối ban đầu là:

$$a = \frac{0,16}{64 - 56} = 0,02 \text{ mol}$$

(a là số mol  $\text{MgX}_2$  trong  $\frac{1}{2}$  lượng muối ban đầu)

Khối lượng muối  $\text{CuCl}_2$  ban đầu:

$$m = 2 \times (0,02 \times 135) = 5,4 \text{ gam.}$$

**237.** a) X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A có chứa 2 muối của X, Y với natri.

(1) Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A, phải dùng 150ml dung dịch  $\text{AgNO}_3$  0,2M. Tính lượng kết tủa thu được ?

(2) Xác định hai nguyên tố X, Y.

b) Hoà tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam kim loại M và 69,6 gam oxit  $\text{M}_x\text{O}_y$  của kim loại đó trong 2 lít dung dịch HCl, thu được dung dịch A và 4,48 lít khí  $\text{H}_2$  (đktc). Nếu cũng hoà tan hỗn hợp X đó trong 2 lít dung dịch  $\text{HNO}_3$  thì được dung dịch B và 6,72 lít khí NO (đktc). Xác định M,  $\text{M}_x\text{O}_y$  và nồng độ mol của các chất trong dung dịch, cho rằng thể tích không đổi trong quá trình phản ứng.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TP.HCM, năm 1999)

### GIẢI

a) (1) Viết các phương trình phản ứng và áp dụng định luật bảo toàn khối lượng rút ra:

$$m_{\text{kết tủa}} = 4,75 \text{ gam}$$

$$(2) \quad (108 + X)a + (108 + Y)b = 4,75$$

$$Xa + Yb = 1,51 \text{ cho } X > Y$$

$$Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb$$

$$X > \frac{1,51}{0,03} > Y$$

$$X > 50,3 > Y$$

X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom: 80 và Cl: 35,5.

b) Dựa vào phương trình phản ứng và số liệu đề bài cho rút ra:  $M = 28n$  và  $n = 2 \Rightarrow M$  là Fe


$M_xO_y$  là  $Fe_xO_y$

Phản ứng với  $HNO_3$



0,2 mol

0,2 mol



3 mol

$(3x-2y)$  mol

$$\frac{69,6}{56x + 16y}$$

$$\frac{6,72}{22,4} - 0,2 = 0,1 \text{ mol}$$

$$\frac{69,6}{56x + 16y} = \frac{0,3}{3x - 2y} \Rightarrow 64x = 48y \Leftrightarrow 4x = 3y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{4} \text{ vậy } Fe_xO_y \text{ là } Fe_3O_4$$

Viết lại phương trình phản ứng  $Fe_3O_4$  tác dụng với HCl và  $HNO_3$  để tính khối lượng các muối tạo thành:

$$C_M(Fe(NO_3)_3) = \frac{0,9 + 0,2}{2} = 0,55M.$$

238. Hoà tan một muối kim loại halogenua chưa biết hoá trị vào nước để được dung dịch X.

– Nếu lấy 250ml dung dịch X (chứa 27 gam muối) cho vào  $AgNO_3$  dư thì thu được 57,4g kết tủa.

– Mặt khác điện phân  $\frac{1}{2}$  dung dịch X trên thì có 6,4 gam kim loại bám ở catot.


Xác định công thức muối.

*GIẢI*

Đặt kí hiệu kim loại là B

Đặt kí hiệu halogen là X

Công thức của muối sẽ là  $BX_n$




27g

57,4g

13,5g

28,7g



Trong 13,5g  $\text{BX}_n$  có 7,1g X, vậy trong 28,7g  $\text{AgX}$  cũng chỉ có 7,1g X, suy ra số gam Ag là 21,6g hay 0,2 mol

Trong  $\text{AgX}$  tỉ lệ kết hợp theo số mol là 1 : 1. Vậy số mol X cũng là 0,2 mol.

$$M_X = \frac{7,1}{0,2} = 35,5. \text{ Suy ra X là Cl}$$



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & & n \text{ mol} \\ \frac{0,2}{n} \text{ mol} & & 0,2 \text{ mol} \end{array}$$

$$M_{\text{BCl}_n} = \frac{13,5}{\frac{0,2}{n}} = 67,5n$$

$$M_B + 35,5n = 67,5n ; \quad M_B = 32n$$

- Nếu  $n = 1$   $M_B = 32$  không có nguyên tố nào
- Nếu  $n = 2$   $M_B = 64 \Rightarrow \text{B là Cu.}$

**239.** Điện phân nóng chảy một muối clorua kim loại hoá trị 1 thu được ở catot 6,24 gam kim loại và ở anot 1,792 lít khí (đktc).

a) Xác định công thức phân tử muối.

b) Cho chất khí sinh ra tác dụng với  $\text{H}_2$  trong điều kiện ánh sáng được sản phẩm X. Hoà tan X vào nước để có dung dịch 1. Đốt cháy kim loại trên, cho sản phẩm sinh ra hoà tan vào nước để có dung dịch 2. Viết các phương trình phản ứng. Cho 1 mẫu quỳ tím vào dung dịch 1, kế đó thêm vào từ từ dung dịch 2. Quan sát hiện tượng và giải thích.

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Viết phương trình điện phân muối và dữ kiện đề bài cho tìm được công thức muối là KCl.


b) Học sinh tự giải thích.

**240.** Trong 500ml dung dịch A có chứa 0,4925 gam một hỗn hợp gồm muối clorua và hidroxit của một kim loại kiềm. Đo pH của dung dịch là 12 và khi điện phân 1/10 dung dịch A cho đến khi hết  $\text{Cl}_2$  thì thu được 11,2ml khí  $\text{Cl}_2$  ở  $273^\circ\text{C}$  và 1 atm.

a) Xác định công thức muối.

b) 1/10 dung dịch A tác dụng vừa đủ với 25ml dung dịch  $\text{CuCl}_2$ . Tính  $C_M$  của  $\text{CuCl}_2$ .

#### GIẢI



$$n_{\text{Cl}_2} = \frac{1 \times 0,0112}{0,082(273 + 273)} = 0,00025 \text{ mol}$$

$$n_{\text{XCl}} = 2 n_{\text{Cl}_2} = 0,0005$$

$n_{\text{XCl}}$  có trong A gấp 10 lần

Dung dịch A có  $\text{pH} = 12 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12}$   
 $[\text{OH}^-] = 10^{-2} = 0,01$

Nồng độ  $\text{OH}^-$  có trong 1 lít dung dịch là 0,01


Nồng độ  $\text{OH}^-$  có trong 0,5 lít dung dịch là 0,005

Nồng độ  $\text{XCl}$  có trong 0,5 lít dung dịch cũng là 0,005

$$(X + 17)0,005 + (X + 35,5)0,005 = 0,4925$$

$X = 23$  (Na). Công thức muối là  $\text{NaCl}$

b) Dung dịch chứa  $\text{NaOH}$ ,  $\text{NaCl}$ .



1/10 dd A :      0,0005 mol      0,00025 mol

25ml dung dịch chứa 0,00025 mol

1000ml dung dịch chứa 0,01 mol

$$C_{\text{M(CuCl}_2\text{)}} = 0,01\text{M}.$$


**241.** Có một dung dịch muối clorua kim loại. Cho một tấm sắt nặng 10 gam vào 100ml dung dịch trên, phản ứng xong khối lượng tấm kim loại là 10,1gam. Lại bỏ một tấm Cadimi (Cd) 10 gam vào 100ml dung dịch muối clorua kim loại trên, phản ứng xong, khối lượng tấm kim loại là 9,4 gam.

a) Xác định công thức phân tử muối clorua kim loại.

b) Nồng độ mol dung dịch muối clorua kim loại.

*GIẢI*

**NHẬN XÉT:** khi hai kim loại có cùng hoá trị, tác dụng với cùng một lượng muối, điều đó có nghĩa là số mol hai kim loại tác dụng là như nhau.



$$112x - \frac{2x}{n} M = 0,6g \quad (2)$$

Lấy phương trình (1) cộng phương trình (2) ta có:

$$x = 0,0125$$

Thay giá trị  $x = 0,0125$  vào phương trình (1), rút ra:

$$M = 32n$$

$$n = 1 \rightarrow M = 32 \text{ (loại)}$$

$$n = 2 \rightarrow M = 64 \text{ (nhận)}$$

$$n = 3 \rightarrow M = 96 \text{ (loại)}$$

Vậy muối có công thức phân tử  $\text{CuCl}_2$

$$n_{\text{CuCl}_2} = \frac{2x}{n} = 0,0125$$

$$[\text{CuCl}_2] = \frac{0,0125 \times 1000}{100} = 0,125M.$$

**242.** Hoà tan 5,37 gam hỗn hợp gồm 0,02 mol  $\text{AlCl}_3$  và một muối halogenua của kim loại M hoá trị 2 vào nước, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch  $\text{AgNO}_3$ , thu được 14,35 gam kết tủa. Lọc lấy dung dịch cho tác dụng với  $\text{NaOH}$  dư, thu được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn.

Xác định công thức phân tử muối halogenua kim loại M.

*GIẢI*

– Thí nghiệm 1:

Viết các phương trình phản ứng  $\text{AlCl}_3$  và  $\text{MX}_2$  tác dụng với dung dịch  $\text{AgNO}_3$  và tính được:

$$m_{\text{MX}_2} = 5,37 - (0,02 \times 133,5) = 2,7 \text{ gam}$$

$$m_{\text{AgX}} = 14,35 - (0,06 \times 143,5) = 5,74 \text{ gam}$$

$$\frac{2,7}{M + 2X} = \frac{5,74}{2(108 + X)} \quad (1)$$

– Thí nghiệm 2:

Dung dịch chứa 2 muối  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$  và  $\text{M}(\text{NO}_3)_2$  tác dụng với dung dịch  $\text{NaOH}$  dư



$$m_{\text{MO}} = 1,6 \text{ gam}$$

$$n_{\text{MX}_2} = n_{\text{MO}}$$

$$\frac{2,7}{M + 2X} = \frac{1,6}{M + 16} \quad (2)$$

Lập hệ phương trình (1) và (2)

$$\begin{cases} \frac{2,7}{M + 2X} = \frac{5,74}{2(108 + X)} \\ \frac{2,7}{M + 2X} = \frac{1,6}{M + 16} \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta có:

$$\begin{cases} M = 64 \\ X = 35,5 \end{cases}$$

Công thức phân tử của muối là  $\text{CuCl}_2$ .

#### CHỦ ĐỀ 4

#### Xác định khối lượng và nồng độ các hợp chất của halogen

**LƯU Ý:**

– Halogen đứng trước dãy halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.



– Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải một cách nhanh chóng và đơn giản một số bài toán phức tạp.

– Có thể áp dụng phương pháp tăng hay giảm khối lượng muối khi chuyển từ muối này sang muối khác.

**243.** Một hỗn hợp ba muối  $\text{NaF}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaBr}$  nặng 4,82 gam hoà tan hoàn toàn trong nước được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,93 gam muối khan. Lấy một nửa lượng muối khan này hoà tan vào nước rồi cho phản ứng với dung dịch  $\text{AgNO}_3$  dư thì thu được 4,305 gam kết tủa. Viết các phương trình xảy ra và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

*(Trích đề thi tuyển sinh (đợt 1) Đại học Quốc gia TP HCM, năm 2000)*

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

Khi sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch chứa hỗn hợp ở muối  $\text{NaF}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaBr}$  chỉ có  $\text{NaBr}$  tác dụng. Đặt số mol hỗn hợp ban đầu:

$\text{NaF}$ : a mol;  $\text{NaCl}$ : b mol;  $\text{NaBr}$ : c mol

Viết các phương trình phản ứng và lập hệ phương trình.

$$\begin{cases} 42a + 58,5b + 103c = 4,82 \\ 42a + 58,5b + 58,5c = 3,93 \\ \frac{b+c}{2} = \frac{4,305}{143,5} = 0,03 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta có:

$$a = 0,01 \rightarrow \%m_{NaF} = \frac{0,01 \times 42}{4,82} = 0,087 \text{ hay } 8,7\%$$

$$b = 0,04 \rightarrow \%m_{NaCl} = \frac{0,04 \times 58,5}{4,82} = 0,485 \text{ hay } 48,5\%$$

$$c = 0,02 \rightarrow \%m_{NaBr} = \frac{0,02 \times 103}{4,82} = 0,427 \text{ hay } 42,7\%.$$

**244.** Hỗn hợp A gồm 3 muối NaCl, NaBr và NaI:

- 5,76 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch brom, cô cạn thu được 5,29 gam muối khan.

- Hoà tan 5,76 gam A vào nước rồi cho một lượng khí clo sục qua dung dịch. Sau một thời gian, cô cạn thì thu được 3,955 gam muối khan, trong đó có 0,05 mol ion clorua.


a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong A.

*GIẢI*

Đặt số mol NaCl: a; NaBr: b; NaI: c

a) Các phản ứng với brom dư:



$$58,5a + 103b + 150c = 5,76$$

$$58,5a + 103(b + c) = 5,29$$

---


$$47c = 0,47$$

\* Các phản ứng với  $\text{Cl}_2$ :



$$\begin{array}{ccc} 0,01\text{mol} & & 0,01\text{mol} \end{array}$$



Nếu  $\text{Cl}_2$  chỉ phản ứng với  $\text{NaI}$  thì khối lượng hỗn hợp muối sau phản ứng với  $\text{Cl}_2$  là:  $5,76 - 1,5 + 0,585 = 4,845\text{g}$

Theo đề bài hỗn hợp sau phản ứng chỉ có  $3,955\text{g}$ . Vậy  $\text{Cl}_2$  đã phản ứng với cả  $\text{NaBr}$ .

Hỗn hợp  $3,955\text{g}$  trong đó có  $0,05\text{ mol NaCl}$  và còn lại là  $\text{NaBr}$ .

$$\text{Số mol NaBr còn lại} = \frac{3,955 - 0,05 \times 58,5}{103} = 0,01$$

Tính số mol  $\text{NaBr}$  tham gia phản ứng:

1 mol  $\text{NaBr}$  thay thế bằng 1 mol  $\text{NaCl}$  khối lượng giảm  $44,5\text{g}$

x mol  $\text{NaBr}$  thay thế bằng x mol  $\text{NaCl}$  khối lượng giảm  $4,845 - 3,955 = 0,89\text{g}$

$$x = \frac{0,89}{44,5} = 0,02$$

Số mol  $\text{NaBr}$  có trong  $5,76\text{g}$  bằng  $0,02 + 0,01 = 0,03$

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{5,76 - 3,09 - 1,5}{58,5} = \frac{1,17}{58,5} = 0,02$$

% theo khối lượng:

$$\text{NaCl: } 20,3\%; \text{ NaBr: } 53,66\%; \text{ NaI: } 26,04\%.$$

**245. a)** Có hỗn hợp  $\text{NaI}$  và  $\text{NaBr}$ . Hoà tan hỗn hợp trong nước. Cho brom dư vào dung dịch. Sau khi phản ứng thực hiện xong, làm bay hơi dung dịch, làm khô sản phẩm thì thấy khối lượng sản phẩm nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu là m gam.

Hoà tan sản phẩm trong nước và cho clo lội qua cho đến dư. Làm bay hơi dung dịch và làm khô chất còn lại, người ta thấy khối lượng chất thu được nhỏ hơn khối lượng muối phản ứng là m gam.

Xác định % về khối lượng của  $\text{NaBr}$  trong hỗn hợp đầu.

**b)** Có hỗn hợp gồm hai muối  $\text{NaCl}$  và  $\text{NaBr}$ . Khi cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  vừa đủ vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng  $\text{AgNO}_3$  tham gia phản ứng. Tìm % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.


#### HƯỚNG DẪN GIẢI


**a)** Gọi số mol  $\text{NaI}$ ,  $\text{NaBr}$  là a mol, b mol.

Viết phương trình phản ứng và dựa vào khối lượng muối thay đổi rút ra:

$$\frac{a}{b} = 17,8; b = 1 \rightarrow a = 17,8$$

$$\% \text{NaBr} = 3,7\%; \% \text{NaI} = 96,3\%.$$





$$170a - 143,5a = 188b - 170b$$

$$26,5a = 18b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{18}{26,5}$$

$$\frac{m_{\text{NaCl}}}{m_{\text{NaBr}}} = \frac{18 \times 58,5}{26,5 \times 103} = \frac{1053}{2729,5}$$

$$\% \text{NaCl} = \frac{1053}{3782,5} \times 100\% = 27,84\%$$

$$\% \text{NaBr} = 100 - 27,84 = 72,16\%.$$

**246.** Phân tích một dung dịch hỗn hợp các muối, đã tìm thấy các ion  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$ . Sau khi làm khô 20ml dung dịch này thu được 1,732 gam chất rắn. Lấy 20ml dung dịch muối trên lắc với brom rồi làm bay hơi thu được 1,685 gam chất rắn khô. Sau đó cho clo tác dụng với 20ml dung dịch trên, sau khi bay hơi thu được 1,4625 gam kết tủa khô.

a) Tính nồng độ ion gam/lít của từng ion trong dung dịch.

b) Tính khối lượng brom và iot có thể điều chế được từ  $1\text{m}^3$  dung dịch.

*GIẢI*

a) Gọi  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$ ,  $n_4$ : số mol ion  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$ ,  $\text{Na}^+$  có trong 20ml dung dịch.

– Theo đề bài ta lập được hệ phương trình:

$$\begin{cases} n_1 + n_2 + n_3 = n_4 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_1 \cdot 35,5 + 80n_2 + 127n_3 + 23n_4 = 1,732 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_1 \cdot 35,5 + 80n_2 + 80n_3 + 23n_4 = 1,685 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_1 \cdot 35,5 + 35,5n_2 + 35,5n_3 + 23n_4 = 1,4625 & (4) \end{cases}$$

– Giải ra:  $n_1 = 0,02$ ,  $n_2 = 0,004$ ;  $n_3 = 0,001$ ;  $n_4 = 0,025$

– Nồng độ:

$$[\text{Na}^+] = \frac{0,025 \times 1000}{20} = 1,25 \text{ ion gam Na}^+/\text{lít}$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{0,02 \times 1000}{20} = 1 \text{ ion gam Cl}^-/\text{lít}$$

$$[\text{Br}^-] = \frac{0,004 \times 1000}{20} = 0,2 \text{ ion gam Br}^-/\text{lít}$$

$$[\text{I}^-] = \frac{0,001 \times 1000}{20} = 0,05 \text{ ion gam I}^-/\text{lít}$$

b) Khối lượng brom, iot có thể điều chế từ  $1\text{m}^3$  hỗn hợp dung dịch các muối:


$$m_{Br_2} = 80 \times 0,2 = 16\text{kg}$$

$$m_{I_2} = 127 \times 0,05 = 6,35\text{kg}.$$

**247.** Đem điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M ( $D = 1,1\text{g/ml}$ ) với điện cực bằng than có màng ngăn xốp và dung dịch luôn luôn được khuấy đều. Khi ở catot thoát ra 22,4 lít khí đo ở điều kiện  $20^\circ\text{C}$ , 1atm thì ngưng điện phân. Hợp chất chứa trong dung dịch sau khi kết thúc điện phân là chất gì? Xác định C% của nó.

*GIẢI*

$$m_{NaCl} \text{ có trong dung dịch} = 0,2 \times 2 \times 58,5 = 23,4 \text{ gam}$$



$$n_{H_2} \text{ ở catot} = \frac{pV}{RT} = \frac{1 \times 22,4}{0,082(273 + 20)} = 0,93 \text{ mol}$$

$$n_{H_2} \text{ còn lại do } H_2O \text{ bị điện phân: } 0,93 - 0,2 = 0,73$$

$$m_{H_2O} + m_{H_2} + m_{Cl_2} = (0,73 \times 18) + (0,2 \times 2) + (0,2 \times 71) = 27,74 \text{ gam}$$

$$m_{\text{dd}} \text{ sau phản ứng: } 220 - 27,74 = 192,26\text{g}$$

$$C\% \text{ NaOH} = \frac{0,4 \times 40}{192,26} \times 100\% = 8,32\%.$$

**248.** Hai bình cầu chứa amoniac và hidroclorua khô. Cho từ từ nước vào đầy mỗi bình khí, thì thấy khí chứa trong hai bình tan hết. Sau đó trộn dung dịch trong hai bình đó lại với nhau. Hãy xác định nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau khi trộn lẫn, biết rằng bình chứa hidroclorua có thể tích gấp 3 lần thể tích bình chứa amoniac, các khí đo ở đktc.


*GIẢI*

Đặt thể tích của amoniac là  $V$

Bình cầu chứa hidroclorua là  $3V$

$$\sum V_{\text{sau khi trộn}} = 4V$$

Phương trình phản ứng:



Sau phản ứng lượng HCl còn dư  $\frac{2V}{22,4}$  mol

$$[\text{HCl}] = \frac{2V}{22,4} : 4V = 0,0223 \text{ mol/l}$$

$$[\text{NH}_4\text{Cl}] = \frac{V}{22,4} : 4V = 0,01116 \text{ mol/l}.$$

**CHỦ ĐỀ 5:****Tính pH và nồng độ dung dịch axit clohidric****LƯU Ý:****1. Nồng độ mol/l của  $H^+$** 

– Nước nguyên chất, môi trường trung tính

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \text{ mol/l}$$

$$[H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]}$$

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/l}$$

– Dung dịch axit:  $[H^+] > 10^{-7} \text{ mol/l} \rightarrow pH < 7$ – Dung dịch bazơ:  $[OH^-] > 10^{-7} \text{ mol/l} \rightarrow pH > 7$ **2. Khái niệm về pH, pOH**

$$pH = -\lg[H^+]$$

$$pH = a \rightarrow [H^+] = 10^{-a} \text{ mol/l}$$

$$pOH = -\lg[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

Tính pH : Tính  $[H^+]$  hay  $[OH^-]$  trong 1 lit dung dịch.**BÀI TẬP**

**249.** a) Cho dung dịch HCl có pH = 4. Hỏi phải thêm một thể tích nước gấp bao nhiêu lần thể tích dung dịch ban đầu để được một dung dịch có pH = 5.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TPHCM, năm 2000)

b) (1) Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05 mol/l với 200ml dung dịch  $Ba(OH)_2$  a mol/l thu được 500ml dung dịch có pH = 12. Tính a.

(2) Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và  $H_2SO_4$  0,01 mol/l với 250ml dung dịch  $Ba(OH)_2$  a mol/l thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12. Tìm m và a.


(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2000)

**GIẢI**


a) Pha loãng pH = 4 đến pH = 5.

$$pH = -\lg[H^+] = 4 \Rightarrow [H^+] = 10^{-4}; \quad pH = 5 \Rightarrow [H^+] = 10^{-5}$$

Dung dịch trước khi pha:



Dung dịch sau khi pha:



Nồng độ dung dịch giảm sau khi pha loãng:  $\frac{10^{-4}}{10^{-5}} = 10$  lần.

Nồng độ của dung dịch sau khi pha loãng giảm 10 lần so với trước khi pha, tức là phải pha loãng dung dịch đầu thành 10 lần.

Thể tích nước phải thêm vào bằng 9 lần thể tích dung dịch trước khi pha.

$$\text{b) (1)} \quad n_{\text{H}^+} = n_{\text{HCl}} = 0,3 \times 0,05 = 0,015 \text{ mol}$$




$$\text{pH} = 12 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12}$$

$$n_{\text{OH}^-} = \frac{0,5 \times 10^{-14}}{10^{-12}} = 0,005 \text{ mol}$$

Suy ra tổng số mol  $\text{OH}^-$  ban đầu =  $0,015 + 0,005 = 0,02$

$$[\text{Ba}(\text{OH})_2] = a = \frac{0,02}{0,2} = 0,1 \text{ mol/l}$$

$$(2) \quad \sum n_{\text{H}^+} = n_{\text{HCl}} + 2n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,02 + 0,005 = 0,025 \text{ mol}$$



$$n_{\text{OH}^- \text{ đã phản ứng}} = n_{\text{H}^+} = 0,025$$

Sau phản ứng dung dịch có  $\text{pH} = 12 \rightarrow n_{\text{OH}^- \text{ sau phản ứng}}$

$$\text{pH} = 12 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12}$$

Mà ta đã biết:  $[\text{OH}^-][\text{H}^+] = 10^{-14}$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2} = 0,01$$

$$n_{\text{OH}^- \text{ dư}} = 0,01 \times 0,5 = 0,005 \text{ mol}$$

$$\sum n_{\text{OH}^-} = 0,025 + 0,005 = 0,03 \text{ mol}$$

$$n_{\text{Ba}(\text{OH})_2} = \frac{0,03}{2} = 0,015$$

$$a = [\text{Ba}(\text{OH})_2] = \frac{0,015}{0,25} = 0,06 \text{ mol/l}$$

$$n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,0025$$

$$\text{nên } m_{\text{BaSO}_4} = 0,0025 \times 233 = 0,5825 \text{g.}$$

250. a) Dung dịch A chứa axit HCl a mol/l và HNO<sub>3</sub> b mol/l. Để trung hoà 20ml dung dịch A cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác lấy 20ml dung dịch A cho tác dụng với AgNO<sub>3</sub> dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. Tìm các giá trị của a, b.

b) Có V<sub>1</sub> lít dung dịch HCl chứa 9,125g HCl (dung dịch A) và V<sub>2</sub> lít dung dịch HCl chứa 5,475 HCl (dung dịch B). Trộn dung dịch A với dung dịch B để được 2 lít dung dịch C (HCl). Khi pha trộn thể tích dung dịch không đổi.

(1) Tính nồng độ mol/l của dung dịch C.

(2) Suy ra nồng độ mol/l của dung dịch B. Biết rằng nồng độ của 2 dung dịch A và dung dịch B có hiệu số là 0,4 mol/l.

*GIẢI*

a) Trong 20ml dung dịch A có:  $n_{\text{HCl}} = 0,02a \text{ mol}$

$$n_{\text{HNO}_3} = 0,02b \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH cần dùng}} = 0,3 \times 0,1 = 0,03$$

$$\sum n_{\text{H}^+} = 0,02(a+b)$$



$$0,02(a+b) \quad 0,02(a+b)$$

$$0,02(a+b) = 0,03 \rightarrow a + b = 1,5 \quad (1)$$



$$0,02a \quad \frac{2,87}{143,5} = 0,02$$

$$0,02a = 0,02 \rightarrow a = 1$$

Từ phương trình (1)  $\rightarrow b = 0,5$

$$\text{b) Số mol HCl trong } V_1 \text{ lít dung dịch A: } \frac{9,125}{36,5} = 0,25$$

$$\text{Số mol HCl trong } V_2 \text{ lít dung dịch B: } \frac{5,475}{36,5} = 0,15$$

$$(1) \text{ Nồng độ mol của dung dịch C: } \frac{0,25 + 0,15}{2} = 0,2 \text{ mol/l}$$

(2) Nồng độ mol của 2 dung dịch A và B

$$\frac{0,25}{V_1} - \frac{0,15}{V_2} = 0,4$$

$$\begin{cases} 0,25V_2 - 0,15V_1 = 0,4V_1V_2 \\ V_1 + V_2 = 2 \end{cases}$$

Học sinh tự giải tiếp.

**251.** a) Để trung hoà 10ml dung dịch chứa hai axit HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> cần 40ml dung dịch NaOH 0,5M. Mặt khác nếu lấy 1000ml dung dịch axit đem trung hoà bằng một lượng vừa đủ rồi cô cạn thu được 132g muối khan.

Tính nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch.

b) Hoà tan 3,87g hỗn hợp gồm kim loại M có hoá trị 3 và kim loại M' có hoá trị 2 vào 250ml dung dịch chứa HCl 1M và H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,5M thì thu được dung dịch B và 4,368 lít khí ở đktc.

(1) Chứng minh rằng trong dung dịch B vẫn còn axit.


(2) Tính khối lượng muối khan trong B.

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Tính  $\sum n_{H^+}$  của 2 axit trong 10ml, trong 1000ml. Viết phương trình hoá học của 2 axit tác dụng với NaOH. Lập hệ phương trình và giải ta tìm được số mol mỗi axit.

b) (1) Phương trình phản ứng:

Giả sử A là kí hiệu chung cho hai kim loại



$$n_{H_2} = 0,195 \text{ mol} \Rightarrow n_{H^+ \text{ phản ứng}} = 0,39 \text{ mol}$$

$$\text{Mà } n_{H^+ \text{ (trong 250ml dung dịch)}} = 2n_{H_2SO_4} + n_{HCl}$$

$$= 0,25 + 0,25 = 0,5 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{H^+ \text{ phản ứng}} < n_{H^+ \text{ ban đầu}}$$

$$\Rightarrow n_{H^+ \text{ dư}} = 0,5 - 0,39 = 0,11 \text{ mol}$$

(2) Khối lượng muối khan trong B

$$m_{\text{muối}} = m_{\text{hỗn hợp kim loại}} + m_{SO_4^{2-}} + m_{Cl^-}$$

\* Trường hợp 1: Giả sử 2 axit tham gia phản ứng với tốc độ khác nhau

Giả sử HCl phản ứng trước:

$$m_{\text{muối}} = 3,87 + 0,25 \times 35,5 + 96 \times \frac{0,39 - 0,25}{2}$$

$$= 19,5\text{g}$$

Giả sử H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> phản ứng trước:

$$m_{\text{muối}} = 3,87 + (96 \times 0,125) + 35,5(0,39 - 0,25) = 20,84\text{g}$$

Từ kết quả trên ta có:  $19,5 \leq m_{\text{muối}} \leq 20,84$

\* Trường hợp 2:

Tốc độ phản ứng 2 axit như nhau:

$$m_{\text{muối}} = 3,87 + \left( \frac{0,39}{2} \times 35,5 \right) + \left( \frac{0,39}{4} \times 96 \right) = 20,2\text{g}.$$

252. a) Có một dung dịch chứa đồng thời HClO 0,01M và NaClO 0,001M. Tính pH của dung dịch, biết  $K_{\text{HClO}} = 3,4 \cdot 10^{-8}$ .

b) Tính lượng NaF có trong 100ml dung dịch HF 0,1M. Biết rằng dung dịch có pH = 3.  $K_A$  của dung dịch axit HF =  $3,17 \cdot 10^{-4}$ .

c) Cho 300ml dung dịch có pH = 12,6 vào 200ml dung dịch có pH = 1,3. Tìm pH của dung dịch thu được. (cho  $\lg 2 = 0,3$ )


(Thi học sinh giỏi cấp thành phố (TPHCM), năm 1995)

GIẢI

a) Trong dung dịch  $\text{NaClO} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{ClO}^-$  (1)



Phản ứng (2) xảy ra không đáng kể nên chỉ xét phản ứng (3):




$$\frac{x(10^{-3} + x)}{10^{-2} - x} = K = 3,4 \cdot 10^{-8}$$

$$\Rightarrow x = 8,68 \cdot 10^{-4} \text{ nên pH} = 3,06.$$

b) Vì pH = 3 nên môi trường là axit và  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3}\text{M}$ .

Gọi x là nồng độ của muối NaF.



Định luật tác dụng khối lượng cho ta:

$$K_A = 3,17 \times 10^{-4} = \frac{(x + 10^{-3}) \times 10^{-3}}{0,1 - 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow x = 3,04 \times 10^{-2} \text{ (M)}$$

$$\Rightarrow x = [\text{F}^-] = [\text{NaF}] \text{ ban đầu}$$



Trong 100ml dung dịch có  $3,04 \cdot 10^{-3}$  mol NaF, nghĩa là số gam NaF trong 100ml dung dịch ban đầu là:

$$42 \times 3,04 \times 10^{-3} = 0,128 \text{ gam NaF.}$$

$$\text{c) } \text{pH} = 12,6 = 12 + (2 \times 0,3) = -\lg 10^{-12} - 2\lg \frac{1}{2}$$

$$= -\lg \frac{10^{-12}}{4} = -\lg [\text{H}^+].$$

$$[\text{H}^+] = \frac{10^{-12}}{4} \rightarrow [\text{OH}^-] = 4 \cdot 10^{-2}$$

$$n_{\text{OH}^-} = \frac{300 \times 4 \times 10^{-2}}{1000} = 0,012 \text{ mol}$$

$$\text{pH} = 1,3 = 1 + 0,3 = -\lg 10^{-1} - \lg \frac{1}{20} = -\lg \frac{1}{20} = -\lg [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = \frac{1}{20} \rightarrow n_{\text{H}^+} = \frac{200 \times \frac{1}{20}}{1000} = 0,01 \text{ mol}$$

Phản ứng trung hoà:  $\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$

Dung dịch sau phản ứng có thể tích:  $200 + 300 = 500\text{ml}$

$$n_{\text{OH}^-} \text{ còn trong } 500\text{ml} = 0,012 - 0,01 = 0,002.$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,002}{500} \times 1000 = 0,004$$

$$\rightarrow [\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{0,004} = \frac{10^{-11}}{4}$$

$$\text{pH} = -\lg \frac{10^{-11}}{4} = 11 + \lg 4 = 11,6.$$

253. a) Cho 100ml dung dịch axit HCl 0,1M tác dụng với 100ml dung dịch NaOH thu được dung dịch có pH = 12. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH.

b) Dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  có pH = 13 (dung dịch A), dung dịch HCl có pH = 1 (dung dịch B). Đem trộn 2,75 lít dung dịch A với 2,25 lít dung dịch B. Hãy tìm nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch tạo thành và tính pH của dung dịch này.

GIẢI

$$\text{a) } n_{\text{HCl}}: 0,1 \times 0,1 = 0,01$$


$$\text{pH} = 12 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12}$$

$$[\text{OH}^-][\text{H}^+] = 10^{-14} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2} = 0,01 \text{ mol/l}$$

$n_{\text{NaOH}}$  có trong 200ml dung dịch sau phản ứng.

$$0,01 \times 0,2 = 0,002 \text{ mol}$$

Phản ứng trung hoà:




Tổng số mol NaOH có trong 100ml dung dịch đầu:

$$0,01 + 0,002 = 0,012$$

$$C_{\text{M(NaOH)}} = \frac{0,012}{0,1} = 0,12\text{M}.$$

b) Dung dịch A:  $\text{pH} = 13 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-13} \text{ mol/l}$  và  $[\text{OH}^-] = 10^{-1} \text{ mol/l}$ .


Dung dịch B:  $\text{pH} = 1 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1} \text{ mol/l}$



• Số mol  $\text{Ba(OH)}_2 = 2,75 \times 0,05 = 0,1375 \text{ mol}$


Số mol  $\text{Ba}^{2+} = 0,1375 \text{ mol}$

Số mol  $\text{OH}^- = 0,2750 \text{ mol}$



• Số mol  $\text{HCl} = 2,25 \times 0,1 = 0,225 \text{ mol}$

Số mol  $\text{H}^+ = \text{số mol } \text{Cl}^- = 0,225 \text{ mol}$



Trong dung dịch sau phản ứng có:

$[\text{Ba}^{2+}] = 0,1375 \text{ mol}$

$[\text{Cl}^-] = 0,2250 \text{ mol}$

$[\text{OH}^-] = 0,05 \text{ mol}$

$\rightarrow \text{Số mol } \text{BaCl}_2 = 0,1125 \text{ mol}$

$\rightarrow \text{Số mol } \text{Ba(OH)}_2 = 0,025 \text{ mol}$

Thể tích dung dịch =  $2,75 + 2,25 = 5 \text{ lít}$

Vậy:  $[\text{BaCl}_2] = \frac{0,1125}{5} = 0,0225\text{M}$

$[\text{Ba(OH)}_2] = \frac{0,025}{5} = 0,005\text{M}.$

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,05}{5} = 0,01\text{M}$$

$$\text{Vì } [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14} \rightarrow [\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12} \rightarrow \text{pH} = 12.$$

**254. a)** Cho m gam dung dịch HCl nồng độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp kim loại kali và magiê (dùng dư), thấy khối lượng khí hiđro bay ra là 0,05m gam.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Tính nồng độ C%.

**b)** Trộn dung dịch axit mạnh có pH = 3 và dung dịch bazơ mạnh có pH = 10 theo tỉ lệ thể tích nào để được dung dịch có pH = 4?

#### HƯỚNG DẪN GIẢI

**a) –** Viết các phương trình phản ứng K và Mg tác dụng với dung dịch HCl và K tác dụng với nước tính:

$$\text{Số mol HCl} = \frac{mC}{100 \times 36,5}; \text{ Số mol H}_2\text{O} = \frac{(100 - C)m}{100 \times 18}$$

Số mol H<sub>2</sub> do axit và do H<sub>2</sub>O:

$$\frac{mC}{2 \times 100 \times 36,5} + \frac{(100 - C)m}{2 \times 100 \times 18} = \frac{0,05m}{2}$$

Suy ra C% = 19,73%.

**b)** Gọi x là thể tích dung dịch axit có pH = 3  $\Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-3}$

Gọi y là thể tích dung dịch bazơ có pH = 10  $\Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-4}$

pH = 4  $\Rightarrow [\text{H}^+]_{\text{đt}} = 10^{-4}$ ;  $n_{\text{H}^+_{\text{bd}}} = x \times 10^{-3}$ ;  $n_{\text{OH}^-_{\text{bd}}} = y \times 10^{-4}$



$$n_{\text{H}^+_{\text{đt}}} = x \times 10^{-3} - y \times 10^{-4} = 10^{-4}(10x - y) = 10^{-4}(x + y)$$

$$9x = 2y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{9}$$

**255.** Dung dịch A là dung dịch HCl. Dung dịch B là dung dịch NaOH.

**a)** Lấy 10ml dung dịch A pha loãng bằng nước thành 1000ml thì thu được dung dịch HCl có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch A?

Để trung hoà 100 gam dung dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính nồng độ % của dung dịch B.

**b)** Hoà tan hết 9,96 gam hỗn hợp Al, Fe bằng 1,175 lít dung dịch A, ta thu được dung dịch A<sub>1</sub>.

Thêm 800 gam dung dịch B vào dung dịch A<sub>1</sub>, lọc lấy kết tủa, rửa sạch và nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 13,65 gam chất rắn. Tính khối lượng của Al, Fe trong hỗn hợp đầu.

(Trích đề thi tuyển sinh Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM, năm 1995)

#### GIẢI

a) Dung dịch có pH = 2 tức  $[H^+] = 10^{-2} \text{ mol/l} = C_{HCl}$ . Vì từ 10ml pha loãng thành 1000ml tức 100 lần. Do đó nồng độ dung dịch HCl ban đầu là 1 mol/l. Theo phản ứng:

$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$  thì nồng độ x% của NaOH bằng:

$$\frac{100 \times x}{100 \times 40} = 0,15 \times 1 \rightarrow x = 6\%.$$

b) Các phản ứng: (Học sinh tự viết các phương trình phản ứng)

Số mol HCl =  $1 \times 1,175 = 1,175 \text{ mol}$

Số mol NaOH =  $\frac{800 \times 6}{100 \times 40} = 1,2 \text{ mol}.$

Qua các phương trình phản ứng thì tổng số mol NaOH tác dụng với HCl, FeCl<sub>2</sub>, AlCl<sub>3</sub> bằng tổng số mol HCl, như vậy lượng NaOH dư là:  $1,2 - 1,175 = 0,025$ .

Gọi x, y là số mol Al, Fe đem hoà tan. Có 2 trường hợp xảy ra:

1) Nếu  $x < 0,025$  tức số mol NaOH dư lớn hơn số mol Al(OH)<sub>3</sub>, nói cách khác Al(OH)<sub>3</sub> tan hết và chất rắn sau khi nung chỉ có Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ta có:

$$\frac{y}{2} \times 160 = 13,65$$

Giải ra có  $y = 0,1706 \rightarrow$  khối lượng Fe =  $0,1706 \times 56 = 9,555\text{g}$

Khối lượng Al =  $9,96 - 9,555 = 0,405 \text{ gam}$

2) Nếu  $x > 0,025$ , tức lượng Al(OH)<sub>3</sub> bị tan bằng lượng NaOH dư = 0,025 mol. Chất rắn sau khi nung có cả Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ta có hệ phương trình:

$$27x + 56y = 9,96$$

$$\frac{(x - 0,025)}{2} \times 102 + \frac{y}{2} \times 160 = 13,65$$

Giải ra có:  $x = 0,05604$  và  $y = 0,15084$

Khối lượng Al =  $0,05604 \times 27 = 1,513\text{g}$

và khối lượng Fe =  $9,96 - 1,513 = 8,447\text{g}.$

256. Điện phân 100ml dung dịch chứa Cu<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, H<sup>+</sup>, ClO<sub>4</sub><sup>-</sup> ở pH = 1, dùng điện cực platin. Sau khi điện phân một thời gian, thấy khối lượng catot tăng 0,64 gam và dung dịch có màu xanh rất nhạt.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi điện phân.


b) Tính nồng độ ion  $H^+$  trong dung dịch sau khi điện phân (biết rằng ion  $ClO_4^-$  không bị khử ở điện cực, và thể tích của dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân).

**GIẢI**

a)  $pH = 1 \rightarrow [H^+] = 0,1 \text{ mol/l}$

Số mol ion  $H^+$  trong 100ml = 0,01 mol

Sau thời gian điện phân dung dịch có màu xanh lam rất nhạt (ion  $Cu^{2+}$  còn lại rất ít!) nên chỉ có quá trình:



b)  $n_{H^+} = 0,1 + 0,02 = 0,12 \text{ mol}$

$$[H^+] = \frac{0,12}{0,1} = 1,2M.$$

**257.** Điện phân có vách ngăn xốp 500ml dung dịch hỗn hợp HCl và 7,8 gam muối clorua của kim loại M, thấy ở anot có khí  $Cl_2$  bay ra liên tục, ở catot lúc đầu có khí  $H_2$  bay ra, sau đến kim loại M thoát ra.

Sau điện phân thu được 2,464 lít khí clo và m gam M, đem trộn m gam M với 1,3 gam kim loại N khác, rồi cho tác dụng với dung dịch  $H_2SO_4$  dư thì thể tích khí  $H_2$  bay ra nhiều gấp 4 lần so với khi chỉ có 1,3 gam N tác dụng.



Biết khi trộn 1,3 gam N với lưu huỳnh rồi nung nóng thu được chất rắn C và khi cho C phản ứng hết với dung dịch  $H_2SO_4$  dư thì được hỗn hợp khí D nặng 0,52 gam và có tỉ khối so với hidro là 13.

a) Xác định tên M, N và khối lượng m.


b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã điện phân. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích dung dịch điện phân xem như không đổi.

**GIẢI**

Viết phương trình điện phân dung dịch HCl và  $MCl_n$ , tính số mol Cl và  $H_2$  bằng 0,22.



$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{ny}{2} + \frac{1,3n'}{2N} &= 4 \times \frac{1,3n'}{2N} \\ \Rightarrow \frac{ny}{2} &= \frac{3,9n'}{2N} \Rightarrow ny = \frac{3,9n'}{N} \end{aligned} \quad (3)$$



$$\Rightarrow m_D = 34 \times n'a + n'b = 0,52g$$

$$\bar{M}_D = \frac{0,52}{n'a + \frac{n'b}{2}} = 13 \times 2 = 26$$

$$\Rightarrow n' \left( a + \frac{b}{2} \right) = 0,02$$

$$\text{mà } (2a + b)N = 1,3$$

$$\Rightarrow N = 32,5n'; \Rightarrow n' = 2; N = 65 (\text{Zn})$$

$$(3) \Rightarrow ny = 3,9 \times \frac{2}{65} = 0,12$$

$$\Rightarrow x = 0,22 - 0,12 = 0,1 \text{ mol (x: số mol HCl)}$$

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

$$7,8 = m + 71 \times \frac{0,12}{2} \Rightarrow m = 3,54$$

$$y = \frac{3,54}{M} \Rightarrow M = \frac{3,54}{y} = \frac{3,54n}{0,12} = 29,5n$$

$$\Rightarrow M = 59 (\text{Ni}); x = 0,1 \text{ mol}$$

$$\text{Nồng độ mol/l của dung dịch HCl: } [\text{HCl}] = \frac{0,1}{0,5} = 0,2M.$$

**258. a)** Độ pH là gì? Dung dịch HCl có pH = 3. Tính nồng độ ion  $[H^+]$ ,  $[OH^-]$ ,  $[Cl^-]$  theo mol/l.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Thương mại, năm 1999)

b) (1) Tính pH của dung dịch A là hỗn hợp gồm HF 0,1M và NaF 0,1M.

(2) Tính pH của 1 lít dung dịch A ở trên trong 2 trường hợp sau:

– Thêm 0,01 mol HCl vào.

– Thêm 0,01 mol NaOH vào.

Biết hằng số axit (hằng số ion hoá) của HF là  $K_a = 6,8 \cdot 10^{-4}$ . Cho  $\lg 6,8 = 0,83$ .

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1999)

### GIẢI

a) Độ pH là đại lượng biểu thị nồng độ ion  $H^+$  (đúng hơn là  $H_3O^+$ ) trong dung dịch với quy ước:

$$pH = -\lg[H^+]$$

Dung dịch có  $pH = -\lg[H^+]$

Dung dịch có  $pH = 3$ , nghĩa là:

$$[H^+] = 10^{-3}; [OH^-] = 10^{-11}; [Cl^-] = 10^{-3} \text{ mol/l}$$

b) (1) Trong dung dịch axit HF điện li:



Trong dung dịch HF có  $F^-$  làm cân bằng (a) bị chuyển dịch có thể coi  $[HF] = 0,1$ ;  $[F^-] = 0,1$

$$\frac{[H^+][F^-]}{[HF]} = K_a = 6,8 \cdot 10^{-4}; [H^+] = 6,8 \cdot 10^{-4} \frac{[HF]}{[F^-]} = 6,8 \cdot 10^{-4}$$

$$pH = -\lg[H^+] = -\lg 6,8 \cdot 10^{-4} = -0,83 + 4 = 3,17$$

(2) Khi thêm 0,01 mol HCl vào thì:



$$[HF] = 0,1 + 0,01 = 0,11 \text{ mol}$$

$$[F^-] = 0,1 - 0,01 = 0,09 \text{ mol}$$

$$[H^+] = 6,8 \cdot 10^{-4} \frac{0,11}{0,09} = 6,8 \cdot 10^{-4} \cdot 1,22 = 8,296 \cdot 10^{-4}$$

$$pH = 3,08$$

– Khi thêm 0,01 mol NaOH vào thì:



$$[F^-] = 0,1 + 0,01 = 0,11 \text{ mol}; [HF] = 0,1 - 0,01 = 0,09 \text{ mol}$$

$$[H^+] = 6,8 \cdot 10^{-4} \frac{0,09}{0,11} = 5,56 \cdot 10^{-4}; pH = 3,26.$$

**259.** A, B là hai dung dịch HCl có nồng độ mol khác nhau. Nếu trộn  $V_1$  lít A với  $V_2$  lít B rồi cho tác dụng với 1,768 gam một hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al và Cu thì thấy vừa đủ để hoà tan các kim loại hoạt động có trong hỗn hợp và khi đó thu được 0,016 mol  $H_2$  ở đktc. Lượng Cu không tan đem oxi hoá rồi hoà tan thì cũng cần một lượng axit HCl vừa đúng như trên. Biết  $V_1 + V_2 = 0,052$  lít, nồng độ mol của B lớn gấp 4 của A và  $V_2/2$  lít B hoà tan vừa hết  $1/6$  lượng Fe của hỗn hợp.

a) Viết các phương trình phản ứng và tính thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính nồng độ mol của A và B. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

*GIẢI*

a) Đặt a, b là nồng độ của HCl trong dung dịch A và B. Đặt x, y, z là số mol Fe, Al, Cu.

Số mol HCl sau khi trộn =  $(V_1a + V_2b)$  mol

Viết các phương trình phản ứng của Fe và Al tác dụng với  $H^+$ ; Cu tác dụng với  $O_2$  và  $H^+$ .

$$\text{Theo đề ra: } \begin{cases} 2x + 3y = 2 \times 0,016 \\ 2z = 2x + 3y \end{cases}$$

Vậy:  $z = 0,016 \rightarrow m_{Cu} = 1,024$  gam  $\rightarrow 57,91\%$  Cu

Lượng Fe + Al còn lại =  $1,768 - 1,024 = 0,744$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 56x + 27y = 0,744 \\ 2x + 3y = 0,032 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,012 \\ y = 0,00267 \end{cases}$$

$m_{Fe} = 56 \times 0,012 = 0,672$  gam  $\rightarrow 38,01\%$  Fe

$m_{Al} = 1,768 - (1,024 + 0,672) = 0,072$  gam  $\rightarrow 4,07\%$  Al


b) Vì số mol HCl = số mol  $H^+$  nên:

$$aV_1 + bV_2 = 0,032 \quad (1)$$

Theo đề ra:  $b = 4a$  (2)

$$\frac{1}{6} \text{ lượng Fe} = \frac{0,012}{6} = 0,002$$

$$\text{Số mol } H^+ \text{ trong } \frac{1}{2} V_2 \text{ là } \frac{1}{2} bV_2$$



$$\text{Vậy: } \frac{1}{2} bV_2 = 0,004 \rightarrow bV_2 = 4aV_2 = 0,008$$

$$aV_2 = 0,002$$



Từ (1):  $aV_1 = 0,024$


$V_1: V_1 + V_2 = 0,052 \rightarrow a = 0,5$

$b = 2,0$

**260. a)** Khi điện phân 500ml dung dịch  $\text{CaI}_2$  với điện cực platin có màng ngăn thu được  $5,35 \cdot 10^{-3}$  mol  $\text{I}_2$ . Hỏi có bao nhiêu Faraday điện lượng đã đi qua dung dịch và pH của dung dịch thu được là bao nhiêu?

**b)** Pha loãng 10ml HCl với nước thành 250ml. Dung dịch thu được có pH = 3. Hãy tính nồng độ của HCl trước khi pha loãng và pH của dung dịch đó.

*GIẢI*



$$m_{\text{I}_2} = \frac{1}{96500} \times \frac{127 \times 2}{2} Q$$

$$127 \times 2 \times 5,35 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{96500} \times \frac{127 \times 2}{2} Q; Q = 1032,55 \text{ Faraday}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10,7 \times 10^{-3}}{0,5} = 21,4 \cdot 10^{-3}; [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{2,14 \cdot 10^{-2}} = 4,67 \cdot 10^{-13}; \text{pH} = -\lg(4,67 \cdot 10^{-13}) \rightarrow \text{pH} = 12,33$$

**b)** Trong dung dịch axit HCl điện li:



Sau khi pha loãng  $[\text{HCl}] = [\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol/l}$

Trước khi pha loãng  $[\text{HCl}] = 25 \times 10^{-3} = 0,025\text{M}$

$$\text{pH} = 3 - \lg 25 = 3 - 1,3979 = 1,602.$$

#### CHỦ ĐỀ 6

#### Tính hiệu suất phản ứng

**LƯU Ý:**

Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không tác dụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu suất phản ứng như sau:

**1. Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng:**

Công thức tính:

$$H\% = \frac{\text{Lượng thực tế đã phản ứng}}{\text{Lượng tổng số đã lấy}} \times 100\%$$

**2. Dựa vào một trong các chất tạo thành:**

*Công thức tính:*

$$H\% = \frac{\text{Lượng thực tế thu được}}{\text{Lượng thu theo lí thuyết (theo pt phản ứng)}} \times 100\%$$

**BÀI TẬP**


**261.** Từ một tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lít dung dịch HCl 37% ( $D = 1,19\text{g/ml}$ ) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc ở nhiệt độ cao. Tính hiệu suất của quá trình điều chế trên.

*GIẢI*

Lượng NaCl nguyên chất:

$$1000\text{kg} \times 89,5\% = 895\text{kg}$$

Lượng HCl thu được theo lí thuyết:



Lượng HCl thu được theo thực tế:

$$1250 \text{ lít} \times 1,19\text{kg/l} \times 37\% = 550,375\text{kg}$$

Hiệu suất của quá trình điều chế:

$$H\% = \frac{550,375}{558,42} \times 100\% = 98,55\%.$$

**262.** Khi đun nóng muối kali clorat, không có xúc tác, thì muối này bị phân hủy đồng thời theo hai phương trình sau:





Tính : – Bao nhiêu % khối lượng bị phân hủy theo (a)

– Bao nhiêu % khối lượng bị phân hủy theo (b)

Biết rằng khi phân hủy hoàn toàn 73,5g kali clorat thì thu được 33,5g kali clorua.

*GIẢI*



$$\begin{cases} a + b = \frac{73,5}{122,5} = 0,6 \\ a + \frac{b}{4} = \frac{33,5}{74,5} = 0,45 \end{cases}$$


---


$$\frac{3b}{4} = 0,15 \Rightarrow b = 0,2 \text{ và } a = 0,4$$

%m phân hủy theo (a):  $\frac{122,5 \times 0,4}{73,5} = 66,67\%$

%m phân hủy theo (b): 33,33%.

## BÀI TẬP TỰ GIẢI

**263.** a) Cho rất từ từ dung dịch A chứa a mol HCl vào dung dịch B chứa b mol  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ( $a < 2b$ ) thu được dung dịch C và V lít khí.

b) Nếu cho dung dịch B vào dung dịch A thu được dung dịch D và  $V_1$  (lít) khí. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, lập biểu thức nêu mối quan hệ giữa V và  $V_1$  với a, b.

*(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải, năm 1998)*

**264.** Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội; dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới  $100^\circ\text{C}$ .

a) Trong mỗi trường hợp hãy viết và cân bằng phản ứng oxi hoá-khử theo phương pháp cân bằng electron. Cho biết chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử?

b) Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu?

c) Trong dung dịch đậm đặc và nóng, lượng KOH tác dụng vừa đủ với 11,94 lít khí clo đo ở  $27^\circ\text{C}$  và 76cmHg. Làm bốc hơi nước và đem nhiệt phân chất rắn với  $\text{MnO}_2$  làm xúc tác. Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng chất rắn còn lại. Cho biết thể tích phân tử gam chất khí ở  $0^\circ\text{C}$ , 76cmHg bằng 22,4 lít.

*(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM, năm 1997)*

**265.** Điện phân NaCl với bình điện phân không có màng ngăn, thu được ở catot V lít khí (đktc). Biết thời gian điện phân là 33 phút 20 giây với cường độ dòng điện  $I = 0,193\text{A}$ .

a) Xác định V.

b) Cho biết ứng dụng của chất còn lại trong bình điện phân. Giải thích.

c) Nếu bình điện phân trên có màng ngăn thì sau khi điện phân, phải cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1M để trung hoà hoàn toàn dung dịch sau điện phân.

**266.** Lấy 14,4 gam hỗn hợp Y gồm bột Fe và  $\text{Fe}_x\text{O}_y$  hoà tan hết trong dung dịch HCl 2M được 2,24 lít khí ở  $273^\circ\text{C}$ , 1 atm. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc lấy kết tủa, làm khô và nung đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn.

a) Tính % khối lượng của các chất trong hỗn hợp Y.

b) Xác định công thức của sắt oxit.

c) Tính thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần lấy để hoà tan.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM, năm 2000)


267. Cho m (g) hỗn hợp gồm NaBr, NaI phản ứng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc nóng thu được hỗn hợp khí A ở điều kiện tiêu chuẩn. Ở điều kiện thích hợp A phản ứng vừa đủ với nhau tạo chất rắn có màu vàng và một chất lỏng không chuyển màu quỳ tím. Cho Na dư vào phần lỏng được dung dịch B. Dung dịch B hấp thụ vừa đủ với 2,24l  $\text{CO}_2$  (điều kiện chuẩn) được 9,5g muối. Tính m?

268. Điện phân dung dịch  $\text{BaCl}_2$  với bình điện phân có màng ngăn. Khi ngừng điện phân, thu được ở anot 11,2 lít khí (đktc).

a) Tính thời gian điện phân nếu  $I = 1,93\text{A}$ .

b) Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu, giả sử thể tích dung dịch sau điện phân là 1 lít.


269. a) Hoàn thành 5 phương trình phản ứng theo dạng sau:



(Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các chất tham gia phản ứng là những chất đã học).




b) (1) Hãy nêu 5 loại phản ứng khác nhau tạo ra HCl trực tiếp từ  $\text{Cl}_2$ .

(2) Viết các phương trình phản ứng thực hiện các biến đổi hoá học:



270. a) Nêu bốn phương pháp điều chế  $\text{Cl}_2$ .

b) Viết và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp electron.



c) Trình bày cách nhận biết các dung dịch hoặc các chất khí:

(1) NaCl,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaNO}_3$

(2) NaCl, NaBr, NaI, NaOH

(3)  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{F}_2$ ,  $\text{CO}_2$

(4) NaCl, NaBr, NaI, HCl

(5) HCl,  $\text{AgNO}_3$ , NaOH,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Ba(OH)}_2$

271. Có 16ml dung dịch axit HCl nồng độ x (mol/l) gọi là dung dịch A. Người ta thêm nước vào dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml, dung dịch mới có nồng độ 0,1mol/l

a) Tính x.

b) Lấy 10ml dung dịch A cho tác dụng với 15ml dung dịch KOH 0,85M thì được dung dịch B. Tìm nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch B.

272. Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl, sau khi cô cạn được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào dung dịch HCl như trên thì thu được 3,34 gam chất rắn và 448ml  $\text{H}_2$ .

Tính a gam, b gam.

273. Cho 200 cm<sup>3</sup> dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với 28,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II người ta thu được 6,72 lít khí (đktc).

a) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng.

b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng.

274. Hoà tan hoàn toàn 11,74 gam hỗn hợp M gồm một oxit kim loại kiềm và oxit kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A.

– Lấy ½ dung dịch A đem cô cạn. Điện phân nóng chảy chất rắn nhận được thì thấy thoát ra lượng khí Cl<sub>2</sub> cực đại 5,68 g.

– Lấy ½ dung dịch A cho tác dụng với Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dư thì thu được 2,33g kết tủa.

Xác định tên hai kim loại trong hỗn hợp M. Biết rằng trong hỗn hợp M oxit kim loại kiềm chiếm trên 72% theo số mol (kim loại kiềm gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr có hoá trị I; kim loại kiềm thổ gồm các nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra có hoá trị II).

275. Hỗn hợp A gồm bột Al và S. Cho 13,275 gam A tác dụng với 400ml HCl 2M thu được 8,316 lít H<sub>2</sub> tại 27,3°C và 1 atm; trong bình sau phản ứng có dung dịch B. Nếu nung nóng 6,6375gam A trong bình kín không có oxi tới nhiệt độ thích hợp được chất D. Hoà tan D trong 200ml HCl 2M được khí E và dung dịch F.

a) Hãy tính nồng độ các chất và các ion trong dung dịch B, dung dịch F.

b) Tính pH của mỗi dung dịch đó và nêu rõ nguyên nhân phải tạo pH thấp như vậy?

c) Dẫn khí E (đã được làm khô) qua ống sứ chứa 31,5 gam bột CuO nung nóng tới nhiệt độ thích hợp (không có oxi của không khí). Phản ứng xong ta thu được những chất nào? Tính lượng mỗi chất đó (Biết trong sản phẩm: chất rắn là nguyên chất, tính theo gam; chất khí bay hơi đo tại 100°C, 1 atm; khi tính số mol, được lấy tới chữ số 5 sau dấu phẩy).

(Thi học sinh giỏi Hoá học toàn quốc, năm 1995)

## HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG V

263.  $V = (a - b)22,4$

$$V_1 = \frac{a}{2} \times 22,4.$$

264. a) Clo là chất tự oxi hoá khử.

b) Tỷ lệ thể tích Cl<sub>2</sub> là 5/3.

c)  $V_{O_2} = 5$  lít ;  $m_{KCl} = 66,5g$ .

265. a)  $V = 0,448$  lít.

c)  $V = 0,04$  lít.

266. a) %Fe = 19,44% ; %Fe<sub>x</sub>O<sub>y</sub> = 80,56%.

b) Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> ; c) 0,25 lít.

267.  $m = 195,45g$ .

## CHƯƠNG VI


### NHÓM OXI

#### CHỦ ĐỀ 1

#### Bổ túc chuỗi phản ứng và cân bằng phản ứng

**276.** Anion  $X^{2-}$  có cấu hình electron lớp ngoài cùng là  $3s^2 3p^6$ . Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và gọi tên X.

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:



GIẢI

$X^{2-}$  có cấu hình electron lớp ngoài cùng  $3s^2 3p^6$


Vậy X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là  $3s^2 3p^4$ .

Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn:

– Số thứ tự 16, chu kì III, nhóm VIA.

– X là nguyên tố lưu huỳnh (S).

Sơ đồ phản ứng:



**277.** Hãy chọn 6 dung dịch muối (muối trung hoà hoặc muối axit) A, B, C, D, E, F ứng với 6 gốc axit khác nhau, thoả các điều kiện sau:

- $A + B \rightarrow$  có khí bay ra  
 $B + C \rightarrow$  có kết tủa  
 $A + C \rightarrow$  có kết tủa và có khí bay ra
- $D + E \rightarrow$  có kết tủa  
 $E + F \rightarrow$  có kết tủa  
 $D + F \rightarrow$  có kết tủa và có khí bay ra






## HƯỚNG DẪN GIẢI

• Chọn 6 dung dịch muối:




A:  $\text{NaHSO}_4$                       D:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

B:  $\text{Na}_2\text{SO}_3$                       E:  $\text{AgNO}_3$

C:  $\text{BaS}$                           F:  $\text{AlCl}_3$











278. A, B, C là đơn chất của các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, có các quy trình sau:



Xác định A, B, C, E, F, G, H

Viết phương trình phản ứng.


*GIẢI*












A: S; B:  $\text{H}_2$ ; C:  $\text{O}_2$ ; D:  $\text{SO}_2$ ; E:  $\text{H}_2\text{S}$ ; F:  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng

G:  $\text{MnSO}_4$ ; H:  $\text{K}_2\text{SO}_4$ .








279. Bổ túc phản ứng hoá học sau:



GIẢI











280. Tìm các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cân bằng các phản ứng:



GIẢI

Tìm các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cân bằng phương trình phản ứng:





## CHỦ ĐỀ 2

### Nhận biết và điều chế các chất


**281.** Có 4 lọ dung dịch nước của  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2$  và  $\text{KHSO}_4$  bị mất nhãn. Chỉ được dùng quỳ tím và chính các hoá chất trên. Trình bày phương pháp đơn giản nhất để phân biệt các lọ hoá chất trên.

#### GIẢI

Cho quỳ tím tác dụng với các mẫu thử, mẫu nào làm cho quỳ tím hoá xanh là dung dịch  $\text{NaOH}$ . Mẫu nào làm quỳ tím hoá đỏ là dung dịch  $\text{KHSO}_4$  và  $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2$ . ( $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2$  thủy phân cho môi trường axit nên quỳ tím hoá đỏ).

Cho dung dịch  $\text{NaOH}$  lần lượt tác dụng với 2 mẫu vừa thử.

– Nếu là  $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2$  thì sẽ có kết tủa. Sau đó kết tủa tan ra đồng thời có khí có mùi khai bay lên là  $\text{NH}_3$



– Dung dịch còn lại là  $\text{BaCl}_2$ .


**282.** a) Chỉ dùng quỳ tím làm thế nào để phân biệt được dung dịch các chất sau đây:  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$

b) Có 6 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau:  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{FeSO}_4$  và  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ . Dùng dung dịch xút hãy cho biết dung dịch trong mỗi lọ?


*GIẢI*

a) Cho một mẫu quỳ tím vào các mẫu thử, mẫu thử nào làm quỳ tím hoá xanh là dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , quỳ tím hoá đỏ là dung dịch  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , quỳ tím không đổi màu là  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  vì:

$\text{Na}_2\text{CO}_3$  là muối của bazơ mạnh ( $\text{NaOH}$ ) axit yếu ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) nên thủy phân tạo ra dung dịch có tính bazơ.



$\text{NH}_4\text{Cl}$  là muối của axit mạnh ( $\text{HCl}$ ) và bazơ yếu ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) nên thủy phân tạo ra dung dịch có tính axit.




$\text{Na}_2\text{SO}_4$  là muối của axit mạnh ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) và bazơ mạnh ( $\text{NaOH}$ ) nên không bị thủy phân.

b) Lấy từ mỗi dung dịch một ít để làm thí nghiệm.


– Nhỏ dung dịch  $\text{NaOH}$  vào từng dung dịch:

+ Dung dịch nào không có hiện tượng xảy ra. Đó là  $\text{K}_2\text{CO}_3$ .



+ Dung dịch nào thấy có khí mùi khai bay ra. Đó là  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ :





+ Dung dịch nào thấy có kết tủa trắng xuất hiện, để lâu ngoài không khí kết tủa không đổi màu. Đó là  $\text{MgSO}_4$ :




+ Dung dịch nào thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện, nhỏ tiếp  $\text{NaOH}$  đến dư, kết tủa tan mất. Đó là  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$



+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa dần dần chuyển sang màu nâu. Đó là  $\text{FeSO}_4$



+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa màu nâu. Đó là  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$



**283.** Dung dịch A chứa các ion:  $\text{Na}^+$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{SO}_3^{2-}$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ . Bằng những phản ứng hoá học nào có thể nhận biết từng loại anion có trong dung dịch.

### GIẢI

Nhận biết từng loại anion trong dung dịch A: Để làm câu này ta có thể tiến hành theo nhiều cách khác nhau. Sau đây giới thiệu 2 cách.

*Cách 1:*


– Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch axit HCl:

Dung dịch A + HCl  $\rightarrow$  hỗn hợp khí + dung dịch B



– Cho hỗn hợp khí lần lượt qua dung dịch  $\text{KMnO}_4$  và sau đó là dung dịch  $\text{Ca(OH)}_2$ . Ta thấy:

+ Dung dịch  $\text{KMnO}_4$  bị nhạt màu do phản ứng:



Chứng tỏ trong hỗn hợp khí có  $\text{SO}_2$ , suy ra dung dịch A có  $\text{SO}_3^{2-}$ .

+ Dung dịch  $\text{Ca(OH)}_2$  bị vẩn đục hoặc vẩn đục rồi trở nên trong suốt do các phản ứng:



Chứng tỏ trong hỗn hợp có khí  $\text{CO}_2$ , suy ra trong dung dịch A có  $\text{CO}_3^{2-}$ .




– Dung dịch A +  $\text{BaCl}_2$  thấy có kết tủa:



Chứng tỏ trong dung dịch A có ion  $\text{SO}_4^{2-}$

*Cách 2:*



– Dung dịch A +  $\text{BaCl}_2 \rightarrow$  hỗn hợp kết tủa C:



– Cho kết tủa C tác dụng với axit HCl:

+ Chất không tan là  $\text{BaSO}_4$ , suy ra dung dịch A có ion  $\text{SO}_4^{2-}$ .

+ Chất tan là  $\text{BaSO}_3$  và  $\text{BaCO}_3$ :



Nhận biết khí  $\text{SO}_2$ ,  $\text{CO}_2$  để suy ra có ion  $\text{SO}_3^{2-}$  và  $\text{CO}_3^{2-}$  như cách 1.

284. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch sau: KI,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , NaOH,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ , nước clo. Không dùng thêm chất khác, hãy trình bày cách nhận biết mỗi chất trên.

#### GIẢI

	KI	$\text{BaCl}_2$	$\text{Na}_2\text{CO}_3$	$\text{Na}_2\text{SO}_4$	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	NaOH	Nước $\text{Cl}_2$
KI							$\text{I}_2 \downarrow$ tím sẫm
$\text{BaCl}_2$	Không biểu hiện		$\text{BaCO}_3 \downarrow$	$\text{BaSO}_4 \downarrow$	$\text{BaSO}_4 \downarrow$	Không biểu hiện	
$\text{Na}_2\text{CO}_3$	Không biểu hiện	$\text{BaCO}_3 \downarrow$		Không biểu hiện	Không biểu hiện	Không biểu hiện	
$\text{Na}_2\text{SO}_4$	–	$\text{BaSO}_4 \downarrow$					
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$		$\text{BaSO}_4 \downarrow$				$\text{NH}_3 \uparrow$	
NaOH	–	–			$\text{NH}_3 \uparrow$		
Nước $\text{Cl}_2$	$\text{I}_2 \downarrow$ tím sẫm		$\text{CO}_2 \uparrow$				

Chiết từ các dung dịch ra các mẫu thử nhỏ


• Mẫu thử nước clo mùi hắc, màu vàng.

• Còn 6 mẫu chưa biết. Lấy một mẫu đổ vào 5 mẫu còn lại đến khi nào 3 trong 5 mẫu được đổ xuất hiện kết tủa thì ta kết luận: Mẫu đem thử chứa  $\text{BaCl}_2$ . Ba mẫu xuất hiện kết tủa thì dung dịch trước phản ứng chứa  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ . Hai mẫu không có biểu hiện chứa NaOH và KI.

• Lấy mẫu thử nước clo đổ lần lượt vào hai dung dịch KI và NaOH. Dung dịch nào cho xuất hiện các hạt màu tím sẫm thì dung dịch đó chứa KI, còn lại là dung dịch NaOH.

• Lấy dung dịch NaOH đổ vào 3 mẫu thử  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ , mẫu thử nào có mùi khai bay ra mẫu thử đó là dung dịch  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  còn lại là  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  và  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .

• Lấy mẫu thử nước clo đổ vào hai dung dịch còn lại, mẫu thử nào sủi bọt thì mẫu đó chứa  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . Mẫu còn lại là  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .



**285.** Cho một lượng  $\text{Cu}_2\text{S}$  tác dụng hoàn toàn với dung dịch  $\text{HNO}_3$  đun nóng. Phản ứng tạo thành dung dịch  $\text{A}_1$  và làm giải phóng ra khí  $\text{A}_2$  không màu, bị hoá nâu trong không khí. Chia  $\text{A}_1$  thành 2 phần. Thêm dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào phần 1, thấy tạo thành kết tủa trắng  $\text{A}_3$  thực tế không tan trong axit dư. Thêm lượng dư dung dịch  $\text{NH}_3$  vào phần 2, đồng thời khuấy đều hỗn hợp, thu được dung dịch  $\text{A}_4$  có màu xanh lam đậm.

a) Hãy chỉ ra  $\text{A}_1$ ,  $\text{A}_2$ ,  $\text{A}_3$ ,  $\text{A}_4$  là gì?

b) Viết các phương trình phản ứng mô tả các quá trình hoá học vừa nêu trên.

*GIẢI*

a) Chỉ ra các chất:





$\text{A}_1$  là dung dịch gồm  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  và  $\text{HNO}_3$  dư.

$\text{A}_2$  là khí NO

$\text{A}_3$  là kết tủa  $\text{BaSO}_4$

$\text{A}_4$  là dung dịch chứa ion phức  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

b) Các phương trình phản ứng:



**286.** Dung dịch A chứa a mol  $\text{CuSO}_4$  và b mol  $\text{FeSO}_4$ . Xét ba thí nghiệm sau:

• Thí nghiệm 1: Thêm c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch có 3 muối.

• Thí nghiệm 2: Thêm 2c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch có 2 muối.

• Thí nghiệm 3: Thêm 3c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch có 1 muối.

a) Tìm mối quan hệ giữa c và a và b trong từng thí nghiệm trên.


b) Nếu a = 0,2 mol; b = 0,3 mol và số mol Mg là 0,4 mol, tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

(Trích đề thi tuyển sinh vào Đại học Quốc gia TP.HCM, đợt 2 năm 2000)

*GIẢI*

a) – Thí nghiệm 1:



$\text{Cu}^{2+}$  có tính oxi hoá mạnh hơn  $\text{Fe}^{2+}$  nên phản ứng trước.



Nhận xét: Mg, dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư nên dung dịch sau phản ứng có 3 muối:  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{FeSO}_4$

$$c < a$$

– Thí nghiệm 2:





$$0 \leq 2c - a < b \text{ hoặc } a \leq 2c < a + b$$

– Thí nghiệm 3:

Dung dịch sau phản ứng chỉ có  $\text{MgSO}_4$  nên:

$$3c \geq a + b$$



$\text{FeSO}_4$  dư, kim loại Mg hết

Khối lượng chất rắn sau phản ứng



$$(64 \times 0,2) + (56 \times 0,2) = 24 \text{ g.}$$






**287.** Cho hỗn hợp gồm FeS và  $\text{Cu}_2\text{S}$  với tỉ lệ mol 1 : 1 tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  thu được dung dịch A và khí B. A tạo thành kết tủa trắng với  $\text{BaCl}_2$ ; để trong không khí B chuyển thành màu nâu  $\text{B}_1$ .

Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch amoniac tạo ra dung dịch  $\text{A}_1$  và kết tủa  $\text{A}_2$ . Nung  $\text{A}_2$  ở nhiệt độ cao được chất rắn  $\text{A}_3$ . Viết các phương trình phản ứng dạng ion.



*GIẢI*

A có khả năng tạo kết tủa trắng với  $\text{BaCl}_2$ , vậy trong A có ion  $\text{SO}_4^{2-}$ , khí B để trong không khí cho màu nâu  $\text{B}_1$ , vậy B là khí NO.





A<sub>2</sub>



### CHỦ ĐỀ 3

**Xác định nguyên tố oxi – lưu huỳnh  
và các hợp chất của chúng**

**288.** X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A. Cấu hình e ngoài cùng của X là  $2p^4$ .

a) Viết cấu hình e và xác định vị trí X, Y trong bảng tuần hoàn.

b) Viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử tạo nên từ X và Y.

*GIẢI*

a) X có cấu hình e lớp ngoài cùng là  $2p^4$ .

Y liên tiếp trong cùng một nhóm A, vậy Y có cấu hình e lớp ngoài cùng là  $3p^4$ .



Cấu hình e của X:  $1s^2 2s^2 2p^4$

X : ở chu kì 2, nhóm VIA là oxi

Cấu hình e của Y:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Y: ở chu kì 3, nhóm VIA là S

b) S và O<sub>2</sub> tạo ra SO<sub>2</sub> và SO<sub>3</sub>



**289.** Cho các nguyên tố X, Y, Z với cấu hình e ngoài cùng lần lượt là:

X:  $(n-1)p^4$

Y:  $np^4$

Z:  $(n+1)s^1$  với  $n = 3$

a) – Xác định số điện tích hạt nhân, vị trí 3 nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Viết công thức oxit cao nhất của Y và Z.
- b) Viết công thức cấu tạo các phân tử hợp bởi:
- X với Z
  - X với Y
  - X, Y và Z.

**GIẢI**

a) X:  $(n-1)p^4$ , thay  $n = 3$ . X:  $2p^4$

Cấu hình đầy đủ của X:  $1s^2 2s^2 2p^4$

Vị trí của X: chu kì 2, nhóm VIA,  $Z = 8$  là O

Vị trí Y: chu kì 3, nhóm VIA.  $Z = 16$  là S.

Z:  $(n+1)s^1$  thay  $n = 3$  Z:  $4s^1$

có 3 trường hợp:

•  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Z: chu kì 4, nhóm IA,  $Z = 19$  là kali

•  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

Z: chu kì 4, nhóm VIB,  $Z = 24$  là crom

•  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

Z: chu kì 4, nhóm IB,  $Z = 29$  là Cu

b) X và Z:  $K_2O$  (bỏ qua 2 trường hợp Z là Cr và Cu)

X và Y:  $SO_2, SO_3$

X Y và Z:  $K_2SO_3, K_2SO_4$ .

**290.** Cho biết tổng số electron trong anion  $AB_3^{2-}$  là 42. Trong các hạt nhân A cũng như B số proton bằng số neutron.

a) Tính số khối của A, B.

b) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron trong các obitan của các nguyên tố A, B.

c) Trong hợp chất  $AB_2$  có những loại liên kết gì?

(Giải thích trên cơ sở công thức electron)

**GIẢI**

a) Gọi x, y: số proton trong các hạt nhân của A, B ta có:

$$x + 3y = 42 - 2 = 40$$

Do đó  $y < \frac{40}{3} = 13,33 \Rightarrow B$  phải thuộc chu kì 2. Vì là phi kim (tạo anion) nên B


chỉ có thể là F, O hoặc N.

+ Nếu là F: ( $y = 9$ ) thì  $x = 40 - (3 \times 9) = 13 \Rightarrow Al$  (loại).




- + Nếu là O: ( $y = 8$ ) thì  $x = 30 - (3 \times 8) = 16$  đó là S (đúng).  
 + Nếu là N: ( $y = 7$ ) thì  $x = 40 - (3 \times 7) = 19$  ứng với K (loại).  
 Vậy: A là S có số khối:  $16 + 16 = 32$   
 B là O có số khối:  $8 + 8 = 16$

b) Cấu hình electron và sự phân bố electron của:



c) Hợp chất  $SO_2$  có công thức cấu tạo và công thức electron là:



– Liên kết  $S=O$  là liên kết cộng hoá trị có cực còn liên kết  $S \rightarrow O$  là liên kết cho nhận.

**291.** Một hợp chất được tạo thành từ các ion  $M^+$  và  $X_2^{2-}$ . Trong phân tử của  $M_2X_2$  có tổng số hạt proton, neutron và electron là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị.

Tổng số hạt proton, neutron, electron trong  $M^+$  nhiều hơn trong  $X_2^{2-}$  là 7 hạt.

- Xác định các nguyên tố M, X và viết công thức của phân tử  $M_2X$ .
- Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) của  $M^+$ .
- Viết công thức electron của ion  $X_2^{2-}$ .

*GIẢI*

Gọi  $p, z, n$  là số proton, số electron và số neutron trong một nguyên tử M.

$p', z', n'$  là số proton, số electron và số neutron trong một nguyên tử X.

Theo điều kiện bài toán ta có phương trình:

$$2(2z + n) + 2(2z' + n') = 164 \quad (1)$$

$$(4z + 4z') - 2(n + n') = 52 \quad (2)$$


$$(z + n) - (z' + n') = 23 \quad (3)$$

$$(2z + n - 1) - [2(2z' + n') + 2] = 7 \quad (4)$$

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được  $z = 19 \Rightarrow M$  là kali:  $z' = 8 \Rightarrow X$  là oxi.

Công thức phân tử của hợp chất là  $K_2O_2$ .

Cấu hình electron của ion  $K^+$



Công thức electron của ion  $X_2^{2-}$  là:  $[:\ddot{O}:\ddot{O}:]^{2-}$

**292.** Hợp chất A có công thức  $MX_x$ , trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. Trong hạt nhân của M có  $n - p = 4$ , của X có  $n' = p'$ . Tổng số proton trong  $MX_x$  là 58. Tìm công thức  $MX_x$  (x chỉ có thể biến thiên trong khoảng giá trị từ 1 - 4).

*GIẢI*

a) Trong nguyên tử M có:  $n - p = 4 \rightarrow n = p + 4$

X có:  $n' = p'$

Vì khối lượng nguyên tử thực tế = khối lượng hạt nhân = khối lượng p + khối lượng n. Vậy khối lượng nguyên tử M =  $(2p + 4)$  và khối lượng của nhóm  $xX = 2p'x$ .

Ta lại có:  $\frac{2p + 4}{2p'x} = \frac{46,67}{53,33} = \frac{7}{8}$  nên:

$$\begin{cases} 7p'x - 8p = 16 \\ p'x + p = 58 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} p'x = 32 \\ p = 26 \end{cases}$$

Trong hạt nhân của M có:  $2 \times 26 + 4 = 56$

Vậy M ở ô 26 (Fe) có số khối A = 56

b) Vì x nhận các giá trị từ 1 đến 4, nên từ  $p'x = 32$  ta có:

x	1	2	3	4
p'	32	16	10,6	8

Chu kì 1: Từ ô 1 đến ô 2

Chu kì 2: Từ ô 3 đến ô 10

Chu kì 3: Từ ô 11 đến ô 18

Chu kì 4: Từ ô 19 đến ô 36

Vậy nguyên tố có số thứ tự 16 ( $p' = 16$ ) ở chu kì 3. Do đó X là S (ô 16).

Công thức của muối  $FeS_2$ .

**293.** Hai nguyên tố A, B có các oxit ở thể khí tương ứng là  $AO_n$ ,  $AO_m$ ,  $BO_n$  và  $BO_i$ . Hỗn hợp gồm x phân tử gam  $AO_n$  và y phân tử gam  $AO_m$  có khối lượng phân tử trung bình là 37,6. Hỗn hợp gồm y phân tử gam  $AO_n$  và x phân tử gam  $AO_m$  có khối lượng phân tử trung bình là 34,4. Biết tỉ khối hơi của  $BO_n$  so với  $BO_i$  là 0,8 và  $x < y$ .

a) Xác định các chỉ số n, m, i và tỉ số x/y.

b) Xác định các nguyên tố A, B và các oxit của chúng.

c) Cho biết tính tan của các chất trên trong nước và tính chất hoá học cơ bản của các dung dịch của chúng.

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa TP HCM, năm 1989)

*GIẢI*

a) Xác định các chỉ số  $n, m, i$  và tỉ số  $x/y$

(1) Đặt khối lượng mol nguyên tử của 2 nguyên tố A, B lần lượt là A, B.

• Hỗn hợp I:  $x$  mol  $AO_n$  và  $y$  mol  $AO_m$  có khối lượng mol phân tử trung bình  $\bar{M}_1$

$$\bar{M}_1 = \frac{x(A + 16n) + y(A + 16m)}{x + y} = 37,6$$

$$\Rightarrow A + \frac{16(nx + my)}{(x + y)} = 37,6 \quad (1)$$

• Hỗn hợp II:  $x$  mol  $AO_m$  và  $y$  mol  $AO_n$  có khối lượng mol phân tử trung bình  $\bar{M}_2$

$$\bar{M}_2 = \frac{y(A + 16n) + x(A + 16m)}{(x + y)} = 34,4$$

$$\Rightarrow A + \frac{16(mx + ny)}{(x + y)} = 34,4 \quad (2)$$

$$\Rightarrow (1) - (2)$$

$$\frac{16(nx + my - mx - ny)}{x + y} = 3,2$$

$$\Rightarrow \frac{(m - n)(y - x)}{x + y} = 0,2 \quad (3)$$

Vì  $x + y > 0$  và  $x < y$  (theo đề bài)

$$\text{Nên } m - n > 0 \Rightarrow m > n \quad (a)$$

• Tỉ khối hơi của  $BO_m$  so với  $BO_i$ :

$$d = \frac{B + 16m}{B + 16i} = 0,8 \quad (4)$$

$$\Rightarrow \frac{B + 16m}{B + 16i} < 1 \Rightarrow m < i \quad (b)$$

So sánh (a); (b) ta có:  $n < m < i$

Các oxit ở thể khí thường có dạng tổng quát

$XO_K$  trong đó  $1 \leq K \leq 3$

$$\Rightarrow 1 \leq n < m < i \leq 3 \Rightarrow n = 1; m = 2 \text{ và } i = 3$$

(2) Tỉ số  $x/y$

Thay  $n = 1; m = 2$  vào (3) ta có:

$$\frac{y-x}{x+y} = 0,2 \Rightarrow 0,8y = 1,2x \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{3}$$

b) Xác định A, B và các oxit của chúng

• Thay  $n = 1$ ;  $m = 2$  và  $x = \frac{2}{3}y$  vào (1) thì được:

$A = 12$ . Vậy A là cacbon

• Thay  $m = 2$  và  $i = 3$  vào (4) thì được:

$B = 32$ . Vậy B là lưu huỳnh.


Vậy các oxit tương ứng của A là: CO và CO<sub>2</sub>

các oxit tương ứng của B là: SO<sub>2</sub> và SO<sub>3</sub>

c) Tính tan của các oxit và tính chất hoá học căn bản của các dung dịch.


(1) CO: rất ít tan trong nước

Có tính khử:




(2) CO<sub>2</sub>: ít tan trong nước:

Dung dịch có tính axit yếu, không bền:




(3) SO<sub>2</sub>: tan nhiều trong nước

Dung dịch có tính axit, không bền



Dung dịch có tính khử hoặc có tính oxi hoá



(4) SO<sub>3</sub>: tan nhiều trong nước tạo thành axit mạnh



Dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng có tính axit mạnh



Dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đậm đặc nóng có tính oxi hoá mạnh.

**294.** Đốt cháy chất X bằng lượng O<sub>2</sub> vừa đủ ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO<sub>2</sub> và SO<sub>2</sub> có tỉ khối so với hidro bằng 28,667 và tỉ khối (hơi) của X so với không khí nhỏ hơn 3. Xác định công thức phân tử, viết công thức electron và công thức cấu tạo của X.

*GIẢI*

$$\overline{M}_{\text{hh khí CO}_2 \text{ và SO}_2} : 28,667 \times 2 = 57,334.$$

Trong hỗn hợp khí: Gọi số mol  $\text{CO}_2$  là  $x$ , số mol  $\text{SO}_2$  là  $y$

$$\frac{44x + 64y}{x + y} = 57,334 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{SO}_2}} = \frac{1}{2}. \text{ Suy ra trong hợp chất X số mol nguyên tử C là 1 và số mol}$$

nguyên tử S là 2.

Công thức đơn giản  $(\text{CS}_2)_n\text{O}_z$

$n$  chỉ có thể = 1 vì nếu  $n = 2$ ;  $z = 0$  thì  $M_X = 152$

So với không khí  $\frac{M_X}{28} > 3$ . Trái với giả thiết

$n = 1$  và  $z = 1$  thì  $M_X = 92$  so với không khí  $\frac{M_X}{28} > 3$  cũng trái với giả thiết.

Vậy công thức  $\text{CS}_2$  là công thức của X.



**295.** Cho một lượng chất A tác dụng hết với một lượng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  vừa đủ, tạo ra chất B, C và 7,458 lít khí D ở  $30^\circ\text{C}$ , 1 atm. Ở cùng nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của D so với hidro bằng 2,286 lần tỉ khối hơi của nitơ so với hidro.

a) A, B, C là chất nào? Viết phương trình phản ứng cụ thể cho quá trình trên. Biết rằng trong các phản ứng đó các chất đều có hệ số như nhau trong các phương trình; A có thể là một trong các chất  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{KHCO}_3$ ,  $\text{KHSO}_3$ .

b) Tính khối lượng các chất: A, B, C và  $\text{H}_2\text{SO}_4$  nguyên chất.

*GIẢI*

a) Theo giả thiết:

$$\frac{\frac{M_D}{2}}{\frac{M_{\text{N}_2}}{2}} = 2,286 \Rightarrow M_D = M_{\text{N}_2} \times 2,286 = 64$$


A là một trong các chất  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{KHCO}_3$ ,  $\text{KHSO}_3$ . Vậy khi tác dụng  $\text{H}_2\text{SO}_4$  khí được giải phóng sẽ là  $\text{CO}_2$  hoặc  $\text{SO}_2$  với  $M = 64$  thì D là  $\text{SO}_2$  vậy A là một trong hai chất  $\text{K}_2\text{SO}_3$  hoặc  $\text{KHSO}_3$ .

b) Tính khối lượng các chất A, B, C và  $\text{H}_2\text{SO}_4$  nguyên chất.

\* A là  $K_2SO_3$

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{PV}{T} \Rightarrow V_0 = \frac{PVT_0}{P_0 T}$$

Số mol khí D:  $n_D = \frac{V_0}{22,4} = 0,3 \text{ mol}$




$$m_A (m_{K_2SO_3}) = 0,3 \times 158 = 47,4 \text{ gam}$$

$$m_B (m_{K_2SO_4}) = 0,3 \times 174 = 52,2 \text{ gam}$$

$$m_{H_2SO_4} = 0,3 \times 98 = 29,4 \text{ gam}$$

$$m_C (m_{H_2O}) = 0,3 \times 18 = 5,4 \text{ gam}$$

\* A là  $KHSO_3$



$$m_A (m_{KHSO_3}) : 0,3 \times 120 = 36 \text{ gam}$$

$$m_B (m_{KHSO_4}) : 0,3 \times 136 = 40,8\text{gam}$$

$$m_C (m_{H_2SO_4}) : 0,3 \times 18 = 5,4 \text{ gam}$$

$$m_{H_2SO_4} : 0,3 \times 98 = 29,4 \text{ gam.}$$



**296.** Cho 1,36 gam hỗn hợp bột kim loại sắt và magiê vào 400ml dung dịch  $CuSO_4$  chưa biết nồng độ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A cân nặng 1,84 gam và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi cân được 1,2 gam chất rắn C.

Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và nồng độ mol/l của dung dịch  $CuSO_4$ . Hiệu suất của các phản ứng đạt 100%.

(Trích đề thi tuyển sinh Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TPHCM, năm 1998)


*GIẢI*

Các phản ứng giữa hỗn hợp kim loại và dung dịch  $CuSO_4$ :







– Giả thiết hỗn hợp bột kim loại phản ứng hết – dung dịch B có  $FeSO_4$ ,  $MgSO_4$  và  $CuSO_4$  còn dư.





Khi nung trong không khí đến khối lượng không đổi có các phương trình phản ứng:



Khối lượng chất rắn ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{CuO}$ ) phải lớn hơn 1,36 gam nhưng theo đầu bài chỉ thu được 1,2 gam. Vậy giả thiết trên là sai.

– Giả thiết Mg phản ứng chưa hết. Do Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên phản ứng (1) thực hiện xong ( $\text{CuSO}_4$  đã hết). Nếu Mg chưa hết thì dung dịch B chỉ có  $\text{MgSO}_4$ , chất rắn chỉ có MgO.

$$n_{\text{Mg phản ứng}} = n_{\text{Cu}} = n_{\text{MgO}} = \frac{1,2}{40} = 0,03 \text{ mol}$$

Chất rắn A chỉ có Cu + Mg dư + Fe trong đó  $m_{\text{Cu}} = 0,03 \times 64 = 1,92$  gam trái với đầu bài cho vậy Mg phản ứng chưa hết là sai.

– Như vậy B có  $\text{MgSO}_4 + \text{FeSO}_4$

Chất rắn C có  $\text{MgO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$

Gọi  $n_{\text{Fe}}$ : x ;  $n_{\text{Mg}}$ : y ;  $n_{\text{Fe dư}}$ : z có trong hỗn hợp:

$$\begin{cases} 56x + 24y = 1,36 \\ [(x-z) + y]64 + 56z = 1,84 \\ \left(\frac{x-z}{2}\right)160 + 40y = 1,2 \end{cases}$$

Giải ra, được x = 0,02; y = 0,01; z = 0,01

$$m_{\text{Fe}} = 0,02 \times 56 = 1,12 \text{ gam}$$

$$m_{\text{Mg}} = 0,01 \times 24 = 0,24 \text{ gam}$$

$$n_{\text{CuSO}_4} = (x - z) + y = 0,02 \text{ mol}$$

$$[\text{CuSO}_4] = \frac{0,02}{0,4} = 0,05 \text{ mol/l.}$$

**297.** Cho 100 lít hỗn hợp A gồm  $\text{H}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ . Đem đốt hỗn hợp rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu, sau khi cho  $\text{H}_2\text{O}$  ngưng tụ thu được hỗn hợp B có thể tích 64 lít. Trộn vào B 100

lít không khí (20% thể tích  $O_2$ ) rồi đốt và tiến hành tương tự trên thì thu được hỗn hợp C có thể tích 128 lít.

Hãy xác định thể tích các chất trong hỗn hợp A, B, C. Biết các thể tích đo cùng điều kiện.

GIẢI



Sau lần phản ứng (I) hỗn hợp có thể tích giảm:  $100 - 64 = 36l$

Suy ra  $V_{H_2}$  (đã phản ứng) +  $V_{O_2}$  (đã phản ứng) = 36 l

Trong đó  $V_{H_2}$  đã phản ứng =  $2 V_{O_2}$  = 24 l

Sau lần phản ứng (II) hỗn hợp có thể tích tiếp tục giảm:

$$100 + 64 - 128 = 36 l$$

Chứng tỏ trong B còn  $H_2$  dư, suy ra  $O_2$  trong hỗn hợp A chỉ có 12 lít và đã phản ứng hết.

Ở lần phản ứng (II):

$$V_{H_2} \text{ (cùng phản ứng)} = 24 l$$

$$V_{O_2} \text{ phản ứng} = 12 l$$

Mà  $V_{O_2}$  trong 100l không khí =  $\frac{100}{5} = 20 (l) > 12 (l)$   $O_2$  phản ứng, chứng tỏ sau phản ứng (II)  $H_2$  đã hết, vì  $O_2$  dư.

$$V_{O_2} \text{ dư} = 8 (l)$$

Như vậy sau 2 lần phản ứng  $V_{H_2}$  :  $24 + 24 = 48 (l)$

Kết luận: hh A có: 48 (l)  $H_2$  ; 12 (l)  $O_2$ ; 40 (l)  $N_2$

hh B có: 24 (l)  $H_2$  ; 40 (l)  $N_2$

hh C có: 8 (l)  $O_2$  dư, 120 (l)  $N_2$ .

#### CHỦ ĐỀ 4

##### Tính pH và nồng độ dung dịch $H_2SO_4$

298. a) pH của dung dịch là gì?

b) Có hai dung dịch  $H_2SO_4$  với pH = 1,0 và pH = 2,0. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra khi rót từ từ 50ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50ml dung dịch trên. Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng.




**GIẢI**

a) Xem bài 282.

b) Dung dịch A có  $\text{pH} = 1 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1} = 0,1 \text{ mol/l}$

Trong 50ml dung dịch A có:  $\frac{0,1 \times 50}{1000} = 0,005 \text{ mol H}^+$  hay 0,0025 mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ;

$n_{\text{KOH}} = 0,005 \text{ mol}$



số mol ban đầu:      0,005      0,0025

số mol phản ứng:    0,005      0,0025    0,0025

Vậy trong dung dịch thu được có 0,0025 mol  $\text{K}_2\text{SO}_4$


$$[\text{K}_2\text{SO}_4] = \frac{0,0025 \times 1000}{(50 + 50)} = 0,025\text{M}$$

Dung dịch B ( $\text{pH} = 2$ ) cũng giải tương tự như trên.

**299.** Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,05M; b) Dung dịch  $\text{NH}_3$   $10^{-2}\text{M}$ .

**GIẢI**



$$[\text{H}^+] = 2 \times 0,05 = 0,1\text{M} \rightarrow \text{pH} = 1$$



Điều kiện  $[\text{OH}^-] \ll 10^{-2}\text{M}$ ;

$$\text{pH} = 14 - \frac{1}{2}(\text{pK} + \text{pC}_b) = 10,625.$$

**300.** Người ta nung 6,375 gam Cu (II) disulfua trong oxi dư thu được chất rắn A và hỗn hợp B gồm hai khí. Nung nóng A rồi cho luồng khí  $\text{NH}_3$  dư qua, thu được chất rắn  $\text{A}_1$ . Cho  $\text{A}_1$  tan hoàn toàn trong  $\text{HNO}_3$  thu được dung dịch  $\text{A}_2$ . Cô dung dịch  $\text{A}_2$  rồi nung ở nhiệt độ cao được chất rắn  $\text{A}_3$  và hỗn hợp khí  $\text{B}_3$ . Cho  $\text{B}_3$  hấp thụ hoàn toàn bởi 250 ml  $\text{H}_2\text{O}$  thu được dung dịch  $\text{A}_4$ . Sau khi hấp thụ, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Mặt khác cho hỗn hợp B lần lượt tác dụng với dung dịch  $\text{KMnO}_4$ , dung dịch  $\text{Br}_2$ , dung dịch nước vôi; khí  $\text{H}_2\text{S}$  dư.


a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Tính pH của dung dịch  $\text{A}_4$

(Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn).


*GIẢI*

a) Số mol  $\text{CuS}_2 = \frac{6,375}{127,5} = 0,05 \text{ mol}$  ( $M_{\text{CuS}_2} = 63,5 + 64 = 127,5$ )



$$0,05 \text{ mol} \qquad \qquad \qquad 0,05 \text{ mol} \quad 0,1 \text{ mol}$$

- A là CuO; B là hỗn hợp  $\text{SO}_2 + \text{O}_2$  dư




$$0,05 \text{ mol} \qquad \qquad \qquad 0,05 \text{ mol}$$

- A<sub>1</sub> là Cu



$$0,05 \text{ mol} \qquad \qquad \qquad 0,05 \text{ mol}$$


- Dung dịch A<sub>2</sub> là  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$



$$0,05 \text{ mol} \qquad \qquad 0,05 \text{ mol} \quad 0,1 \text{ mol} \quad 0,025 \text{ mol}$$

- A<sub>3</sub> là CuO



- Hỗn hợp khí B<sub>3</sub> là:  $\text{NO}_2 = 0,1 \text{ mol}$  ;  $\text{O}_2 = 0,025 \text{ mol}$



$$0,1 \text{ mol} \quad 0,025 \text{ mol} \qquad \qquad \qquad 0,1 \text{ mol}$$

- Dung dịch A<sub>4</sub> là 0,1 mol.

Hỗn hợp B phản ứng:



b) Tính pH:

$$[\text{HNO}_3] = [\text{H}^+] = \frac{0,1}{0,25} = 0,4 \text{ mol/l}$$


$$\text{pH} = -\lg 0,4 \rightarrow \text{pH} = 0,398 \approx 0,4.$$

**301.** Tính pH của dung dịch thu được khi cho 1 lít dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,005M tác dụng với 4 lít dung dịch NaOH 0,005M (cho  $\lg 2 = 0,3$ ).

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP HCM, năm 1999)

*GIẢI*

Phương trình phản ứng:



$$n_{\text{H}^+} = 1 \times 2 \times 0,005 = 0,01 \text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^-} = 4 \times 0,005 = 0,02 \text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^- \text{ dư}} = 0,02 - 0,01 = 0,01 \text{ mol}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,01}{1+4} = 0,002 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-] = -\lg(2 \times 10^{-3}) = 3 - 0,3 = 2,7$$

Ta đã biết  $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

$$\text{pH} = 14 - 2,7 = 11,3.$$

**CHỦ ĐỀ 5**

**Tính hiệu suất phản ứng**

**302.** Trong một bình kín dung tích không đổi chứa  $a$  mol  $\text{SO}_2$ ,  $a$  mol  $\text{O}_2$  và một ít bột xúc tác  $\text{V}_2\text{O}_5$ ; áp suất và nhiệt độ trong bình là  $P$  atm và  $t^\circ\text{C}$ . Nung nóng bình một thời gian, sau đó đưa nhiệt độ bình về  $t^\circ\text{C}$ , áp suất trong bình lúc này là  $P'$ . Lập biểu thức  $P'$  theo  $P$  và  $h$  (hiệu suất phản ứng). Hỏi  $P'$  có giá trị trong khoảng nào, biết rằng ở  $t^\circ\text{C}$  các chất đều ở thể khí.

*GIẢI*

Biểu thức tính  $P'$  theo  $P$  và  $h$  (hiệu suất phản ứng)



Ban đầu:             $a$  mol             $a$  mol            0

phản ứng với       $ah$  mol       $ah/2$  mol       $ah$  mol  
hiệu suất  $h\%$

Cân bằng       $(a - ah)$ mol       $\left(a - \frac{ah}{2}\right)$ mol       $ah$  mol

– Tổng số mol ban đầu  $n_i = a + a = 2a$ mol

– Tổng số mol sau phản ứng:  $n_s = a - ah + a - \frac{ah}{2} + ah$

$$n_s = 2a - \frac{ah}{2} = \frac{a(4 - h)}{2}$$

Ta có:

$$\frac{P_s}{P_t} = \frac{n_s}{n_t} \Rightarrow \frac{P'}{P} = \frac{a(4-h)}{2 \cdot 2a} = \frac{4-h}{4}$$

$$\Rightarrow P' = \frac{4-h}{4} P$$

\* Nếu  $h = 0$  (không phản ứng):  $P' = P$

\* Nếu  $h = 1$  (hiệu suất 100%):

$$P' = \frac{4-1}{4} P = \frac{3P}{4}$$

Vậy  $P'$  phải có giá trị trong khoảng:

$$\frac{3P}{4} < P' < P$$

**303.** Cho  $m$  gam hỗn hợp bột Fe và S với tỉ lệ số mol sắt bằng 2 lần số mol lưu huỳnh, rồi đem nung (không có oxi), thu được hỗn hợp A. Hoà tan A bằng dung dịch HCl dư thu được 0,4 gam chất rắn B, dung dịch C và khí D. Sục khí D từ từ qua dung dịch  $\text{CuCl}_2$  dư thấy tạo ra 4,8 gam kết tủa đen.

a) Tính hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A (theo S). Tính  $m$ .


b) Cho dung dịch C tác dụng với  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng, dư. Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

#### GIẢI

a) Gọi  $x$  là số mol S có trong  $m$  gam hỗn hợp. Suy ra số mol Fe sẽ là  $2x$ .

Gọi  $x_1$  là số mol S tham gia phản ứng khi nung:

Ta có:



Sau khi nung, trong hỗn hợp A có:

$(x - x_1)$  mol S

$(2x - x_1)$  mol Fe

và  $x_1$  mol FeS


- Hoà tan A trong axit HCl dư:



Còn lại 0,4 gam chất rắn B là S

$$n_S = x - x_1 = \frac{0,4}{32} = 0,0125 \text{ mol} \quad (I)$$

Dung dịch C là  $\text{FeCl}_2$  với số mol là  $2x$ . Khí D gồm  $\text{H}_2$  và  $\text{H}_2\text{S}$   
 Sục khí D từ từ vào dung dịch  $\text{CuCl}_2$  dư, chỉ có  $\text{H}_2\text{S}$  phản ứng:



Kết tủa đen tạo thành là  $\text{CuS}$

Theo (1), (2), (4):

$$n_{\text{CuS}} = x_1 = \frac{4,8}{96} = 0,05 \text{ mol} \quad (\text{II})$$

Kết hợp (I) và (II) ta có:  $x - x_1 = 0,0125$

$$x = 0,0125 + 0,05 = 0,0625.$$

– Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A:

$$\text{Theo S: } h\% = \frac{0,05}{0,0625} \times 100\% = 80\%$$

b) Học sinh tự giải.

## BÀI TẬP TOÁN TỔNG HỢP


304. Cho a gam hỗn hợp gồm  $\text{FeS}_2$  và  $\text{FeCO}_3$  với số mol bằng nhau vào một bình kín chứa lượng dư oxi. Áp suất trong bình là  $p_1$  at. Đun nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất khí trong bình lúc này là  $p_2$  at, khối lượng chất rắn thu được là b gam. Biết rằng thể tích chất rắn trong bình trước và sau phản ứng là không đáng kể. Hãy xác định các tỉ số  $p_1/p_2$  và  $a/b$ .

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1999)

### GIẢI

Xét hỗn hợp gồm  $x$  mol  $\text{FeCO}_3$  và  $x$  mol  $\text{FeS}_2$

Các phương trình phản ứng đốt cháy:



$$\text{Theo (1): } n_{\text{O}_2}(1) = \frac{1}{4}x; n_{\text{Fe}_2\text{O}_3}(1) = \frac{1}{2}x; n_{\text{CO}_2} = x$$

$$\text{Theo (2): } n_{\text{O}_2}(2) = \frac{11}{4}x; n_{\text{Fe}_2\text{O}_3}(2) = \frac{1}{2}x; n_{\text{SO}_2}(2) = 2x$$

Như vậy sau phản ứng (1), (2) đã dùng hết  $3x$  mol  $\text{O}_2$ , nhưng lại tạo ra  $3x$  mol  $\text{CO}_2$  và  $\text{SO}_2$ . Do đó, số mol khí trong bình trước và sau phản ứng không thay đổi.

Như vậy, tại một nhiệt độ thì  $p_1 = p_2$  hay  $\frac{p_1}{p_2} = 1$ .

Theo (1), (2):  $a = 116x + 120x = 236x$  gam

$$b = 0,5x \times 160 + 0,5x.160 = 160x \text{ gam}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{236x}{160x} = 1,475.$$

305. Có một oleum công thức là  $\text{H}_2\text{SO}_4.3\text{SO}_3$ , cần bao nhiêu gam oleum này để pha vào 100ml dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  40% ( $d = 1,31 \text{ g/ml}$ ) để tạo ra oleum có hàm lượng  $\text{SO}_3$  là 10%.

GIẢI


Đặt  $y$  là số gam  $\text{H}_2\text{SO}_4.3\text{SO}_3$  cần hoà tan:

Trong 338 gam  $\text{H}_2\text{SO}_4.3\text{SO}_3$  có 98g  $\text{H}_2\text{SO}_4$  + 240g  $\text{SO}_3$

$$y \text{ gam} \quad \frac{98y}{338} \text{ g và } \frac{240y}{338} \text{ g}$$

Trong 131 gam  $\text{H}_2\text{SO}_4$  40% có 52,4g  $\text{H}_2\text{SO}_4$  + 78,6g  $\text{H}_2\text{O}$ .

Khi hoà tan:



$$y_1 = \frac{78,6 \times 80}{18} = 349,3 \text{ gam SO}_3$$

$$y_2 = \frac{78,6 \times 98}{18} = 427,9 \text{ gam H}_2\text{SO}_4$$

Vì oleum có 10%  $\text{SO}_3$  nên ta có:

$$\frac{\text{Khối lượng SO}_3}{\text{Khối lượng H}_2\text{SO}_4} = \frac{10}{90}$$

$$\text{Vậy khối lượng SO}_3 \text{ dư} = \frac{240y}{338} - 349,3 = (0,71y - 349,3) \text{ gam}$$

$$\text{Khối lượng H}_2\text{SO}_4 = 427,9 + 52,4 + \frac{98y}{338} = (480,3 + 0,29y) \text{ gam hay}$$

$$\frac{0,71y - 349,3}{480,3 + 0,29y} = \frac{1}{9} \rightarrow y = 594,09 \text{ gam.}$$

306. Hỗn hợp ban đầu  $\text{SO}_2$  và  $\text{O}_2$  có tỉ khối hơi đối với  $\text{H}_2$  bằng 24. Cần thêm bao nhiêu lít  $\text{O}_2$  vào 20 lít hỗn hợp ban đầu để hỗn hợp sau có tỉ khối hơi so với  $\text{H}_2$  bằng 22,4.

(Biết rằng thể tích các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

GIẢI

Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol.

Trong hỗn hợp  $\text{SO}_2$ ,  $\text{O}_2$  có  $M = 24 \times 2 = 48$

Gọi  $n_{\text{SO}_2} : x$  và  $n_{\text{O}_2} : y$

$$\frac{64x + 32y}{x + y} = 48 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{1}$$

$n_{\text{SO}_2}$  chiếm 50% hỗn hợp

$n_{\text{O}_2}$  chiếm 50% hỗn hợp

Trong 20 lít hỗn hợp  $V_{\text{SO}_2} = V_{\text{O}_2} = 10$  lít hay 20 mol hỗn hợp có  $n_{\text{SO}_2} = n_{\text{O}_2} = 10$  mol.  $n_{\text{O}_2}$  thêm là  $a$

$$\frac{(10 \times 64) + (10 \times 32) + (a \times 32)}{10 + 10 + a} = 22,4 \times 2$$

$$640 + 320 + 32a = (20 + a)44,8$$

$$12,8a = 64 \Rightarrow a = 5$$

Nếu tính theo lít thì 20 lít hỗn hợp A cần trộn thêm 5 lít  $\text{O}_2$  sẽ được hỗn hợp có  $\bar{M} : 44,8$  (hỗn hợp có  $d/\text{H}_2 = 22,4$ ).

**307.** Dùng một lượng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  nồng độ 20%, đun nóng để hoà tan vừa đủ 0,2 mol  $\text{CuO}$ . Sau phản ứng, làm nguội dung dịch đến  $10^\circ\text{C}$ . Tính khối lượng tinh thể  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của  $\text{CuSO}_4$  ở  $10^\circ\text{C}$  là 17,4 gam.

(Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP HCM, năm 2000)

GIẢI



$$0,2 \text{ mol} \quad 0,2 \text{ mol} \quad \quad 0,2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{CuO}} = 80 \times 0,2 = 16 \text{ gam}$$

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{98 \times 0,2 \times 100}{20} = 98 \text{ g}$$

$$M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 250 \text{ gam}$$

$$m_{\text{CuSO}_4} = 160 \times 0,2 = 32 \text{ gam}$$

$$m_{\text{dung dịch sau phản ứng}} = 98 + 16 = 114 \text{ gam}$$

– Trong 114 gam dung dịch có 32 gam chất tan và 82 gam  $\text{H}_2\text{O}$

Gọi số mol  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  kết tinh là  $x$  mol

Khối lượng dung dịch còn lại là:  $114 - 250x$

Khối lượng chất tan còn lại là:  $32 - 160x$

Độ tan của  $\text{CuSO}_4$  là 17,4 gam, nghĩa là trong 117,4 gam dung dịch có 17,4 gam chất tan.

– Trong 117,4 gam dung dịch có 17,4 gam chất tan.

$(114 - 250x)\text{g}$  có  $(32 - 160x)$  gam chất tan.

$$117,4 \times (32 - 160x) = (114 - 250x) \times 17,4$$

Giải ra ta có  $x = 0,1228 \text{ mol}$

Khối lượng tinh thể  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  tách ra:

$$0,1228 \times 250 = 30,7 \text{ gam.}$$

## BÀI TẬP TỰ GIẢI

**308.** Cho 9,2 gam natri vào 160 ml dung dịch có khối lượng riêng là 1,25g/ml chứa  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  với nồng độ tương ứng là 0,125M và  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  0,5M. Sau phản ứng, người ta tách kết tủa ra và đem nung đến khối lượng không đổi.

a) Tính khối lượng các chất rắn thu được sau khi nung.

b) Tính nồng độ phần trăm của các muối tạo thành trong dung dịch.

**309.** Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm  $\text{FeS}_2$  và  $\text{Cu}_2\text{S}$  vào  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc nóng, thu được dung dịch A và khí  $\text{SO}_2$ .

Hấp thụ hết  $\text{SO}_2$  vào 1 lít dung dịch  $\text{KOH}$  1M thu được dung dịch B.

Cho  $\frac{1}{2}$  lượng dung dịch A tác dụng với một lượng dư dung dịch  $\text{NH}_3$ , lấy kết tủa nung đến không đổi thu được 3,2 gam chất rắn. Cho dung dịch  $\text{NaOH}$  vào  $\frac{1}{2}$  lượng dung dịch A. Lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi, sau đó thổi hiđro (dư) đi qua chất rắn còn lại, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,62 gam hơi nước.

a) Tính m.

b) Tính số gam các muối có trong dung dịch B.

**310.** Có dung dịch của hỗn hợp X gồm  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  và  $\text{FeSO}_4$ .

– Cho 50ml X tác dụng với lượng dư dung dịch  $\text{NH}_3$ . Lọc, rửa kết tủa, rồi nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khi có khối lượng không đổi, thu được 1,76 gam chất rắn.

– Lấy 50ml X, thêm vào đó lượng dư dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng rồi nhỏ từ từ dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,05M vào đồng thời khuấy đều, khi đã dùng hết 24ml  $\text{KMnO}_4$  trên thì dung dịch bắt đầu có màu hồng nhạt.

– Cho 50ml X tác dụng với lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$ . Lọc, rửa kết tủa, làm khô, cân được 9,32 gam chất rắn.

a) Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion rút gọn.

b) Tính nồng độ mol các chất tan trong dung dịch X.

*(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1997)*

**311.** Hoà tan 20g  $\text{K}_2\text{SO}_4$  vào 150g nước, thu được dung dịch A. Tiến hành điện phân dung dịch A một thời gian. Sau khi điện phân khối lượng  $\text{K}_2\text{SO}_4$  trong dung dịch chiếm 15% khối lượng dung dịch. Biết lượng nước bay hơi không đáng kể.



a) Tính thể tích khí thoát ra ở mỗi điện cực.

b) Tính thể tích  $H_2S$  (đktc) cần dùng để phản ứng hết với khí thoát ra ở anot.

**312.** Hoà tan hỗn hợp gồm 18,24 gam  $FeSO_4$  và 27,36 gam  $Al_2(SO_4)_3$  vào 200 gam dung dịch  $H_2SO_4$  9,8%, thu được dung dịch A. Cho 77,60 gam NaOH nguyên chất vào dung dịch A, thu được kết tủa B và dung dịch C. Tách kết tủa B khỏi dung dịch C.

a) Nung kết tủa B ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

b) Thêm nước vào dung dịch C, thu được dung dịch D có khối lượng là 400 gam. Tính khối lượng nước thêm vào và nồng độ phần trăm theo khối lượng các chất tan trong dung dịch D.

c) Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch D trên để:

(1) Được khối lượng kết tủa lớn nhất?

(2) Được kết tủa mà sau khi nung đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn cân nặng 5,1 gam?

*(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Huế, năm 1999)*

**313.** Khi cho 17,40 gam hợp kim Y gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng hết với  $H_2SO_4$  loãng, dư ta được dung dịch A: 6,40 gam chất rắn, 9,856 lít khí B ở  $27,3^\circ C$  và 1 atm.

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim Y.

b) Hãy tính nồng độ các chất trong dung dịch A, biết rằng  $H_2SO_4$  đã dùng có nồng độ 2M và đã được lấy dư 10% so với lượng cần thiết để phản ứng (thể tích dung dịch không thay đổi trong thí nghiệm)

**314.** Cho 31,4 gam hỗn hợp hai muối  $NaHSO_3$  và  $Na_2CO_3$  vào 400 gam dung dịch  $H_2SO_4$  có nồng độ 9,8%, đồng thời đun nóng dung dịch thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với hydro bằng 28,66 và một dung dịch X. Tính C% các chất tan trong dung dịch.

**315.** Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây:  $NaHSO_4$ ;  $KHCO_3$ ;  $Na_2SO_3$ ;  $Mg(HCO_3)_2$ ;  $Ba(HCO_3)_2$ . Trình bày cách nhận biết từng dung dịch chỉ được dùng thêm cách đun nóng.

**316.** Người ta có a (nguyên tử gam) kim loại M (hoá trị n không đổi) tan vừa hết trong dung dịch chứa a (phân tử gam)  $H_2SO_4$  được 1,56 gam muối A và khí B. Lượng khí B được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M tạo thành 0,608 gam muối.

Lượng muối A thu được ở trên cho hoà tan hoàn toàn vào nước sau đó cho thêm 0,387 gam hỗn hợp C gồm Zn và Cu, sau khi phản ứng xong tách được 1,144 gam chất rắn D.

a) Tính khối lượng của kim loại M ban đầu.

b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp C.

**317.** Hoà tan lần lượt a gam Mg xong đến b gam Fe, c gam một sắt oxit X trong  $H_2SO_4$  loãng dư thì thu được 1,23 lít khí A ( $27^\circ C$ , 1 atm) và dung dịch B. Lấy 1/5 dung dịch B cho tác dụng vừa đủ với dung dịch  $KMnO_4$  0,05M thì hết 60ml dung dịch C. Biết trong dung dịch C có 7,314 gam hỗn hợp muối trung hoà.

a) Cho biết công thức oxit sắt đã dùng.

b) Tính a, b, c?

c) Tính V dung dịch  $H_2SO_4$  2M tối thiểu cần để thực hiện phản ứng trên.

**318.** a) Khi cho a gam dung dịch  $H_2SO_4$  nồng độ A% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Na, Mg (dùng dư) thì thấy lượng khí  $H_2$  tạo thành bằng 0,05a gam. Tính A%.

b) Khi hoà tan b gam oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit  $H_2SO_4$  15,8% người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Xác định kim loại hoá trị II.

**319.** Hoà tan 9,875 gam một muối hidrocacbonat (muối A) vào nước và cho tác dụng với một lượng  $\text{H}_2\text{SO}_4$  vừa đủ, rồi đem cô cạn thì thu được 8,25 gam một muối sunfat trung hoà khan.

Xác định công thức phân tử và gọi tên muối.

**320.** Một hỗn hợp A gồm 2 oxit kim loại là  $\text{Fe}_x\text{O}_y$  và  $\text{M}_2\text{O}_3$  với số mol là a và b, trong đó  $a/b = 1,6$ . Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc tạo ra 179,2 ml khí (đktc) và hỗn hợp muối có khối lượng gấp 1,356 lần khối lượng muối tạo ra từ  $\text{Fe}_x\text{O}_y$ . Tính khối lượng hỗn hợp A và khối lượng muối tạo thành.

## HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG VI

**308.** a) 5,24g; b)  $C\%_{\text{Na}_2\text{SO}_4} : 12,71\%$ ;  $C\%_{\text{NaAlO}_2} : 1,63\%$ .

**309.** a)  $m = 3,2\text{g}$ ; b)  $m_{\text{K}_2\text{SO}_3} = 26,86\text{g}$ ;  $m_{\text{KHSO}_3} = 79,2\text{g}$ .

**310.**  $[\text{H}_2\text{SO}_4] = 0,2\text{M}$ ;  $[\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3] = 0,16\text{M}$ ;  $[\text{FeSO}_4] = 0,12\text{M}$ .

**311.** a)  $V_{\text{H}_2} = 45,63$  lít;  $V_{\text{O}_2} = 22,8$  lít.

b)  $V_{\text{H}_2\text{S}} = 15,2$  lít.

**312.** a)  $m_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 9,6\text{g}$ ; b)  $C\%_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 19,88\%$ ;  $C\%_{\text{NaAlO}_2} = 3,28\%$

$C\%_{\text{NaOH}} = 6,60\%$ .

c)  $V = 410\text{ml}$ ;  $V = 380\text{ml}$ ;  $V = 500\text{ml}$ .

**313.** a)  $\% \text{Al} : 31,03\%$ ;  $\% \text{Fe} = 32,18\%$ ;  $\% \text{Cu} = 36,79\%$ .

b)  $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3] = 0,455\text{M}$ ;  $[\text{FeSO}_4] = 0,455\text{M}$ .


**314.**  $C\%_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 6,86\%$ ;  $C\%_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 4,73\%$ .

**316.** a)  $m_{\text{Ag}} = 1,08\text{g}$ ; b)  $m_{\text{Ag}} = 1,08\text{g}$ ;  $m_{\text{Cu dư}} = 0,064\text{g}$ .

**317.** a)  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ; b)  $a = 1,68\text{g}$ ;  $b = 0,48\text{g}$ ;  $c = 10,44\text{g}$ .

**318.** a)  $A\% = 15,8$ ; b: M là Mg.

**319.** Phương trình phản ứng:



Dựa vào phương trình trên và dữ kiện đề bài, ta có  $R = 18n$  khi cho  $n = 1, 2, 3$  không có kim loại nào có M phù hợp vậy  $R = \text{NH}_4^+$ .

**320.** Hỗn hợp A gồm  $\text{Al}_2\text{O}_3$  và  $\text{Fe}_3\text{O}_4$

$m_A = 4,732\text{g}$ ;  $m_{\text{muối}} = 13,02\text{g}$ .

## CHƯƠNG VII

# TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC

### CHỦ ĐỀ 1

Ảnh hưởng của nồng độ các chất tham gia đến tốc độ phản ứng.

Tính thành phần các chất.

321. a) Cho phản ứng  $2A + B \longrightarrow C$ . Nồng độ ban đầu của A là 6M của B là 5M. Hằng số tốc độ  $k = 0,5$ . Tính tốc độ phản ứng khi đã có 55% chất B tham gia phản ứng.

b) Cho phản ứng sau:  $H_2O_{(h)} + CO_{(k)} \rightleftharpoons H_2_{(k)} + CO_{2(k)}$ . Ở  $700^\circ C$  hằng số cân bằng  $K = 1,71$ . Tính nồng độ  $H_2O$  và  $CO$  ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol  $H_2O$  và 0,300 mol  $CO$  trong bình 10 lít ở  $700^\circ C$ .

c) Có phản ứng  $A + B \longrightarrow C$ . Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thành là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu nồng độ chất A vẫn như cũ, nồng độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được cũng là 10%?

### GIẢI

a) Khi có 55% chất B tham gia phản ứng thì nồng độ chất B còn lại:

$$\frac{5 \times 45}{100} = 2,25 \text{ mol}$$

Nồng độ chất A còn lại:  $6 - 2(2,25) = 1,5M$

$$V = 0,5 \times [1,5]^2 \cdot [2,25] \approx 2,5$$

$$b) C_{M(H_2O) \text{ ban đầu}} = \frac{0,3}{10} = 0,03M; C_{M(CO) \text{ ban đầu}} = \frac{0,3}{10} = 0,03M$$

Gọi  $x$  là nồng độ nước tham gia phản ứng:



Nồng độ phản ứng:

Nồng độ cân bằng:  $0,03-x \quad 0,03-x \quad x \quad x$

$$K = \frac{x^2}{(0,03-x)^2} = 1,71$$

Giải ra ta có  $x = 0,017$

Do đó  $C_{M(H_2O)} = C_{M(CO)} = 0,03 - 0,017 = 0,013 \text{ mol/l}$ .

c) Gọi tốc độ phản ứng trường hợp 1 là  $V_1$ , trường hợp 2 là  $V_2$ .

$$V_1 = k[A][B] = k.0,01 \times 0,002$$

$$V_2 = k[A][B'] = k.0,01 \times 0,01$$

$$\frac{V_1}{V_2} = 0,2 \rightarrow V_1 = 0,2V_2 \rightarrow 5V_1 = V_2$$

Như vậy sau 5 phút lượng chất C thu được cũng là 10%.

**322.** a) Hỏi nồng độ CO trong phản ứng  $2CO \rightarrow CO_2 + C$  tăng lên bao nhiêu lần để cho tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần.

b) Tác dụng giữa CO và  $Cl_2$  diễn ra theo phương trình:



Nồng độ CO là 0,3 mol/l, của clo là 0,2 mol/l. Hỏi tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào nếu nồng độ của clo tăng lên 0,6 mol/l, của CO tăng lên 1,2 mol/l.

*GIẢI*

a) Gọi [CO] lúc tốc độ  $V_1$  là x, gọi [CO] lúc tốc độ  $V_2$  là y

$$V_2 = 4V_1 ; V_1 = kx^2 ; V_2 = ky^2 \Rightarrow ky^2 = 4kx^2 \rightarrow y = 2x.$$

[CO] tăng lên 2 lần.

$$b) V_1 = k.0,3.0,2 = 0,06k ; V_2 = 1,2 \times 0,6k = 0,72k \Rightarrow V_2 = 12V_1.$$

**323.** a) Cho phương trình:  $A_{(k)} + \alpha B_{(k)} \rightarrow AB_{\alpha(k)}$

Xác định  $\alpha$ , biết rằng khi tăng nồng độ của A và B gấp 2 lần nhận thấy tốc độ phản ứng tăng 16 lần.

b) Cho phản ứng  $A + 2B \rightarrow C$

Nồng độ ban đầu của A là 0,8 mol/l, của B là 1 mol/l. Sau 20 phút nồng độ của B còn 0,6 mol/l. Hỏi nồng độ của A là bao nhiêu?

*GIẢI*

$$a) V = k[A][B]^\alpha ; V' = k.2[A](2[B])^\alpha = 2^{\alpha+1}V = 16V$$

$$\text{Rút ra } 2^{\alpha+1} = 16 \Rightarrow \alpha = 3.$$

b) Khi [B] còn 0,6 mol/l tức [B] giảm 0,4 mol/l. Theo phương trình hoá học của phản ứng:  $A + 2B \rightarrow C$  nghĩa là [A] giảm 0,2 mol/l. Vậy [A] còn lại:

$$0,8 - 0,2 = 0,6 \text{ mol/l.}$$

**324.** Thực nghiệm cho biết sau 0,75 giây thì 30ml dung dịch KOH 1M trung hoà vừa hết 30ml dung dịch  $H_2SO_4$  0,5M. Hãy xác định tốc độ của phản ứng đó theo lượng KOH và theo lượng  $H_2SO_4$ . Kết quả thu được ở mỗi trường hợp có hợp lí không? Tại sao?

**GIẢI**

$$n_{\text{KOH}} = 0,03 \text{ mol} ; n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,015 \text{ mol. Ta có: } \frac{n_{\text{KOH}}}{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = 2$$

Do đó phản ứng xảy ra:



Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo lượng:

$$* \text{ KOH là: } \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{0,03}{0,75} = 0,04 \text{ mol/giây}$$

$$* \text{ H}_2\text{SO}_4 \text{ là: } \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{0,015}{0,75} = 0,02 \text{ mol/giây}$$

Như vậy là kết quả hợp lí, mặc dù hệ số của 2 chất không trùng nhau ở phản ứng (1) nhưng ở đây có sự biến thiên số mol thay cho biến thiên nồng độ.



(1) Khi nồng độ chất B tăng lên 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm đi bao nhiêu lần?

(2) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần?

b) Cho phản ứng:  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ . Sau một thời gian, nồng độ các chất như sau:  $[\text{N}_2] = 2,5 \text{ mol/l} ; [\text{H}_2] = 1,5 \text{ mol/l} ; [\text{NH}_3] = 2 \text{ mol/l}$ . Tính nồng độ ban đầu của  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2$ .

**GIẢI**

a) (1) Giả sử nồng độ ban đầu của chất A là  $a \text{ mol/l}$ , của chất B là  $b \text{ mol/l}$ ,  $V_{\text{ban đầu}} = k.a.b^2$ .

Khi nồng độ chất B tăng lên 3 lần:  $V_{\text{sau}} = k.a.(3b)^2 = 9kab^2$

Như vậy tốc độ phản ứng tăng lên 9 lần.

(2) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì nồng độ mỗi chất đều tăng lên 2 lần, tính như trên ta thấy tốc độ phản ứng tăng lên 8 lần.



Nồng độ ban đầu (mol/l):            x            y

Nồng độ phản ứng:                    1            3                    2

Nồng độ lúc cân bằng:                2,5        1,5                    2

$$x - 1 = 2,5 \rightarrow x = 3,5\text{M} ; y - 3 = 1,5 \rightarrow y = 4,5\text{M}.$$



Dựa vào biểu thức tính tốc độ phản ứng thì trong số các điều khẳng định sau đây, điều nào phù hợp với biểu thức tính tốc độ phản ứng:

A. Tốc độ của phản ứng hoá học tăng lên khi có mặt chất xúc tác.

B. Tốc độ của phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ của các chất tham gia phản ứng.

C. Tốc độ của phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích các nồng độ của các chất tham gia phản ứng.

D. Tốc độ của phản ứng hoá học thay đổi khi tăng thể tích dung dịch chất tham gia phản ứng.

b) Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  4M ở nhiệt độ thường. Ý nào sau đây là đúng? Tốc độ phản ứng tăng khi:

A. Dùng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2M thay dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  4M.

B. Tăng thể tích dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  4M lên gấp đôi.

C. Giảm thể tích dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  4M xuống một nửa.

D. Dùng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  6M thay dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  4M.

TRẢ LỜI

a) C ; b) D.

## CHỦ ĐỀ 2

### Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến tốc độ phản ứng

327. a) Ở  $25^\circ\text{C}$  tốc độ phản ứng là  $1,3 \text{ mol/l.ph}$ . Hỏi ở  $85^\circ\text{C}$  thì tốc độ phản ứng là bao nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên  $10^\circ\text{C}$  thì tốc độ phản ứng tăng gấp 2 lần.

b) Xét phản ứng:  $2\text{A}_{(k)} + \text{B}_{(k)} \longrightarrow 2\text{D}_{(k)}$ . Phản ứng thực hiện trong bình kín, dung tích không đổi là V lít và nhiệt độ ở  $t^\circ\text{C}$ . Nếu áp suất tăng lên 6 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên là bao nhiêu?

GIẢI

a) Cứ tăng  $10^\circ\text{C}$  tốc độ phản ứng tăng 2 lần.

Từ  $25^\circ\text{C} \rightarrow 85^\circ\text{C}$  độ tăng nhiệt độ là  $60^\circ\text{C}$

Vậy số lần tăng nhiệt độ là:  $60 : 10 = 6$  lần

Tốc độ phản ứng tăng:  $2^6 = 64$  lần.

Tốc độ ở  $85^\circ\text{C}$  là:  $1,3 \times 64 = 83,2 \text{ mol/l.ph}$ .

b) Các chất đều ở thể khí, ta có thể tính tốc độ phản ứng theo biểu thức:  
 $V = k \cdot p_A^2 \cdot p_B$ . Khi áp suất tăng lên 6 lần thì:

$$V = k(6p_A)^2 \cdot 6p_B = 216 \cdot k \cdot p_A^2 \cdot p_B$$

Như vậy tốc độ phản ứng tăng 216 lần.

328. a) Khi nhiệt độ tăng thêm  $10^\circ\text{C}$ , tốc độ của một phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu nhiệt độ giảm từ  $70^\circ\text{C}$  xuống  $40^\circ\text{C}$  thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm bao nhiêu?



b) Cho phản ứng:  $2A_{(k)} + B_{2(k)} \longrightarrow 2AB_{(k)}$  được thực hiện trong bình kín. Khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

*GIẢI*

a) Tốc độ phản ứng giảm:  $3^{\frac{70-40}{10}} = 3^3 = 27$  lần.

b) Gọi nồng độ ban đầu của chất A và chất B là a mol và b mol, ta có:  
 $V_1 = k.a^2b$

Khi áp suất lên 4 lần thì thể tích giảm 4 lần và nồng độ tăng lên 4 lần.

$$V_2 = k.(4a)^2.4b = k.64.a^2b$$

Như vậy tốc độ phản ứng tăng 64 lần.

**329.** a) Xét phản ứng  $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$ . Khi nhiệt độ tăng  $25^\circ C$  thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Vậy khi tăng nhiệt độ từ  $20^\circ C$  đến  $170^\circ C$  thì tốc độ phản ứng tăng lên là bao nhiêu?

b) Khi nhiệt độ tăng thêm  $10^\circ C$ , tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Nếu muốn tốc độ phản ứng trên tăng lên 243 lần thì phải thực hiện ở nhiệt độ là bao nhiêu? Biết phản ứng đang thực hiện ở  $20^\circ C$ .

*GIẢI*

a) Cứ tăng  $25^\circ C$  thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Khi tăng từ  $20^\circ C$  đến  $170^\circ C$  độ tăng nhiệt độ là  $150^\circ C$ . Vậy số lần tăng nhiệt độ là:  $\frac{150}{25} = 6$  lần.

Tốc độ phản ứng tăng:  $3^6 = 729$  lần.

b) Tốc độ phản ứng tăng:  $3^{\frac{x-20}{10}} = 3^5 = 243 \rightarrow \frac{x-20}{10} = 5$

$\Rightarrow x = 70^\circ C$ . Phản ứng hoá học thực hiện ở  $70^\circ C$ .

**330.** Nếu ở  $150^\circ C$ , một phản ứng hoá học kết thúc sau 16 phút. Nếu hạ nhiệt độ xuống  $80^\circ C$  thì thời gian để kết thúc là bao nhiêu phút? Biết hệ số nhiệt độ của phản ứng trong khoảng nhiệt độ đó là 2,5.

*GIẢI*

$$V_{150} = V_{80} \times 2,5^{\frac{150-80}{10}} = 2,5^7 \cdot V_{80} ; V_{150} \approx 610 \cdot V_{80}$$

$\frac{V_{150}}{V_{80}} = 610$  lần. Thời gian để phản ứng kết thúc:  $610 \times 16 = 9760$  phút.

**331.** Khi nhiệt độ tăng thêm  $10^\circ C$ , tốc độ phản ứng hoá học tăng lên gấp đôi. Nếu nhiệt độ từ  $25^\circ C$  lên  $75^\circ C$  thì tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần?

**GIẢI**

Tốc độ phản ứng tăng:  $2^{\frac{75-25}{10}} = 2^5 = 32$  lần.

**CHỦ ĐỀ 3**

**Ảnh hưởng của nồng độ các chất đến sự chuyển dịch cân bằng.**

**Tính nồng độ các chất.**

**Tính hằng số cân bằng.**

**332. a)** Có cân bằng sau:  $2A_{(k)} + B_{(k)} \rightleftharpoons C_{(k)} + D_{(k)}$

Cho 10 mol khí A và 4 mol khí B vào 1 bình đựng dung tích 8 lit ở nhiệt độ không đổi 20°C. Khi đạt cân bằng trong hỗn hợp còn lại 30% lượng chất B ban đầu. Tính các giá trị  $K_p$  và  $K_c$  của phản ứng tại nhiệt độ trên.

b) Trong một bình kín, ở nhiệt độ không đổi, người ta trộn 512g khí  $SO_2$  và 128g oxi. Khi có cân bằng, lượng khí  $SO_2$  còn lại bằng 20% lượng ban đầu. Tính áp suất khi có cân bằng nếu áp suất ban đầu là 3 atm.

**GIẢI**

a)  $2A_{(k)} + B_{(k)} \rightleftharpoons C_{(k)} + D_{(k)}$

Số mol ban đầu:	10	4		
Số mol phản ứng:	$2 \times 4 \times 0,7$	$4 \times 0,7$	$4 \times 0,7$	$4 \times 0,7$
Số mol cân bằng:	4,4	1,2	2,8	2,8


Nồng độ lúc cân bằng:  $[A] = 0,55M$ ;  $[B] = 0,15M$ ;  $[C] = [D] = 0,35M$

$$K_c = \frac{0,35 \times 0,35}{(0,55)^2 \times 0,15} = 2,7$$

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n} = K_c \left( \frac{22,4}{273} \times 293 \right)^{-1} = 0,1123.$$

b)  $n_{SO_2} = 8 \text{ mol}$ ;  $n_{O_2} = 4 \text{ mol}$

- Khi có cân bằng khí  $SO_2$  còn lại 20%, nghĩa là có 80% tham gia phản ứng (6,4 mol)



$$\sum n_{\text{khí còn lại}} = (8 - 6,4) + (4 - 3,2) + 6,4 = 8,8 \text{ mol}$$



– Trong bình kín ở nhiệt độ không đổi, ta có tỉ lệ:  $\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1}{n_2}$

$$\frac{3}{p_2} = \frac{12}{8,8} \rightarrow p_2 = 2,2 \text{ atm.}$$

**333.** a) Cho phản ứng  $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ , ở  $t^\circ\text{C}$  có  $K = 1$ . Biết nồng độ ban đầu của CO bé hơn  $\text{H}_2\text{O}$  là 3 mol/l. Nếu nồng độ của  $\text{CO}_2$  và  $\text{H}_2$  lúc cân bằng bằng 2 mol/l thì nồng độ ban đầu của CO và  $\text{H}_2\text{O}$  là bao nhiêu?

b) Cho 0,003 mol  $\text{N}_2\text{O}_4$  (k) vào bình chân không dung tích 0,5 dm<sup>3</sup> duy trì ở 45°C xảy ra phản ứng:  $\text{N}_2\text{O}_4$  (k)  $\rightleftharpoons$  2 $\text{NO}_2$  (k). Khi cân bằng được thiết lập có 63%  $\text{N}_2\text{O}_4$  bị phân huỷ thành  $\text{NO}_2$ . Tính  $K_C$  của phản ứng ở nhiệt độ trên.

*GIẢI*

a) Gọi nồng độ ban đầu của nước là x mol/l, theo đề bài nồng độ ban đầu của CO là (x – 3) mol/l.

	CO	+	H <sub>2</sub> O	$\rightleftharpoons$	CO <sub>2</sub>	+	H <sub>2</sub>
Nồng độ ban đầu:	(x-3)		x		0		0
Nồng độ lúc cân bằng:	(x-5)		(x-2)		2		2

$$K = \frac{2^2}{(x-5)(x-2)} = 1$$

Giải phương trình và chọn nghiệm x = 6.

Vậy  $[\text{H}_2\text{O}]_{\text{ban đầu}} = 6\text{M}$  ;  $[\text{CO}]_{\text{ban đầu}} = 3\text{M}$ .

b)	$\text{N}_2\text{O}_4$ (k)	$\rightleftharpoons$	2 $\text{NO}_2$ (k)
Số mol ban đầu:	0,003		0
Số mol phản ứng:	x		2x
Số mol khi cân bằng:	0,003-x		2x

$$\text{Số mol } \text{N}_2\text{O}_4 = 0,003 - 0,00189 = 0,00111 \text{ mol}$$

$$\text{Số mol } \text{NO}_2 = 2 \times 0,00189 = 0,00378 \text{ mol}$$

$$[\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{0,00111}{0,5} = 0,00222 \text{ mol/l}$$


$$[\text{NO}_2] = \frac{0,00378}{0,5} = 0,00756 \text{ mol/l}$$

$$K_C = \frac{[0,00756]^2}{[0,00222]} \approx 2,57 \cdot 10^{-2}.$$

334. a) Cân bằng của phản ứng  $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$   $\Delta H < 0$  được thành lập ở  $t^\circ\text{C}$  khi nồng độ các chất  $[\text{H}_2] = 0,8 \text{ mol/l}$ ;  $[\text{I}_2] = 0,6 \text{ mol/l}$ ;  $[\text{HI}] = 0,96 \text{ mol/l}$ . Nồng độ ban đầu của  $\text{H}_2$  và  $\text{I}_2$  là bao nhiêu?

b) Cho phản ứng:  $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k})$  biết ở  $700\text{K}$  và áp suất  $1 \text{ atm}$  thành phần của hệ khí cân bằng là  $0,21 \text{ mol SO}_2$ ;  $10,3 \text{ mol SO}_3$ ;  $5,37 \text{ mol O}_2$  và  $84,12 \text{ mol N}_2$ . Hãy xác định  $K_p$  và thành phần hỗn hợp khí.

GIẢI



Nồng độ ban đầu của  $\text{H}_2$  là:  $0,8 + 0,48 = 1,28 \text{ mol/l}$

Nồng độ ban đầu của  $\text{I}_2$  là:  $0,6 + 0,48 = 1,08 \text{ mol/l}$

b) Số mol khí ở trạng thái cân bằng:

$$0,21 + 10,3 + 5,37 + 84,12 = 100 \text{ mol}$$

Thành phần phần trăm khí khi có cân bằng:  $0,21\% \text{ SO}_2$ ,  $10,3\% \text{ SO}_3$ ,  $84,12\% \text{ N}_2$ ,  $5,37\% \text{ O}_2$ .

$$K_p = \frac{(0,1030)^2}{(0,0021)^2 \times 0,0537} = 4,48 \cdot 10^4$$

Thành phần của hỗn hợp ban đầu:

$\text{SO}_2$ :  $0,21 + 10,3 = 10,51 \text{ mol}$

$\text{O}_2$ :  $5,37 + 5,15 = 10,52 \text{ mol O}_2$  và  $84,12 \text{ mol N}_2$ .

335. a) Cho phương trình phản ứng:  $\text{X} + \text{Y} \rightleftharpoons \text{Z} + \text{T}$ . Người ta trộn 4 chất X, Y, Z và T, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất T trong bình là 1,5 mol. Tính hằng số cân bằng của phản ứng.


b) Có cân bằng:  $\text{COCl}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k})$

Ở  $550^\circ\text{C}$ ,  $1 \text{ atm}$  mức độ phân huỷ của  $\text{COCl}_2$  là  $77\%$ . Tính  $K_c$ .

GIẢI

a) Lượng chất T khi cân bằng bằng 1,5 mol. Do đó lượng chất Z cũng là 1,5 mol; lượng chất X = lượng chất Y = 0,5 mol.

$$K = \frac{[\text{Z}][\text{T}]}{[\text{X}][\text{Y}]} = \frac{1,5 \times 1,5}{0,5 \times 0,5} = 9$$



$$P_{\text{CO}} = P_{\text{Cl}_2} = \frac{P \cdot \alpha}{1 + \alpha} ; P_{\text{COCl}_2} = P \cdot \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

$$K_P = \frac{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{COCl}_2}} = \frac{P \cdot \alpha^2}{1 - \alpha^2} \rightarrow K_P = \frac{1 \times (0,77)^2}{1 - (0,77)^2} = 1,456$$

$$K_C = K_P (RT)^{-1} = 1,456 \times \left( \frac{22,4 \times 823}{273} \right)^{-1} = 0,0215.$$

**336.** Cho cân bằng:  $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$

Cho 18,4g  $\text{N}_2\text{O}_4$  vào bình chân không dung tích 5,9 lít ở  $27^\circ\text{C}$ . Khi đạt tới trạng thái cân bằng áp suất đạt 1 atm. Cũng với khối lượng đó của  $\text{N}_2\text{O}_4$  nhưng với nhiệt độ  $110^\circ\text{C}$  ở trạng thái cân bằng nếu áp suất vẫn 1 atm thì thể tích hỗn hợp khí đạt 12,14 lít.

a) Tính % $\text{N}_2\text{O}_4$  bị phân li ở  $27^\circ\text{C}$  và  $110^\circ\text{C}$ .

b) Tính hằng số cân bằng ở hai nhiệt độ trên, từ đó rút ra phản ứng tỏa hay thu nhiệt.

*GIẢI*

a) Số mol  $\text{N}_2\text{O}_4$  ban đầu:  $n_1 = 18,4 : 92 = 0,2$  mol



Số mol ban đầu: 0,2 0

Số mol phản ứng: x 2x

Số mol sau phản ứng: (0,2-x) 2x

Số mol hỗn hợp khí sau là: 0,2 + x

Ở  $27^\circ\text{C}$ :

$$0,2 + x_1 = \frac{1 \times 5,9}{22,4} \times \frac{273}{(273 + 27)} = 0,23969 \Rightarrow x_1 = 0,03969$$

$$\Rightarrow \% \text{N}_2\text{O}_4 \text{ bị phân huỷ} = \frac{0,03969}{0,2} \times 100\% = 19,845\%$$

$$\text{Và ở } 110^\circ\text{C} \text{ là: } 0,2 + x_2 = \frac{1 \times 12,14}{22,4} \times \frac{273}{(273 + 110)} = 0,3863$$

$$\Rightarrow x_2 = 0,1863 \Rightarrow \% \text{N}_2\text{O}_4 \text{ bị phân huỷ} = \frac{0,1863}{0,2} \times 100\% = 93,15\%.$$

b) Tính K: 
$$K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{\left(\frac{2x}{V}\right)^2}{\left(\frac{0,2-x}{V}\right)} = \frac{4x^2}{V(0,2-x)}$$

Ở 27°C:  $V_1 = 5,9$  lít ;  $x_1 = 0,03969$  mol

$$K = \frac{4 \times (0,03969)^2}{5,9(0,2 - 0,03969)} = 6,66 \cdot 10^{-3}$$

Ở 110°C:  $V_2 = 12,14$  lít ;  $x_2 = 0,1863$  mol

$$K = \frac{4 \times (0,1863)^2}{12,14(0,2 - 0,1863)} = 0,8347$$

Ta thấy khi nhiệt độ tăng số mol  $N_2O_4$  phân huỷ tăng và hằng số cân bằng cũng tăng  $\Rightarrow$  phản ứng thu nhiệt.

**337. a)** Cho phản ứng:  $CO_{(k)} + H_2O_{(k)} \rightleftharpoons CO_{2(k)} + H_{2(k)}$ , ở 1°C,  $K = 1$ . Nếu nồng độ ban đầu  $[CO] = 0,1$  mol/l,  $[H_2O] = 0,4$  mol/l. Hãy tính nồng độ lúc cân bằng của các chất trên.

**b)** Cho phản ứng  $CO_{(k)} + H_2O_{(k)} \rightleftharpoons CO_{2(k)} + H_{2(k)}$ , ở 1°C,  $K = 1$ , khi có cân bằng  $[H_2O] = 0,03$  mol/l,  $[CO_2] = 0,04$  mol/l.

(1) Tính nồng độ ban đầu của CO.

(2) Nếu 90% CO chuyển thành  $CO_2$  và nồng độ ban đầu của CO là 1 mol/l thì lượng nước cần phải đưa vào bao nhiêu?

#### GIẢI

a)	$CO_{(k)} + H_2O_{(k)} \rightleftharpoons CO_{2(k)} + H_{2(k)}$			
Nồng độ mol ban đầu:	0,1	0,4	0	0
Nồng độ lúc phản ứng:	x	x	x	x
Nồng độ cân bằng:	(0,1-x)	(0,4-x)	x	x

$$K = \frac{x^2}{(0,1-x)(0,4-x)} = 1 \Rightarrow x = 0,08M.$$

Vậy nồng độ lúc cân bằng CO là 0,02M,  $H_2O$  là 0,32M,  $CO_2$  và  $H_2$  đều là 0,08M.

**b) (1)** Ở trạng thái cân bằng:  $[CO_2] = [H_2] = 0,04$  mol/l

$$K = \frac{[CO_2][H_2]}{[H_2O][CO]} = 1 \Rightarrow [CO] = \frac{0,04^2}{0,03} = 0,053 \text{ mol/l}$$

Theo phương trình phản ứng 1 mol CO tác dụng với 1 mol hơi nước tạo nên 1 mol  $CO_2$  và 1 mol  $H_2$ . Do đó 0,04 mol  $CO_2$  được tạo nên từ 0,04 mol CO và 0,04 mol hơi nước.

$$[CO]_{\text{ban đầu}} = 0,04 + 0,053 = 0,093M.$$

(2) Số mol CO tham gia là 0,9 (90%). Vậy ở trạng thái cân bằng  $[CO_2] = [H_2] = 0,9 \text{ mol/l}$ .

$$K = \frac{0,9 \times 0,9}{0,1[H_2O]} = 1 \rightarrow [H_2O] = 8,1 \text{ mol/l}$$

Số mol nước tham gia là 0,9 mol

$$[H_2O]_{\text{lúc đầu}} = 0,9 + 8,1 = 9M.$$

#### CHỦ ĐỀ 4

#### Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến sự chuyển dịch cân bằng

338. a) Cho phương trình phản ứng:  $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Hãy chứng minh.

b) Phản ứng:  $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$  là phản ứng tỏa nhiệt

Cho biết cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi giảm nhiệt độ? khi tăng áp suất? khi thêm chất xúc tác? giải thích.

#### GIẢI

a) – Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng lên 3 lần và cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

– Chứng minh: Gọi nồng độ  $N_2$ ,  $H_2$ ,  $NH_3$  lúc chưa tăng áp suất là a, b, c

$$V_t = k_t \cdot ab^3; V_{\text{nghịch}} = k_{\text{nghịch}} \cdot c^2$$

Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng 3 lần và nồng độ tăng lên 3 lần.

$$V_t = k_t \cdot 3a \cdot (3b)^3 = 81 \cdot k_t \cdot ab^3$$

$$V_{\text{nghịch}} = k_{\text{nghịch}} \cdot (3c)^2 = 9 \cdot k_{\text{nghịch}} \cdot c^2$$

So với lúc chưa tăng áp suất thì  $V_t$  tăng 81 lần

So với lúc chưa tăng áp suất thì  $V_{\text{nghịch}}$  tăng 9 lần

Vậy cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

b) – Phản ứng:  $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$  (1)

là phản ứng tỏa nhiệt và giảm số phân tử khí.

– Cân bằng của phản ứng (1) chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ.

*Giải thích:* Với phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt hay tạo thành những chất đầu (chiều nghịch).

Vậy khi giảm nhiệt độ, cân bằng phản ứng (1) chuyển dịch theo chiều toả nhiệt hay về phía tạo thành những chất cuối (chiều thuận).

– Cân bằng của phản ứng (1) chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất.

Giải thích: Với phản ứng có sự thay đổi về số phân tử khí, khi tăng áp suất cân bằng phản ứng chuyển dịch về phía giảm số phân tử khí (chiều thuận).

- Cân bằng của phản ứng (1) không bị chuyển dịch khi thêm chất xúc tác.

Giải thích: Do chất xúc tác ảnh hưởng như nhau đến tốc độ của phản ứng thuận và phản ứng nghịch.

**339.** Có cân bằng sau:  $\text{N}_2\text{O}_4 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2 (\text{g})$

a) Cho 18,4g  $\text{N}_2\text{O}_4$  vào bình kín dung tích 5,904 lít ở  $25^\circ\text{C}$ . Lúc cân bằng, áp suất của hỗn hợp khí trong bình là 1 atm. Tính áp suất riêng phần của  $\text{NO}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}_4$  lúc cân bằng?

b) Nếu giảm áp suất của hệ lúc cân bằng xuống còn 0,5 atm thì áp suất riêng phần của  $\text{NO}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}_4$  lúc này là bao nhiêu? Kết quả có phù hợp với nguyên lí Le Chatelier hay không?

**GIẢI**

$$\text{a) } n_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{m}{M} = \frac{18,4}{92} = 0,2 \text{ mol}$$



Số mol ban đầu: 0,2 0

Số mol lúc cân bằng:  $(0,2-x)$   $2x$

**Tổng số mol các chất có trong hệ lúc cân bằng:**

$$(0,2 - x) + 2x = 0,2 + x$$

$$0,2 + x = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 5,904}{0,082(273 + 27)} = 0,24 \text{ mol}$$

Ở đây  $x$  là số mol  $\text{N}_2\text{O}_4$  bị phân huỷ theo phản ứng khi đạt đến cân bằng:

$$x = 0,24 - 0,2 = 0,04 \text{ mol}$$

Số mol  $\text{NO}_2$  lúc cân bằng:  $0,04 \times 2 = 0,08 \text{ mol}$

Số mol  $\text{N}_2\text{O}_4$  lúc cân bằng:  $0,2 - 0,04 = 0,16 \text{ mol}$

Số mol khí  $\text{N}_2\text{O}_4$  gấp đôi số mol khí  $\text{NO}_2$  nên áp suất của  $\text{N}_2\text{O}_4$  cũng gấp hai lần áp suất của  $\text{NO}_2$ .

Vậy:  $P_{\text{NO}_2} = \frac{1}{3}$  atm và  $P_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{2}{3}$  atm.

$$K_P = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{6}.$$

b) Trường hợp giảm áp suất của hệ lúc cân bằng xuống bằng 0,5 atm, ta đặt  $P_{\text{NO}_2}$  khi cân bằng là  $p$  thì áp suất của  $\text{N}_2\text{O}_4$  khi cân bằng là:  $(0,5 - p)$ . Từ đó:

$$K_P = \frac{1}{6} = \frac{p^2}{0,5 - p} \Rightarrow 6p^2 + p - 0,5 = 0$$

$$P_{\text{NO}_2} = 0,217 \text{ atm}; \quad P_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0,283 \text{ atm}$$

$$\text{Kết quả } \frac{P_{\text{NO}_2}}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{0,217}{0,283} \approx 0,77$$

$$\text{So sánh với trường hợp trên: } \frac{P_{\text{NO}_2}}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = 0,5$$

Vậy khi giảm áp suất của hệ xuống thì cân bằng chuyển dịch sang phía làm tăng áp suất của hệ lên, nghĩa là sang phía có nhiều phân tử khí hơn (từ trái sang phải), điều đó phù hợp với nguyên lý Le Chatelier.

**340.** Cho phản ứng:  $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k}) + 44\text{kcal}$

a) Giả sử ở nhiệt độ  $T$ , một hỗn hợp cân bằng trong một bình cầu 1 lít có thành phần sau đây:

$\text{SO}_3 = 0,6 \text{ mol}; \quad \text{SO}_2 = 0,2 \text{ mol}; \quad \text{O}_2 = 0,3 \text{ mol}$ . Tính  $K_C$ ?

b) Giả sử thể tích bình chứa tăng gấp đôi ở nhiệt độ  $T$ , cân bằng trên sẽ biến đổi như thế nào?

c) Nếu tăng nhiệt độ lên, cân bằng sẽ chuyển theo chiều nào?

d) Dự đoán điều kiện đúng để thực hiện sự điều chế  $\text{SO}_3$  trong công nghiệp trên phương diện cân bằng hoá học và trên thực tế sản xuất.

*GIẢI*



$$K_C = \frac{0,6^2}{0,2^2 \times 0,3} = 30 (\text{mol/l})^{-1}$$

b)  $V$  bình tăng gấp 2  $\Rightarrow$  nồng độ mỗi chất giảm 2 lần. Thể tích bình tăng, áp suất sẽ giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng áp suất hay tăng số mol khí (chiều nghịch).

c) Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều thu nhiệt).

d) Tăng áp suất và tăng nhiệt độ để phản ứng có hiệu suất cao trong sản xuất.

**341.** a) Hãy cho biết những câu sau đây, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S) và điền vào chỗ trống cho thích hợp

TT	Nội dung	Đ	S
A	Sự thay đổi nhiệt độ không làm thay đổi vị trí cân bằng.		
B	Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi vị trí cân bằng.		
C	Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi hằng số cân bằng.		
D	Sự thay đổi nhiệt độ làm thay đổi hằng số cân bằng.		

b) Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau đây:



Muốn sản xuất amoniac đạt hiệu quả cao, người ta phải thay đổi yếu tố nào sau đây:

- A. Tăng nhiệt độ hoặc cho chất xúc tác
- B. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất
- C. Lấy  $\text{NH}_3$  ra khỏi hệ
- D. B và C đúng.

*TRẢ LỜI*

a) A sai, B đúng, C sai, D đúng.

b) D đúng.

**342.** a) Cho phản ứng sau:  $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$   $\Delta H = -124 \text{ kJ/mol}$

Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi:

- A. Tăng áp suất
- B. Tăng nhiệt độ
- C. Giảm nhiệt độ
- D. A và C đúng.

b) Cho phản ứng sau:  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$   $\Delta H < 0$ .

Khi tăng áp suất của hệ cân bằng sẽ chuyển dịch:

- A. Theo chiều thuận
- B. Không chuyển dịch
- C. Theo chiều nghịch
- D. Khó xác định.

*TRẢ LỜI*

a) D đúng. b) B đúng.



## BÀI TẬP TỰ GIẢI

343. a) Hằng số cân bằng  $K_p$  của phản ứng:




ở  $986^\circ\text{C}$  là 0,63. Một hỗn hợp 1 mol hơi nước và 3 mol CO đạt đến cân bằng ở nhiệt độ này dưới áp suất chung 2 atm. Hỏi:

(1) Có bao nhiêu mol  $\text{H}_2$  được tạo thành trong hệ lúc cân bằng.

(2) Áp suất riêng phần của mỗi khí lúc cân bằng là bao nhiêu?

b) Cho khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào bình chân không dung tích không đổi ở  $711\text{K}$ . Ở nhiệt độ này sự phân huỷ  $\text{H}_2\text{S}$  có thể bỏ qua. Áp suất trong bình là 0,6 atm. Nâng nhiệt độ của bình lên  $1185\text{K}$  thì áp suất trong bình là 1,07 atm. Hỏi ở  $1185\text{K}$ , khí  $\text{H}_2\text{S}$  có bị phân huỷ theo phương trình sau không?



Tính áp suất  $\text{S}_n$ .

344. Cho cân bằng hoá học:  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ,  $\Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$

a) Nếu ban đầu  $n_{\text{N}_2} : n_{\text{H}_2} = 1 : 3$  khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở  $450^\circ\text{C}$ , 300 atm thì  $\text{NH}_3$  chiếm 36% thể tích. Tính hằng số cân bằng  $K_p$ .

b) Giữ nhiệt độ không đổi (ở  $450^\circ\text{C}$ ) cần tiến hành dưới áp suất bao nhiêu để khi đạt tới trạng thái cân bằng  $\text{NH}_3$  chiếm 50% thể tích?

345. Cho  $n$  mol rượu etylic và 1 mol axit axetic vào bình cầu rồi thêm nước vào cho được 100ml. Tạo điều kiện thực hiện phản ứng este hoá cho đến khi đạt trạng thái cân bằng có  $K_{cb} = 4$ .

a) Thiết lập biểu thức cân bằng và tìm nồng độ của este theo  $n$  lúc cân bằng.

b) Hiệu suất phản ứng este có tùy thuộc vào  $n$  không?

c) Cho  $n = 2$ . Tìm khối lượng este thu được. Biết phản ứng este:



346. a) Đưa 0,5 mol khí  $\text{NH}_3$  vào một bình có dung tích  $V = 1$  lít và nung một thời gian ở nhiệt độ không đổi. Khi đạt đến cân bằng có 40%  $\text{NH}_3$  bị phân tách thành  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2$ . Tính  $K_{CB}$ .

b) Nếu ở nhiệt độ này người ta lấy hết  $\text{NH}_3$  ra khỏi hệ thống, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Tính số mol  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{NH}_3$  khi đạt đến cân bằng mới.

347. Cho khí etan ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) vào bình kín thể tích không đổi, áp suất trong bình đo được là 150mmHg, sau 50 giây áp suất đo được là 200mmHg. Hãy tính:

a) Áp suất riêng phần của  $\text{C}_2\text{H}_6(k)$ ,  $\text{H}_2(k)$ ,  $\text{C}_2\text{H}_4(k)$  tại  $t = 50$  giây.

b) Tốc độ phản ứng đó theo mol/l.s.

c) Độ phân li  $\text{C}_2\text{H}_6$ , biết rằng thí nghiệm được thực hiện ở  $350^\circ\text{C}$ .

348. a) Hãy cho biết trong những câu sau đây, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S), điền vào chỗ trống cho thích hợp:

TT	Nội dung	Đ	S
A	Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.		
B	Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt trạng thái cân bằng hoá học.		
C	Chỉ có phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học.		
D	Ở trạng thái cân bằng khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phải bằng nhau.		

b) Câu trả lời nào sau đây là đúng. Hằng số cân bằng K của một phản ứng:

- A. Phụ thuộc vào sự có mặt của chất xúc tác.
- B. Phụ thuộc vào sự tăng hoặc giảm của thể tích dung dịch.
- C. Phụ thuộc vào nhiệt độ.
- D. Phụ thuộc vào áp suất hoặc nồng độ.

c) Cho phản ứng:  $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k})$   $\Delta H < 0$ . Phản ứng được thực hiện trong bình kín. Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

- A. Biến đổi dung tích của bình phản ứng
- B. Biến đổi nhiệt độ
- C. Biến đổi áp suất
- D. Sự có mặt chất xúc tác.

349. a) Hãy cho biết trong những câu sau đây, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S) và điền vào chỗ trống cho thích hợp:

TT	Nội dung	Đ	S
A	Hằng số cân bằng K càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ.		
B	Khi thay đổi hệ số các chất trong một phản ứng, hằng số cân bằng K thay đổi.		
C	Hằng số cân bằng K của mọi phản ứng đều tăng khi nhiệt độ tăng.		
D	Hằng số cân bằng K của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.		

b) Cho phản ứng  $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$ . Nồng độ ban đầu  $C_A = C_B = 0,1 \text{ mol/l}$ . Sau một thời gian nồng độ của A, B còn lại  $0,04 \text{ mol/l}$ . Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu?

- A. 6,25 lần      B. 5,25 lần      C. 4,25 lần      D. 7,25 lần.

c) Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol  $H_2$  và 0,5 mol  $N_2$  ở nhiệt độ  $t^\circ C$ , khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol  $NH_3$  tạo thành.

(1) Hằng số cân bằng K là:

- A. 2,125      B. 4,125      C. 3,125      D. Kết quả khác.

(2) Muốn hiệu suất đạt 90% cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol  $N_2$  (trong các số cho dưới đây)?

- A. 57,25      B. 56,25      C. 75,25      D. 47,25.

350. a) Cho phản ứng  $2A + B_2 \rightleftharpoons 2AB$  được thực hiện ở bình kín. Biết rằng tất cả đều ở thể khí, khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ của phản ứng sẽ tăng là:

- A. 46 lần      B. 44 lần      C. 54 lần      D. Kết quả khác.

b) Cho một phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước



Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ chuyển dịch

- A. Theo chiều thuận      B. Không chuyển dịch  
C. Theo chiều nghịch      D. Không xác định được.

c) Xét phản ứng  $2N_2O \xrightarrow{t^0} 2N_2 + O_2$  ở  $t^\circ C$  và nồng độ ban đầu của  $N_2O$  bằng 3,2 mol/l.

(1) Nếu áp suất tăng lên 10 lần thì tốc độ phản ứng tăng là:

- A. 100 lần      B. 10 lần      C. 1000 lần      D. Kết quả khác.

(2) Nếu thể tích tăng lên 5 lần thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần?

- A. Giảm 50 lần      B. Tăng 25 lần      C. Giảm 25 lần      D. Tăng 50 lần.

## HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG VII



Số mol ban đầu                      3              1                      0              0

Số mol cân bằng:                    3-x        1-x                      x              x

Tổng số mol khí tại thời điểm cân bằng:

$$\sum n = 3 - x + 1 - x + x + x = 4$$

$$K_p = \frac{P_{\text{CO}_2} \cdot P_{\text{H}_2}}{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{\frac{x}{4}P \times \frac{x}{4}P}{\frac{3-x}{4}P \times \frac{1-x}{4}P} = 0,63$$

$$0,37x^2 + 2,52x - 1,89 = 0$$

$$x = 0,68 \text{ phù hợp}$$

Vậy số mol  $\text{H}_2$  tại thời điểm cân bằng là 0,68 mol

$$n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2} = 0,68 \text{ mol}; \quad n_{\text{CO}} = 3 - x = 2,32 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 1 - x = 0,32 \text{ mol}$$

Áp suất riêng phần mỗi khí:

$$P_{\text{H}_2} = P_{\text{CO}_2} = \frac{x}{4}P = \frac{0,68}{4} \times 2 = 0,34 \text{ atm}$$


$$P_{\text{CO}} = \frac{3-x}{4}P = \frac{2,32}{4} \times 2 = 1,16 \text{ atm}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1-x}{4}P = \frac{0,32}{4} \times 2 = 0,16 \text{ atm.}$$

b) Giả sử ở 1185K,  $\text{H}_2\text{S}_{(k)}$  không bị phân huỷ thì số mol  $\text{H}_2\text{S}$  không đổi = a mol

$$P_1V = aRT_1; \quad P_2V = aRT_2 \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1} \text{ thử lại } \frac{1,07}{0,60} \neq \frac{1185}{711}$$

Vậy  $\text{H}_2\text{S}_{(k)}$  ở 1185K đã bị phân huỷ




Số mol ban đầu:                      a                      0                      0

Số mol cân bằng:                    a-x                      x                       $\frac{x}{n}$

Số mol hỗn hợp sau phản ứng của  $\text{H}_2\text{S}$  và  $\text{H}_2$  bằng số mol  $\text{H}_2\text{S}$  ban đầu:  $P_1V = aRT_1$ ;  $P'V = aRT_2$  với  $P_{\text{H}_2\text{S}} + P_{\text{H}_2} = P'$

$$\Rightarrow \frac{P'}{P_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow P' = \frac{0,6 \times 1185}{711} = 1,00 \text{ atm}$$

$$\Rightarrow P_{S_{n(k)}} = 1,07 - 1,00 = 0,07 \text{ atm.}$$



a) Gọi  $x_1, x_2, x_3$  lần lượt là phần trăm thể tích (cũng là phần trăm số mol) ở trạng thái cân bằng của  $N_2, H_2, NH_3$  ta có tỉ lệ số mol  $N_2 : H_2$  vẫn là 1 : 3 và như vậy thì:

$$x_3 = 0,36 ; x_1 = \frac{0,64}{4} = 0,16 ; x_2 = 0,48$$


$$\text{Vậy } K_p = K_x \cdot p^{\Delta n} = \frac{x_3^2}{x_1 \cdot x_2^3 \cdot p^2} = \frac{(0,36)^2}{0,16 \cdot (0,48)^3 \cdot 300^2} = 8,14 \cdot 10^{-5}.$$

b) Theo điều kiện cân bằng khi giữ hệ ở nhiệt độ không đổi:

$$x_3 = 0,5 ; x_1 = \frac{0,5}{4} = 0,125 ; x_2 = 0,375$$

$$K = \frac{(0,5)^2}{0,125 \cdot (0,375)^3 \cdot p^2} = 8,14 \cdot 10^{-5} \Rightarrow p = 682,6 \text{ atm.}$$

**345.** Phương trình phản ứng este hoá



a) Gọi  $x$  là nồng độ este lúc cân bằng, ta có:

$$K_{eq} = \frac{x \times x}{(n-x)(1-x)} = 4$$

Với điều kiện  $x < n$  và  $x < 1$ :  $3x^2 - 4(n+1)x + 4n = 0$

$$\Rightarrow x = \frac{2(n+1) \pm 2\sqrt{n^2 - n + 1}}{3} \text{ với } x < 1 \text{ có nghiệm:}$$

$$x = \frac{2}{3} \left( n + 1 - \sqrt{n^2 - n + 1} \right)$$

b) Hiệu suất phản ứng este hoá:

$$H = \frac{x}{1} = \frac{\text{số mol este}}{\text{số mol axit}} = \frac{2}{3} \left[ (n+1) - \sqrt{n^2 - n + 1} \right]$$

Nên hiệu suất tùy thuộc vào  $n$ .

c) Khi  $n = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}(3 - \sqrt{3}) = 0,845 \text{ mol/l}$  số mol este lúc cân bằng có

phương trình:  $x = \frac{0,845 \times 100}{1000} = 0,0845 \text{ mol}$

Vậy  $m_{\text{este}} = 88 \times 0,0845 = 7,436 \text{ g}$ .

**346. a)** Khi nung  $\text{NH}_3$  bị phân li:



$n_{\text{NH}_3 \text{ bị phân li}} = 0,5 \times 0,4 = 0,2 \text{ mol}$

Khi cân bằng ta có:  $n_{\text{N}_2} = \frac{1}{2} n_{\text{NH}_3} = 0,1 \text{ mol}$  ;  $n_{\text{H}_2} = 0,3 \text{ mol}$

$n_{\text{NH}_3 \text{ còn lại}} = 0,5 - 0,2 = 0,3 \text{ mol}$

Hằng số cân bằng:  $K = \frac{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}{[\text{NH}_3]^2} = \frac{0,1 \times 0,3^3}{0,3^2} = 0,03 \text{ (Vì } V = 1 \text{ lít)}$ .

b) Nếu lấy  $\text{NH}_3$  ra khỏi hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch (cho  $\text{NH}_3$ ). Ban đầu:  $[\text{NH}_3] = 0$  ;  $[\text{N}_2] = 0,1 \text{ M}$  ;  $[\text{H}_2] = 0,3 \text{ M}$

Giả sử có  $x \text{ mol N}_2$  phản ứng với  $3x \text{ mol H}_2$  cho ra  $2x \text{ mol NH}_3$  ( $x < 0,1$ ). Khi đến cân bằng mới ta có:

$[\text{N}_2] = 0,1 - x$  ;  $[\text{H}_2] = 0,3 - 3x$  ;  $[\text{NH}_3] = 2x$

Vì nhiệt độ không đổi nên  $K = 0,03$

$$\frac{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}{[\text{NH}_3]^2} = 0,03 \Rightarrow 3x^2 - 0,8x + 0,03 = 0$$

Giải ra có 2 nghiệm  $x = 0,22$  (loại vì  $x < 0,1$ ) ;  $x = 0,045$

Vậy số mol ở trạng thái cân bằng mới là:

$n_{\text{N}_2} = 0,1 - 0,045 = 0,055 \text{ mol}$

$n_{\text{H}_2} = 3 \times 0,055 = 0,165 \text{ mol}$

$n_{\text{NH}_3} = 2 \times 0,045 = 0,09 \text{ mol}$ .

**347. a)**



Ban đầu: 150

Phản ứng: a a a

Sau phản ứng: 150-a a a

$$150 - a + a + a = 200 \rightarrow a = 50$$

$$P_{C_2H_4} = P_{H_2} = 50 \text{ mmHg} ; P_{C_2H_6} = 150 - 50 = 100 \text{ mmHg}.$$

b)  $V_{p.u} = \frac{d[C_2H_6]}{dt}$ . Công nhận khí li tưởng nên

$$PV = nRT \rightarrow \frac{n}{V} = \frac{P}{RT} = C = \frac{50}{760} \times \frac{273}{22,4 \times 623} = 1,287 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$V_{p.u} = \frac{1,287 \cdot 10^{-3}}{50} = 2,57 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l.s.}$$

c)  $\alpha = \frac{P_{p.u}}{P_{đầu}} = \frac{50}{150} = 0,3333 \text{ hay } 33,33\%$

**348.** a) A sai ; B sai ; C đúng ; D sai.

b) C đúng.

c) D.

(Chất xúc tác không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng thay đổi).

**349.** a) A sai ; B đúng ; C sai ; D đúng.

b) A đúng.

c) (1) C đúng ; (2) A đúng.

**350.** a) D đúng.

b) B đúng.

c) (1) A đúng ; (2) C đúng.

# MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
<i>Lời nói đầu</i>	3
<b>CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ</b>	5
<b>Chủ đề 1:</b> Xác định phân tử khối của hợp chất khi biết các hợp chất được tạo bởi các nguyên tố có các đồng vị khác nhau	5
<b>Chủ đề 2:</b> Các dạng bài toán liên quan đến các hạt tạo thành một nguyên tử	6
<b>Chủ đề 3:</b> Các bài toán về độ rỗng của nguyên tử, của vật chất và khối lượng riêng hạt nhân nguyên tử khi biết kích thước nguyên tử, hạt nhân và số khối	13
<b>Chủ đề 4:</b> Dạng bài toán tìm số khối, phần trăm đồng vị và nguyên tử khối trung bình	18
<b>Chủ đề 5:</b> Dựa vào cấu hình electron xác định nguyên tố là phi kim hay kim loại	25
<b>Chủ đề 6:</b> Dạng bài toán về các số lượng tử của vỏ nguyên tử	34
<i>Bài tập trắc nghiệm</i>	40
<i>Bài tập tự giải</i>	43
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương I</i>	45
<b>CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC</b>	49
<b>Chủ đề 1:</b> Xác định vị trí các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học của chúng khi biết điện tích hạt nhân	49
<b>Chủ đề 2:</b> Xác định công thức, tính chất hoá học đơn chất và hợp chất của một nguyên tố khi biết vị trí của nó trong bảng tuần hoàn	71
<i>Bài tập trắc nghiệm</i>	81



<i>Bài tập tự giải</i>	81
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương II</i>	87
<b>CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC</b>	91
<b>Chủ đề 1:</b> Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo phẳng của phân tử	91
<b>Chủ đề 2:</b> Xác định một số liên kết hình thành trong hợp chất	94
<b>Chủ đề 3:</b> Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion	100
<b>Chủ đề 4:</b> Ảnh hưởng của liên kết hoá học đến nhiệt độ nóng chảy và độ tan	101
<i>Bài tập tự giải</i>	103
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương III</i>	106
<b>CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC</b>	110
<b>Chủ đề 1:</b> Xét chiều hướng phản ứng. Xác định chất oxi hoá-chất khử	110
<b>Chủ đề 2:</b> Phản ứng có chất hoá học là tổ hợp của hai chất khử	117
<b>Chủ đề 3:</b> Phản ứng oxi hoá-khử có hệ số bằng chữ	119
<b>Chủ đề 4:</b> Phản ứng có nguyên tố tăng hay giảm số oxi hoá ở nhiều mức	120
<b>Chủ đề 5:</b> Phản ứng không xác định rõ môi trường	124
<b>Chủ đề 6:</b> Xác định các chất tạo thành sau phản ứng hoá học	126
<i>Bài tập tổng hợp</i>	133
<i>Bài tập tự giải</i>	142
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương IV</i>	147
<b>CHƯƠNG V: NHÓM HALOGEN</b>	149
<b>Chủ đề 1:</b> Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng	149
<b>Chủ đề 2:</b> Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp	153
<b>Chủ đề 3:</b> Xác định tên nguyên tố halogen và công thức phân tử muối halogenua	159

<b>Chủ đề 4:</b> Xác định khối lượng và nồng độ các hợp chất của halogen	168
<b>Chủ đề 5:</b> Tính pH và nồng độ dung dịch axit clohidric	173
<b>Chủ đề 6:</b> Tính hiệu suất phản ứng	186
<i>Bài tập tự giải</i>	188
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương V</i>	190
<b>CHƯƠNG VI: NHÓM OXI</b>	191
<b>Chủ đề 1:</b> Bộ túc chuỗi phản ứng và cân bằng phản ứng	191
<b>Chủ đề 2:</b> Nhận biết và điều chế các chất	194
<b>Chủ đề 3:</b> Xác định nguyên tố oxi - lưu huỳnh và các hợp chất của chúng	200
<b>Chủ đề 4:</b> Tính pH và nồng độ dung dịch $H_2SO_4$	209
<b>Chủ đề 5:</b> Tính hiệu suất phản ứng	212
<i>Bài tập toán tổng hợp</i>	214
<i>Bài tập tự giải</i>	217
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương VI</i>	219
<b>CHƯƠNG VII: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC</b>	220
<b>Chủ đề 1:</b> Ảnh hưởng của nồng độ các chất tham gia đến tốc độ phản ứng. Tính thành phần các chất	220
<b>Chủ đề 2:</b> Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến tốc độ phản ứng	223
<b>Chủ đề 3:</b> Ảnh hưởng của nồng độ các chất đến sự chuyển dịch cân bằng. Tính nồng độ các chất. Tính hằng số cân bằng	225
<b>Chủ đề 4:</b> Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến sự chuyển dịch cân bằng	230
<i>Bài tập tự giải</i>	234
<i>Hướng dẫn giải và đáp số chương VII</i>	237

*Chịu trách nhiệm xuất bản :*

Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRAN Ầ  
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYEN QUÝ THAO

*Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung:*

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ XBGD Gia Định

**XÀ THIỆU HOÀNG**

Phó Tổng biên tập PHAN XUÂN KHÁNH

*Biên tập nội dung:*

**ĐẶNG CÔNG HIỆP**

*Biên tập tài bản:*

**ĐẶNG CÔNG HIỆP**

*Trình bày bìa:*

**HOÀNG PHƯƠNG LIÊN**

*Biên tập kỹ thuật:*

**TRẦN THÀNH TOÀN**

*Sửa bản in:*

**ANH PHƯƠNG**

*Chế bản:*

**NGÔ NGỌC AN**

---

Công ti CPDV xuất bản Giáo dục Gia Định – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
giữ quyền công bố tác phẩm.

---

## **350 BÀI TẬP HÓA HỌC CHỌN LỌC VÀ NÂNG CAO LỚP 10**

**Mã số : TXH08m2- CPH**

**Số đăng kí KHXB : 21 - 2012/CXB/101 - 2095/GD**

In 3000 cuốn, (QĐ : 37), khổ 17x24cm

In tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Lô II - 3, đường 11, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú

In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2012